

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Abies (Weisstanne)	Tannentrieblaus	Veralin CD Marshal 25 CS	0,5 % 0,15%	Vor dem Austrieb oder Genol Plant 2%.
Chamaecyparis (Scheinzypresse)	Schildläuse Spinnmilben Miniermotten Stammgrundfäule	Veralin CD Marshal 25 CS Vertimec Zolone Previcur N	0,5 % 0,2 % 0,025 % 0,15 % 0,15 %	Vor dem Austrieb oder Genol Plant 2%. Im Juli, nach 10 Tagen wiederholen. Oder Zenar 0,04%. Ab Ende Mai alle 3 Wochen 2–3 mal wiederholen. Oder Fonganil 0,02% vor dem Topfen tauchen oder nach dem Topfen wiederholt giessen.
Juniperus (Wacholder)	Stammgrundfäule Gitterrost	Previcur N Delan 500 SC + Indar 5 EW	0,15 % 0,05 % 0,2 %	Oder Fonganil 0,02% giessen. Mehrere Behandlungen ab Ende August bis Ende Oktober.
Larix (Lärche)	Lärchen-Fichten-Gallenlaus Thrips, Blattwespenlarven	Marshal 25 CS Marshal 25 CS	0,2 % 0,15 %	Bei Auftreten. Bei Auftreten.
Picea (Fichte)	Fichten-Gallenlaus (Ananasgallen) Fichtenröhrenläuse Fichtenspinnmilben (rote Nadeln)	Zolone Zolone oder Marshal 25 CS oder Pirimor Vertimec	0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,05 % 0,025 %	Oder Genol Plant 2% 2 mal ab Ende März. Spritzungen ab Anfang bis Mitte April oder später, bei Temperaturen über 10 °C. Oder Zenar 0,04% (speziell bei Zwergformen).
Picea (Blautanne)	Cucurbitaria (Knospensterben) Spinnmilben Gallenläuse Läuse	Cuprofix + Wuxal Profi Vertimec Zolone Zolone	2 % 0,2 % 0,025 % 0,15 % 0,15 %	Vor Austrieb sowie Mitte Juni und Mitte Juli. Mitte bis Ende März. Oder Zenar 0,04%. Anfang April. Mitte April. Oder Perfekthion 0,1%.
Pinus (Föhre)	Föhrenwolllaus Kieferntriebwickler Föhrenschütte Blattläuse, Blattwespen, Gallmücken Triebsterben	Veralin CD Marshal 25 CS Marshal 25 CS Dithane NeoTec + Wuxal Profi Marshal 25 CS Cuprofix	0,5 % 0,2 % 0,15 % 0,4 % 0,2 % 0,15 % 0,5 %	Vor dem Austrieb. Oder Genol Plant 2%. Oder Paraderil 0,5%. Zweite Hälfte März und Anfang Juli und 3 Wochen später. Spritzungen Ende Juli bis Anfang August sowie Anfang September. Mai bis Juni. Mitte April bis Anfang Mai. Oder Delan 500 SC 0,05%.
Taxus (Eibe)	Schildläuse Dickmaulrüssler Spinnmilben	Veralin CD Marshal 25 CS Marshal 25 CS Vertimec	0,5 % 0,2 % 0,15 % 0,025 %	Vor dem Austrieb. Oder Genol Plant 2%. Im Juli. Oder Zenar 0,04%, wiederholen.
Thuja (Lebensbaum)	Schildläuse, Blattläuse Miniermotten Spinnmilben Zweigsterben (Kabatina) und Nadelbräune	Marshal 25 CS Zolone Zenar Dithane NeoTec oder Cuprofix	0,2 % 0,15 % 0,04 % 0,4 % 0,3 %	Im Mai nach 10 Tagen wiederholen. Ab Ende Mai alle 3 Wochen. Oder Vertimec 0,025%. Mehrere ab Mai.