

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Überwinternde Schädlinge	Kurz vor Austrieb Blattdüngung	Veralin CD Wuxal Profi	0,5% 0,2%	Oder Genol Plant 2%. Allen Spritzungen zusetzen.
Acer (Ahorn)	Schwarzfleckenkrankheit Echter Mehltau Blattläuse	Indar 5 EW Nimrod Perfekthion	0,2% 0,15% 0,1%	Oder Dithane NeoTec 0,3%. Oder Actara 0,02%.
Aesculus (Rosskastanie)	Blattbräune (Guignardia) Miniermotten	Indar 5 EW + Dithane NeoTec Zolone	0,2% 0,2% 0,15%	Beim Austreiben der Knospen 2–3 Behandlungen. Oder SanoPlant Neem 0,5%, ab Ende Mai alle 3 Wochen.
Alnus (Erle)	Blattkäferlarven (Skelettierfrass)	Zolone	0,15%	
Betula (Birke)	Blattläuse Schädlinge Blattfleckenkrankheit, Rost	Veralin CD Pirimor Marshal 25 CS Indar 5 EW	0,5% 0,05% 0,15% 0,2%	Vor dem Austrieb. Oder Genol Plant 2%. Bei Befall. Oder Dithane NeoTec 0,3%.
Buxus (Buchs)	Buchsblattfloh Buchs gallmückenlarven Stängelgrundfäule, Wurzelfäule Schildläuse Cylindrocladium-Zweigsterben Buchsbaumspinnmilbe, Thrips Buchsbaumzünsler	Marshal 25 CS Perfekthion Fonganil Marshal 25 CS Play Vertimec Kendo	0,2% 0,1% 0,02% 0,2% 0,1% 0,025% 0,015%	Bei Auftreten. Oder Marshal 25 CS 0,2%, im Juli/August, wiederholen. Giessen. Oder Previcur N 0,15%. Mitte und Ende Juni gründlich spritzen. Ab Austrieb etwa alle 3 Wochen wiederholen. Oder Bravo 500 0,3%. Bei Befall, wiederholen. Bei Befall, wiederholen.
Carpinus (Hainbuche)	Echter Mehltau Raupen, Zikaden, Thrips	Nimrod Marshal 25 CS	0,2% 0,15%	Oder Indar 5 EW 0,2%.
Clematis (Waldrebe)	Echter Mehltau Clematis-Sterben	Nimrod Previcur N	0,2% 0,15%	Oder Fonganil 0,02%, wiederholt giessen.
Cornus (Hartriegel)	Blattfleckenkrankheit Dickmaulrüssler	Indar 5 EW Marshal 25 CS	0,2% 0,15%	Oder Dithane NeoTec 0,3%.
Corylus (Haselnuss)	Haselnussbohrer Knospengallmilben	Zolone Veralin CD	0,15% 0,5%	Ab Anfang Juni 3 mal in Abständen von 10 Tagen. Bei Austrieb. Oder Genol Plant 2%.
Euonymus (Spindelstrauch)	Schildläuse, Blattläuse Echter Mehltau	Veralin CD Marshal 25 CS Nimrod	0,5% 0,2% 0,2%	Vor dem Austrieb. Oder Genol Plant 2%. Im Sommer.
Fagus (Buche)	Buchenblatt- und Wolllaus Buchenspringrüssler	Marshal 25 CS Zolone	0,2% 0,15%	Oder Perfekthion 0,1%. Oder Marshal 25 CS 0,15% sofort bei Austrieb.
Forsythia (Forsythien)	Monilia, Botrytis	Play	0,05%	Behandlung bei Blütebeginn und 10 Tage später.

Vermerk

Wird **Marshal 25 CS** bei Pflanzen mit stark behaarten Blättern alleine gespritzt, ist es empfehlenswert, **Etafix Pro** oder **Wuxal Profi** beizumischen.

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Hedera (Efeu)	Blattläuse, Schildläuse Spinnmilben, Thrips, Weichhautmilben Blattflecken	Marshal 25 CS Vertimec	0,2% 0,025%	Oder Dithane NeoTec 0,3%. Mehrere Wiederholungen. Giessen Anfang September.
		Indar 5 EW oder Cuprofix Marshal 25 CS Marshal 25 CS	0,2% 0,2% 0,2% 0,15%	
Hydrangea (Hortensie)	Echter Mehltau, Blattläuse Spinnmilben Dickmaulrüssler	Indar 5 EW + Marshal 25 CS Zenar Marshal 25 CS	0,2% 0,15% 0,04% 0,15%	Oder Vertimec 0,025%.
Hypericum (Johanniskraut)	Blattfleckenkrankheit Rost	Cuprofix Indar 5 EW	0,3% 0,2%	Zu Beginn der Vegetation. Oder Belrose gegen Pilzkrankheiten 0,5%.
Ilex (Stechpalme)	Schildläuse Minierfliegenlarven	Marshal 25 CS Vertimec	0,2% 0,025%	Ab Mitte Juli. Oder Zolone 0,15%, Anfang und Mitte Juni.
Laurus (Lorbeer)	Blattflöhe, Schildläuse, Wollläuse	Marshal 25 CS	0,2%	Wiederholen.
Ligustrum (Liguster) Lonicera (Geissblatt)	Blattflöhe, Schildläuse, Wollläuse Thrips, Zikaden Miniermotten Blattläuse	Marshal 25 CS Marshal 25 CS Perfekthion Zolone	0,2% 0,15% 0,1% 0,15%	Wiederholen. Oder Vertimec 0,025%, Anfang und Ende Juni. Ab Anfang bis Mitte Juni.
Mahonia (Mahonie)	Rost, Echter Mehltau Blattflecken	Indar 5 EW Dithane NeoTec	0,2% 0,3%	
Parthenocissus (Jungfernebe)	Falscher Mehltau	Cuprofix	0,3%	Oder Ridomil Gold 0,25%. Oder Dithane NeoTec 0,3%.
Platanus (Platane)	Blattflecken (Anthraknose)	Cuprofix	0,3%	Oder Indar 5 EW 0,2%, 2–3 mal ab dem Austrieb. Oder Indar 5 EW 0,2%. Oder Zolone 0,15%.
	Echter Mehltau Platanenwanze	Nimrod Marshal 25 CS	0,2% 0,15%	
Populus (Pappel)	Rost, Blattflecken	Indar 5 EW	0,2%	Oder Dithane NeoTec 0,3%, ab Mitte Juni.
Potentilla (Fingerkraut)	Spinnmilben Echter Mehltau	Zenar Nimrod	0,04% 0,2%	2–3 mal.
Prunus (Zierkirsche) Kirschlorbeer	Blattläuse, Gespinstmotten Monilia, Schrotschuss	Perfekthion Cuprofix	0,1% 0,3%	Beim Aufblühen und 10 Tage später. Behandlung auf die jungen Triebe. Giessen. Oder Nimrod 0,2%, Behandlung auf die jungen Triebe.
	Dickmaulrüssler, Blattläuse Dickmaulrüsslerlarven Echter Mehltau, Schrotschuss	Marshal 25 CS Marshal 25 CS Indar 5 EW oder Cuprofix	0,15% 0,15% 0,2% 0,3%	
Quercus (Eiche)	Blattflecken Echter Mehltau Maikäfer Eichenzweiglaus, Schildläuse	Indar 5 EW Nimrod Zolone Marshal 25 CS	0,2% 0,2% 0,2% 0,2%	Oder Dithane NeoTec 0,3%.

Vermerk

 Wird **Marshal 25 CS** bei Pflanzen mit stark behaarten Blättern alleine gespritzt, ist es empfehlenswert, **Etalix Pro** oder **Wuxal Profi** beizumischen.

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Rhododendron	Zikaden, Weisse Fliege Dickmaulrüsslerkäfer	Marshal 25 CS Marshal 25 CS	0,15% 0,15%	Ab Frassbeginn, etwa Mitte Mai, abends behandeln. Oder Perfekthion 0,1%. Giessen, 5 l/m ² . Vor und nach der Blüte. Oder Cuprofix 0,3%. Oder Fongamil 0,02% giessen.
	Rhododendron-Netzwanze Dickmaulrüsslerlarven Zweigsterben, Blattflecken- krankheiten	Marshal 25 CS Marshal 25 CS Ridomil Gold	0,15% 0,15% 0,25%	
	Phytophthora-Stammfäule Blütenknospenfäule	Previcur N Play	0,2% 0,1%	
Salix (Weide)	Blattläuse, Blattwespenlarven Echter Mehltau, Rost Spinnmilben Schorf	Perfekthion Indar 5 EW Zenar Cuprofix oder Indar 5 EW	0,1% 0,2% 0,04% 0,3% 0,2%	Oder Vertimec 0,025%. Vorbeugend behandeln, mehrmals wiederholen.
Sambucus (Holunder)	Schwarze Blattläuse	Veralin CD	0,5%	Vor dem Austrieb. Oder Genol Plant 2%.
Syringa (Flieder)	Fliedermotte Echter Mehltau	Perfekthion Nimrod	0,1% 0,2%	Ab April.
Tilia (Linde)	Gallmilben Lindenblattwespen Blattflecken Spinnmilben	Veralin CD Marshal 25 CS Cuprofix Zenar	0,5% 0,15% 0,3% 0,04%	Bei Austrieb. Oder Genol Plant 2%. Oder Dithane NeoTec 0,3%, ab Austrieb. Nach der Blüte.
Ulmus (Ulme)	Ulmenblattgallenlaus	Veralin CD	0,5%	Bei Austrieb. Oder Genol Plant 2%. Oder Marshal 25 CS 0,15%.
	Blattkäfer und -larven	Zolone	0,15%	
Viburnum (Schneeball)	Blattläuse Blattkäfer und -larven Blattflecken	Perfekthion Zolone Indar 5 EW oder Cuprosan U-DG	0,1% 0,15% 0,2% 0,25%	Oder Actara 0,02%. Oder Marshal 25 CS 0,15%. Im Vorsommer 2 mal.

Vermerk

Wird **Marshal 25 CS** bei Pflanzen mit stark behaarten Blättern alleine gespritzt, ist es empfehlenswert, **Etalfix Pro** oder **Wuxal Profi** beizumischen.

Spritzplan für Gehölze und Baumschulen



wirkt zuverlässig

Zeitpunkt	Problem	Produkt	Dosierung
Vor dem Austrieb	Spinnmilben- und Blattläuseier, Fichtengallenläuse, Wollläuse	Veralin CD oder Genol Plant	0,5% 2%
Anfang April	Schorf, Anthraknose, Blattflecken, Botrytis, Föhrenschütte, Blütenmonilia Blattläuse und andere Schädlinge	Cuprosan U-DG + Zolone	0,3% 0,15%
Mitte April	Schorf, Falscher Mehltau, Blattflecken, Föhrenschütte, Blütenmonilia, Botrytis Blattläuse und andere Schädlinge	Delan 500 SC + Play + Marshal 25 CS	0,075% 0,1% 0,15%
Anfang Mai	Rost, Blattflecken, Anthraknose Blattläuse, Dickmaulrüssler Blattdüngung mit Netzmitteleffekt	Indar 5 EW + Dithane NeoTec + Marshal 25 CS + Wuxal Profi	0,2% 0,3% 0,15% 0,2%
Mitte Mai	Schorf, Monilia, Echter Mehltau, Schrotschuss Miniermotten, Maikäfer und andere Schädlinge Blattdüngung mit Netzmitteleffekt	Indar 5 EW + Dithane NeoTec + Zolone + Wuxal Profi	0,2% 0,3% 0,15% 0,2%
Anfang Juni	Schorf, Echter Mehltau, Schrotschuss, Rost Blattdüngung mit Netzmitteleffekt	Tega + Dithane NeoTec + Wuxal Profi	0,05% 0,3% 0,2%
Ende Juni	Echter Mehltau, Falscher Mehltau, Botrytis Dickmaulrüssler, Thrips, Schildläuse Blattdüngung mit Netzmitteleffekt	Tega + Dithane NeoTec + Marshal 25 CS + Wuxal Profi	0,05% 0,3% 0,15% 0,2%
Mitte Juli	Rost, Echter Mehltau, Kabatina, Sphaeropsis, Blattbräune Rote und Gemeine Spinnmilben Blattdüngung mit Netzmitteleffekt	Indar 5 EW + Dithane NeoTec + Zenar + Wuxal Profi	0,2% 0,3% 0,04% 0,2%
Mitte August	Rost, Echter Mehltau, Kabatina, Sphaeropsis, Blattbräune Schildläuse, Thrips und andere Schädlinge	Indar 5 EW + Dithane NeoTec + Marshal 25 CS	0,2% 0,3% 0,15%
Ab Anfang September	Junge Dickmaulrüsslerlarven, befallene Stellen mit genügend Spritzbrühe giessen. Nicht mehr als eine Bodenbehandlung alle zwei Jahre mit einem Produkt aus der Wirkstofffamilie der Carbamate.	Marshal 25 CS	0,15%
Anfang Oktober	Um die überwinterten Stadien der Pilzkrankheiten zu dezimieren und die Holzreifung zu fördern. Gegen Blattläuse und Spinnmilben auf Koniferen	Cuprosan U-DG + Delan 500 SC + Pegasus	0,3% 0,075% 0,15%