







Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Äpfel und Birnen Stadium C53  Stadium D56  Stadium E59  Stadium G67  Stadium I  Stadium K  Ende Mai bis Anfang Juni	Schorf Verschiedene Schädlinge	Cuprofix + Veralin CD	0,2% 0,5%	Beim Knospenschwellen. Oder Genol Plant 2%.
	Schorf Blattläuse, Frostspanner, Eulenraupen, Wanzen	Rondo Duo + Zolone	* 0,15%	Oder Rondo Combi . Oder Delan 500 SC 0,2%.
	Schorf, Mehltau, Monilia Förderung des Fruchtansatzes	Rondo Duo Wuxal Profi	* 0,2%	Oder Rondo Combi .
	Schorf, Mehltau Monilia, Rost	Tega + Malwin WG	0,01% 0,1%	
	Schorf, Mehltau, Rost Blattläuse Spinnmilben	Rondo Duo + Pirimor + Zenar	* 0,04% 0,02%	Oder Rondo Combi . Oder Belrose gegen Blattläuse 0,5%.
	Pilzkrankheiten, Apfelwickler, Birnblattsauger und Blattdüngung	Rondo Duo + Insegar + Wuxal Profi	* 0,04% 0,2%	Oder Rondo Combi .
Aprikosen	Schädlinge und Pilzkrankheiten	Veralin CD + Cuprofix Rondo Duo	0,5% 0,3% *	Austriebsspritzung.** Oder Tega 0,025%.
	Echter Mehltau, Monilia, Schrotschuss Blattläuse, Frostspanner, Eulenraupen	Zolone	0,15%	Spritzen vor der Blüte.
	Pflaumenwickler	Insegar DG	0,03%	Anfang Juli und Ende Juli.
Kirschen	Schädlinge und Pilzkrankheiten	Veralin CD + Cuprofix Tega Frufix	0,5% 0,5% 0,025% 0,02%	Austriebsspritzung.** In die abgehende Blüte und Wuxal Profi 0,2%.
	Monilia, Bitterfäule, Schrotschuss Röteln	Rondo Duo Zolone	* 0,15%	In die Blüte und Nachblüte. Spritzen vor der Blüte.
	Schrotschuss Blattläuse, Frostspanner, Eulenraupen Kirschenfliege	Perfekthion	0,05%	Beim Farbumschlag.
Pflaumen und Zwetschgen	Narrenzwetschgen, überwinternde Pilzkrankheiten, Schädlinge	Cuprofix + Veralin CD	1,5% 0,5%	Im Februar. Austriebsspritzung.**
	Monilia und Schrotschuss, Rost Spinnmilben	Rondo Duo Zenar	* 0,02%	Oder Tega 0,025%, 2–3 mal ab der Blüte.
	Blattläuse, Frostspanner, Eulenraupen Pflaumenwickler	Zolone Insegar DG	0,15% 0,03%	Spritzen vor der Blüte. Anfang Juli und Ende Juli.
Pfirsiche	Schädlinge und Pilzkrankheiten	Veralin CD + Cuprofix Slick	0,5% 0,3% 0,03%	Austriebsspritzung.** Ab Austrieb.
	Kräuselkrankheit Echter Mehltau, Schrotschuss Allgemeine Schädlinge Spinnmilben	Tega Perfekthion Zenar	0,025% 0,1% 0,02%	

* Genaue Konzentration siehe Gebrauchsanleitung auf der Packung.

** Oder **Genol Plant** 2%. Oder **SanoPlant Winteröl** 2%.

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Quitten	Monilia, Echter Mehltau Allgemeine Schädlinge	Rondo Duo Perfekthion	* 0,1%	Ab der Blüte.
Spalierreben	Kräusel- und Pockenmilben Eisenchlorose Echter Mehltau Falscher Mehltau Botrytis (Graufäule) Stiellähme	Veralin CD Sequestrene Rapid Topas Vino Cuprofix Play Wuxal Suspension Mg	0,5% 0,6–1,2 kg/ha 0,025% 0,3% 0,1% 5 l/ha	Beim Knospenschwellen** oder Thiovit Jet 2%. Vor der ersten Bodenbearbeitung streuen und einarbeiten. Oder Slick 0,0125%. Bis spätestens Ende August. Oder Cuprosan U-DG 0,25%. Beim Schliessen der Trauben. 1. Behandlung beim Weichwerden, 2. Behandlung 14 Tage später.
Walnuss (Juglans)	Gallmilben Blattfleckenkrankheit, Blattdürre	Veralin CD Cuprofix	0,5% 0,5%	Bei Austrieb.** Alle 14 Tage ab Mitte Mai bis Ende August.

* Genaue Konzentration siehe Gebrauchsanleitung auf der Packung.

** Oder **Genol Plant** 2%. Oder **SanoPlant Winteröl** 2%.