

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
<b>Alstromeria</b>	Wurzel- und Rhizomfäulen Blattläuse, Raupen, Thrips Schnecken	<b>Previcur N</b> <b>Marshal 25 CS</b> <b>Limax Plus</b>	0,15% 0,15% 20–30	Oder <b>Fonganil</b> 0,02% giessen. Oder <b>Kendo</b> 0,02%. Körner pro m <sup>2</sup> .
<b>Anemone</b> (Mona Lisa)	Thrips Botrytis Wurzel- und Stammgrundfäule	<b>Vertimec</b> <b>Play</b> <b>Previcur N</b>	0,05% 0,05% 0,15%	Oder <b>Fonganil</b> 0,02%.
<b>Antirrhinum</b> Aussaat	Vermehrungspilze	<b>Previcur N</b>	0,2%	Als Giessbehandlung. Oder <b>Fonganil</b> 0,02%.
Jungpflanzen Während der Kultur	Falscher Mehltau, Rost Rost Blattläuse, Weisse Fliegen	<b>Ridomil Gold</b> <b>Indar 5 EW</b> <b>Marshal 25 CS</b>	0,2% 0,2% 0,15%	Oder <b>Dithane NeoTec</b> 0,3%. Oder <b>Actara</b> 0,04%.
<b>Aster</b> Jungpflanzen	Bodendesinfektion Welkepilze  Echter Mehltau Thrips, Blattläuse (Blattkräuselung)	<b>Basamid Granulat</b> <b>Previcur N</b> oder <b>Fonganil</b> <b>Nimrod</b> <b>Marshal 25 CS</b>	5 kg 0,15% 0,02% 0,1% 0,15%	Je Are, Wartefrist beachten. Vor Pikieren sowie vor und nach Verpflanzen im Abstand von 3 Wochen. Oder <b>Kendo</b> 0,02%.
<b>Calla</b>	Stängel- und Knollenfäule  Weisse Fliegen Blattläuse, Wollläuse, Thrips  Spinnmilben	<b>Previcur N</b> <b>+ Folpet DG</b> <b>Actara</b> <b>Marshal 25 CS</b> <b>+ Etalfix Pro</b> <b>Zenar</b>	0,15% 0,12% 0,04% 0,2% 0,02% 0,04%	Als Giessbehandlung. Oder <b>Plenum WG</b> 0,06%.
<b>Callistephus</b> Aussaat Jungpflanzen	Bodenmüdigkeit Vermehrungspilze (Pythium)	<b>Basamid Granulat</b> <b>Previcur N</b> oder <b>Fonganil</b>	5 kg 0,15% 0,02%	Je Are, Wartefristen beachten. Giessen, vor dem Pikieren, nach dem Auspflanzen wiederholen, in Abständen von 3 Wochen. Leichtes Angiessen.
Bis zur Blüte	Schwarzbeinigkeit  Blattläuse, Weisse Fliegen Thrips, Raupen, Blattläuse Minierfliegen, Spinnmilben	<b>Fonganil</b> <b>+ Dithane NeoTec</b> <b>Zolone</b> <b>Kendo</b> <b>+ Vertimec</b>	0,02% 0,2% 0,15% 0,02% 0,025%	Oder <b>Actara</b> 0,04% Oder <b>Marshal 25 CS</b> 0,15%.
<b>Chrysanthemum</b>	Bodenmüdigkeit Schädlinge und Krankheiten	<b>Basamid Granulat</b> siehe Topfpflanzen	5 kg	Je Are, Wartefrist beachten.
<b>Dahlia</b>	Schnecken Blattflecken, Echter Mehltau  Schädlinge Spinnmilben Virus	<b>Limax Plus</b> <b>Nimrod</b> <b>+ Dithane NeoTec</b> <b>Marshal 25 CS</b> <b>Zenar</b> Bekämpfung der saugenden Schädlinge (z. B. Blattläuse)	20–30 0,2% 0,3% 0,15% 0,04%	Körner pro m <sup>2</sup> .  Oder <b>Vertimec</b> 0,025%. Flankierende Massnahme.
Ab Blüte	Blattflecken, Echter Mehltau, Blattläuse, Blattwanzen, Thrips, Raupen Botrytis	<b>Indar 5 EW</b> <b>+ Kendo</b>  <b>Play</b> <b>+ Etalfix Pro</b>	0,15% 0,02%  0,05% 0,02%	Oder <b>Tega</b> 0,05%. <b>+ Etalfix Pro</b> 0,02%.

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
<b>Dianthus</b> Vor dem Auspflanzen Nach Pikieren und Auspflanzen Alle 3 Wochen	Bodendesinfektion Thrips, Nelkenfliege Nelkenrost Stängelgrundfäule	<b>Basamid Granulat</b> <b>Marshal 25 CS</b> <b>Dithane NeoTec</b> <b>Previcur N</b>	5 kg 0,15% 0,2% 0,15%	Je Are, Wartefrist beachten.  Oder <b>Amistar</b> 0,1%. Oder <b>Tega</b> 0,05%. Oder <b>Fonganil</b> 0,02% giessen, 6–10 l je m <sup>2</sup> . Oder <b>Ridomil Gold</b> 0,25%.
	Bei Befallsbeginn	Nelkenschwärze Raupen, Blattläuse, Thrips Spinnmilben Rost, Blattflecken Blütenbotrytis	<b>Dithane NeoTec</b> <b>Kendo</b> <b>Zenar</b> <b>Indar 5 EW</b> <b>Play</b>	0,2% 0,02% 0,04% 0,2% 0,05%
<b>Eryngium</b> (Blaudistel)	Blattflecken  Blattläuse, Blattwanzen, Thrips	<b>Indar 5 EW</b> <b>+ Dithane NeoTec</b> <b>Kendo</b>	0,2% 0,3% 0,02%	
<b>Eustoma</b>	Falscher Mehltau	<b>Fonganil</b>	0,02%	Oder <b>Dithane NeoTec</b> 0,2%. Oder <b>Ridomil Gold</b> 0,25%.
	Botrytis	<b>Play</b> oder <b>Mapro</b>	0,05% 0,05%	
	Stammgrundfäule Thrips	<b>Previcur N</b> <b>Vertimec</b>	0,15% 0,05%	Oder <b>Fonganil</b> 0,02% giessen. Oder <b>Marshal 25 CS</b> 0,15%.
<b>Freesia</b>	Knollenfäulen Botrytis	<b>Previcur N</b> <b>Play</b>	0,15% 0,05%	Oder <b>Fonganil</b> 0,02% giessen. Oder <b>Mapro</b> 0,05%.
<b>Gerbera</b>	Stammgrundfäule, Wurzelfäule	<b>Previcur N</b> oder <b>Fonganil</b>	0,15% 0,02%	Giessen, im Abstand von 2 Wochen wiederholen.
	Falscher Mehltau	<b>Fonganil</b>	0,02%	Oder <b>Dithane NeoTec</b> 0,2%. Oder <b>Ridomil Gold</b> 0,25%.
	Weisse Fliegen	<b>Kendo</b>	0,02%	Oder <b>Actara</b> 0,04% spritzen. Nach 5 Tagen wiederholen.
	Thrips	<b>+ Plenum WG</b> <b>+ Etalfix Pro</b> <b>Marshal 25 CS</b> <b>+ Etalfix Pro</b>	0,06% 0,02% 0,15% 0,02%	
	Thrips, Minierfliegen Weichhautmilben, Spinnmilben	<b>Vertimec</b> <b>Vertimec</b>	0,05% 0,025%	Oder <b>Zenar</b> 0,04%.
	Echter Mehltau Botrytis	<b>Nimrod</b> <b>Play</b>	0,1% 0,05–0,1%	Oder <b>Mapro</b> 0,1%.
<b>Gladiolus</b> Vor dem Pflanzen Knollenbeizung	Bodenmüdigkeit Knollenfäulen	<b>Basamid Granulat</b> <b>Previcur N</b>	4–5 kg 0,3%	Je Are, Wartefrist beachten. 20 Minuten tauchen, vor dem Einpflanzen trocknen lassen.
	Blattfleckenkrankheiten	<b>+ Play</b> <b>Indar 5 EW</b> <b>+ Dithane NeoTec</b>	0,15% 0,2% 0,3%	
	Thrips	<b>Marshal 25 CS</b>	0,15%	Oder <b>Vertimec</b> 0,05%; beide + <b>Etalfix Pro</b> 0,02%.
	Nacktschnecken Botrytis	<b>Limax Plus</b> <b>Play</b> <b>+ Etalfix Pro</b>	20–30 0,05% 0,02%	Körner pro m <sup>2</sup> .
<b>Helianthus</b>	Falscher Mehltau	<b>Fonganil</b>	0,02%	Oder <b>Ridomil Gold</b> 0,25%, ab dem Stadium 2–5 Blätter.
	Phomopsis, Albugo	<b>Cuprosan U-DG</b> <b>+ Etalfix Pro</b> <b>+ Indar 5 EW</b>	0,25% 0,02% 0,2%	Alternierend mit <b>Indar 5 EW</b> 0,2% + <b>Dithane NeoTec</b> 0,3% + <b>Etalfix Pro</b> 0,02%.
	Blattläuse Botrytis	<b>Plenum WG</b> <b>Play</b>	0,04% 0,1%	Oder <b>Actara</b> 0,02%; beide + <b>Etalfix Pro</b> 0,02%.

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
<b>Hypericum</b>	Rost	<b>Indar 5 EW</b> <b>+ Dithane NeoTec</b>	0,2% 0,3%	
<b>Lathyrus</b> (Wicken)	Schwarzbeinigkeit, Stängeldürre Echter Mehltau Schädlinge	<b>Previcur N</b> <b>Nimrod</b> <b>Kendo</b>	0,15% 0,1% 0,02%	Oder <b>Fonganil</b> 0,02% giessen.
<b>Lilien</b>	Zwiebelfäulen  Blattläuse, Lilienhähnchen Blattläuse  Schnecken Botrytis	<b>Previcur N</b> <b>+ Play</b>  <b>Kendo</b> <b>Plenum WG</b> <b>+ Etalfix Pro</b> <b>Limax Plus</b> <b>Play</b>	0,3% 0,15%  0,02% 0,04% 0,02% 20–30 0,05%	Oder <b>Fonganil</b> 0,02%. 20 Minuten tauchen, die Kultur mit der restlichen Brühe angiesen. Oder <b>Marshal 25 CS</b> 0,15%. Oder <b>Actara</b> 0,02%.  Körner pro m <sup>2</sup> . Nach dem Austrieb und vor der Blüte.
<b>Matthiola</b> (Levkojen)	Vermehrungspilze Falscher Mehltau Erdflöhe	<b>Previcur N</b> <b>Dithane NeoTec</b> <b>Kendo</b>	0,15% 0,3% 0,01%	Giessen. Spritzen. Vor der Behandlung Erde anfeuchten.
<b>Ranunculus</b>	Botrytis, Stängelfäule Falscher Mehltau Echter Mehltau Blattläuse	<b>Play</b> <b>Fonganil</b> <b>Nimrod</b> <b>Marshal 25 CS</b>	0,05–0,1% 0,02% 0,2% 0,15%	Oder <b>Mapro</b> 0,1%. Oder <b>Previcur N</b> 0,15%. Temperaturen mind. 12 °C für 12 Stunden. Oder <b>Kendo</b> 0,01%.
<b>Rosa</b> (unter Glas) Spätherbst oder kurz vor Austrieb  Ganze Kulturzeit	Krankheiten und Spinnmilben  Falscher Mehltau  Echter Mehltau, Rost, Sternrusstau Echter Mehltau Thrips, Blattläuse, Raupen Spinnmilben Thrips, Spinnmilben, Weisse Fliegen	<b>Cuprofix</b> <b>+ Veralin CD</b> <b>+ Zenar</b> <b>Fonganil</b>  <b>Indar 5 EW</b> <b>+ Dithane NeoTec</b> <b>Nimrod</b> <b>Marshal 25 CS</b> <b>Zenar</b> <b>Vertimec</b>	0,25% 0,5% 0,04% 0,02%  0,2% 0,3% 0,2% 0,15% 0,04% 0,05%	Oder <b>Cuprosan U-DG</b> 0,5%. Oder <b>Genol Plant</b> 2%.  Oder <b>Dithane NeoTec</b> 0,3%. Oder <b>Tega</b> 0,05%.  Alle 10–14 Tage wiederholen. Oder <b>Kendo</b> 0,02%.
<b>Rosa</b> (im Freiland) Spätherbst oder kurz vor Austrieb    Zwischenbehandlungen	Blattflecken, Krankheiten und Spinnmilben  Falscher Mehltau  Echter Mehltau, Rost, Sternrusstau Blattläuse, Raupen, Thrips  Botrytis  Echter Mehltau Spinnmilben Thrips, Spinnmilben	<b>Cuprofix</b> <b>+ Veralin CD</b> <b>+ Zenar</b> <b>Fonganil</b>  <b>Indar 5 EW</b>  <b>Marshal 25 CS</b>  <b>Play</b>  <b>Nimrod</b> <b>Zenar</b> <b>Vertimec</b>	0,25% 0,5% 0,04% 0,02%  0,2%  0,15%  0,1%  0,2% 0,04% 0,05%	Oder <b>Cuprosan U-DG</b> 0,5%. Oder <b>Genol Plant</b> 2%.  Oder <b>Ridomil Gold</b> 0,25%. Oder <b>Dithane NeoTec</b> 0,3%. Oder <b>Tega</b> 0,05%. Oder <b>Amistar</b> 0,1%. Oder <b>Delan 500 SC</b> 0,075%. Oder <b>Perfekthion</b> 0,1%. Oder <b>Zolone</b> 0,15%. Bei Blütenbehandlungen 0,05%. Oder <b>Mapro</b> 0,05%.
<b>Tagetes</b>	Bakterielle Blattflecken, Alternaria Spinnmilben	<b>Cuprofix</b> <b>Zenar</b>	0,1% 0,04%	Nur <b>Cuprofix</b> einsetzen. Oder <b>Vertimec</b> 0,025%.

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Trockenblumen	Botrytis	Play	0,05%	Letzte Behandlung kurz vor Schnitt.
Zwiebelgewächse: Tulpen, Hyazinthen, Narzissen, Iris Zwiebelbehandlung	Zwiebelfäulen	Previcur N + Play	0,3% 0,15%	20 Minuten tauchen, die Kultur mit der restlichen Brühe angiesen. Oder <b>Actara</b> 0,02% + <b>Etalfix Pro</b> 0,02%.  Wöchentlich wiederholen.
	Blattläuse	Kendo + Plenum WG	0,02% 0,04%	
	Blütenbotrytis	Play	0,05%	

## Freiland-Schnittblumen und Stauden

	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Schädlinge	Läuse, Thrips, Raupen	Marshal 25 CS	0,15%	Oder <b>Actara</b> 0,04%.  Körner pro m <sup>2</sup> .
	Weisse Fliegen, Blattläuse,	Kendo	0,02%	
	Spinnmilben	+ Vertimec	0,05%	
	Spinnmilben	Zenar	0,04%	
	Schnecken	Limax Plus	20–30	
Pilzkrankheiten	Vermehrungspilze/Bodenpilze	Previcur N	0,25%	Oder <b>Fonganil</b> 0,02% giessen.  Oder <b>Tega</b> 0,05%.  Oder <b>Ridomil Gold</b> 0,25%. Oder <b>Mapro</b> 0,05%.
	Blattflecken	Indar 5 EW	0,2%	
	Rost	+ Dithane NeoTec	0,3%	
	Echter Mehltau	Indar 5 EW	0,2%	
	Falscher Mehltau	Nimrod	0,2%	
	Botrytis	Fonganil	0,02%	
Vinca, Hypericum	Triebsterben	Previcur N	0,25%	
		+ Play	0,05%	
	Rost	Indar 5 EW	0,2%	
		+ Dithane NeoTec	0,3%	