

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Abutilon	Wollläuse, Thrips Spinnmilben Weisse Fliegen, Blattläuse	Marshal 25 CS + Etalfix Pro Zenar Actara + Etalfix Pro	0,2% 0,02% 0,04% 0,04% 0,02%	Oder Vertimec 0,025%. Oder Plenum WG 0,06%. Wiederholen.
Ageratum	Wurzelfäule Weisse Fliegen, Thrips Weisse Fliegen, Blattläuse Spinnmilben	Previcur N Kendo Actara Vertimec	0,15% 0,02% 0,04% 0,025%	Oder Fonganil 0,02% giessen. Oder Vertimec 0,05%. Oder Plenum WG 0,06%. Oder Zenar 0,04%.
Aphelandra	Echter Mehltau Schildläuse, Blattläuse Weichhautmilben, Thrips	Nimrod Marshal 25 CS + Etalfix Pro Vertimec	0,1% 0,15% 0,02% 0,05%	
Asparagus sp.	Blattläuse, Schildläuse Spinnmilben, Thrips	Marshal 25 CS Vertimec	0,15% 0,05%	
Asteriscus	Echter Mehltau Thrips, Spinnmilben	Nimrod Vertimec	0,2% 0,05%	
Azalea	Dickmaulrüssler Welkekrankheiten Wurzel- und Stammfäule Weisse Fliegen, Blattläuse Ovulinia, Septoria, Blattfall Weichhautmilben, Spinnmilben, Thrips Septoria, Ohrläppchenkrankheit	Marshal 25 CS Previcur N Ridomil Gold Actara Play Vertimec Delan 500 SC + Indar 5 EW Marshal 25 CS Play	0,15% 0,2% 0,25% 0,04% 0,05% 0,05% 0,15% 0,2% 0,15% 0,05%	Siehe Seite 43. Oder Fonganil 0,02%. Bei Befall in 3-wöchigen Abständen wiederholen. Giessen. Oder Fonganil 0,02%. Oder Plenum WG 0,06%.
Rohware und Treiberei	Thrips, Blattläuse, Azaleenmotte Botrytis	Marshal 25 CS Play	0,15% 0,05%	Oder Kendo 0,02%. Oder Mapro 0,05%.
Begonia (Elatior, Lorraine, Rex) Stecklinge Jungpflanzen und Roh- ware	Vermehrungspilze Stängelfäule (Botrytis) Echter Mehltau Bakteriose (Ölfleckenkrankheit) Weichhautmilben, Spinnmilben, Thrips Thrips, Blattläuse	Previcur N Play Nimrod Cuprofix Vertimec Marshal 25 CS + Etalfix Pro Nimrod	0,15% 0,05% 0,2% 0,1% 0,025% 0,15% 0,02% 0,1%	Vor dem Stecken giessen. Gut benetzen.
Blühende Pflanzen und Knollenbegonien	Echter Mehltau	Marshal 25 CS + Etalfix Pro Nimrod	0,15% 0,02% 0,1%	Mit feiner Düse leicht betauen.
Begonia semperflorens	Echter Mehltau	Nimrod	0,1%	Oder Topas Vino 0,025%.
Bellis	Rost, Blattflecken Echter Mehltau Blattläuse Botrytis	Indar 5 EW + Dithane NeoTec Nimrod Actara Play	0,2% 0,3% 0,1% 0,02% 0,05%	Oder Delan 500 SC 0,05%. Oder Plenum WG 0,04%.

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Calceolaria Aussaat	Vermehrungspilze Eisenchlorose Blattläuse	Previcur N Sequestrene Rapid Plenum WG + Etalfix Pro	0,25% 200 g/m ³ 0,04% 0,02%	Giessen. Oder 0,2% + Wuxal Profi 0,2% giessen. Oder Actara 0,02%.
Calceolaria integrifolia	Stängelfäule Blattläuse	Previcur N Marshal 25 CS	0,15% 0,15%	Giessen. Oder Fonganil 0,02%. Oder Kendo 0,02%.
Campanula	Stängelgrundfäule Rost, Ascochyta, Ramularia Raupen Weisse Fliegen	Previcur N Indar 5 EW Kendo Actara	0,15% 0,15% 0,02% 0,04%	Giessen. Oder Plenum WG 0,06%.
Chrysanthemum Stecklinge Kultur bis zur Blüte	Vermehrungspilze Wurzel- und Stängelgrundfäule Blattläuse, Weisse Fliegen Rost, Echter Mehltau, Septoria, Ascochyta Chrysanthemen-Rost	Previcur N Fonganil Actara Indar 5 EW + Delan 500 SC Indar 5 EW + Dithane NeoTec Marshal 25 CS + Etalfix Pro Zenar Kendo Marshal 25 CS + Etalfix Pro	0,15% 0,02% 0,04% 0,2% 0,05% 0,2% 0,3% 0,15% 0,02% 0,04% 0,02% 0,15% 0,02%	Vor dem Stecken giessen. Giessen oder Previcur N 0,15%. 2 mal, zu Beginn der Kultur. Alle 8–14 Tage wiederholen. Oder Dithane NeoTec 0,2%. Oder Kendo 0,02%. Oder Vertimec 0,05%. Oder Vertimec 0,025%. Feine Düse benutzen, Akkumulation der Produkte im Herzen der Knospen verhindern. Oder Kendo 0,02% + Etalfix Pro 0,02%.
Im Knospenstadium	Thrips, Blattläuse, Raupen, Wanzen, Weisse Fliegen Spinnmilben Minierfliegen Thrips, Blattläuse	Play Actara	0,05% 0,04%	Beim Aufbrechen der Knospen. Bei Befallsbeginn, wiederholen.
Beim Aufblühen	Botrytis Blattläuse, Weisse Fliegen	Play Actara	0,05% 0,04%	
Cyclamen Jungpflanzen	Wurzelbräune	Folpet DG	300 g/m ³	Der Erde beimischen. Oder Ridomil Gold 500 g/m ³ . Oder Fonganil 0,02%.
Rohware	Wurzel- und Knollenfäule Trauermücken und -larven Weichhautmilben Raupen, Dickmaulrüsslerkäfer, Läuse Blattfleckpilze Wurzelfpilze	Previcur N Kendo Vertimec Marshal 25 CS	0,15% 0,02% 0,025% 0,15%	Giessen. Oder Actara 0,04%. Oder Zenar 0,04%. Oder Kendo 0,02%.
Blühende Pflanzen	Blattfleckpilze Wurzelfpilze Thrips Botrytis	Cuprosan U-DG Previcur N Vertimec Play + Etalfix Pro	0,25% 0,15% 0,05% 0,05% 0,02%	Giessen, wiederholen. Oder Marshal 25 CS 0,15%. Ins Herz der Pflanzen spritzen. Oder Mapro 0,05%.
Dianthus (Napoleon und andere Topfnelken)				Siehe Schnittnelken Seite 29.
Erica Stecklinge	Vermehrungspilze (Pythium und Phytophthora)	Previcur N	0,2%	Vor dem Stecken giessen. Oder Fonganil 0,02%.
Jungpflanzen und Kulturen im Endtopf	Welkekrankheiten Glomerella, Pestalotia Botrytis Blattfleckpilze Blattläuse	Ridomil Gold Folpet DG Play Indar 5 EW Marshal 25 CS	0,25% 0,12% 0,05–0,1% 0,1% 0,15%	Überbrausen. Oder Dithane NeoTec 0,3%. Oder Actara 0,02%.
Ab Induktion (Ende Juli)	Echter Mehltau Rost, Blattkrankheiten	Nimrod Indar 5 EW	0,2% 0,2%	Wiederholen. Oder Tega 0,05%. Oder Delan 500 SC 0,05%.
Nicht bei Erica carolina	Echter Mehltau	Nimrod	0,1%	Wiederholen.

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Euphorbia (Poinsettia) Steckling	Stängelgrundfäule Substratbeimischung	Previcur N Fonganil	0,15% 25 ml	Giessen nach dem Stecken. Substrat pro m ³ . Oder Folpet DG 300 g/m ³ . Siehe Seite 43. Giessen.
	Kultur	Fonganil + Folpet DG Plenum WG + Kendo	0,02% 0,12% 0,06% 0,02%	1. Behandlung als Mischung, 2. Behandlung nur mit Plenum WG . Giessen.
	Weisse Fliegen	Play	0,05%	
	Botrytis Trauermückenlarven	Kendo	0,02%	
Farne (Nephrolepis, Pteris)	Schnecken	Limax Plus	20–30 g	Granulat pro m ² . Oder Actara 0,02%.
	Blattläuse	Kendo + Etalfix Pro	0,02% 0,02%	
	Wurzelläuse Weichhautmilben, Thrips	Actara Vertimec	0,04% 0,05%	Giessen. Wiederholen.
Fuchsia	Wurzelfäule	Fonganil	0,02%	Oder Previcur N 0,15% giessen. Oder Actara 0,04%.
	Weisse Fliegen, Blattläuse	Plenum WG + Etalfix Pro Vertimec	0,06% 0,02% 0,05%	
	Thrips, Weisse Fliegen, Spinnmilben	Play	0,1%	Spritzen, wiederholen. Oder Mapro 0,05%.
	Botrytis-Stängelfäule	Indar 5 EW	0,15%	
	Rost	+ Dithane NeoTec Wuxal Suspension Mg	0,3% 0,2%	
Grünpflanzen	Vermehrungspilze Blattläuse, Thrips, Spinnmilben	Previcur N Marshal 25 CS + Zenar Vertimec	0,15% 0,2% 0,04% 0,025%	Vor dem Stecken giessen. Oder Vertimec 0,25%.
	Milben an Hedera, Fatshedera, Aralia u. a.			
Gruppenpflanzen Anzucht	Vermehrungspilze Weisse Fliegen, Blattläuse	Previcur N Kendo	0,15% 0,02%	Vor dem Säen bzw. Stecken. Oder Actara 0,04% oder Plenum WG 0,06%. Oder Vertimec 0,025%. Oder Kendo 0,01%.
	Minierfliegen	Kendo	0,02%	
	Thrips, Blattläuse, Raupen Spinn- und Weichhautmilben, Thrips	Marshal 25 CS Vertimec	0,15% 0,05%	
	Botrytis	Play	0,05%	
Hibiscus	Spinnmilben	Zenar	0,04%	Oder Vertimec 0,025%. Oder Actara 0,02%. Oder Mapro 0,05%.
	Blattläuse, Weisse Fliegen	Plenum WG	0,04%	
	Botrytis	Play	0,05%	

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Hydrangea (Hortensia) Stecklinge Rohware Überwinterung Treiberei	Vermehrungspilze, Stängelfäule Rhizoctonia Blattläuse Echter Mehltau Spinnmilben Dickmaulrüssler, Raupen, Blattläuse Eisenmangel Knospenfäule Spinnmilben, Echter Mehltau Thrips, Spinnmilben	Previcur N + Play Kendo Nimrod Vertimec Marshal 25 CS Sequestrene Rapid Play Zenar + Nimrod Vertimec	0,15% 0,05% 0,02% 0,2% 0,025% 0,15% 0,2% 0,05% 0,04% 0,2% 0,05%	Vor dem Stecken giessen. Oder Actara 0,02%. Wiederholen. Oder Zenar 0,04%. Giessen, bei starker Chlorose 1% verwenden. Vor dem Einwintern.
Impatiens Neu-Guinea-Hybriden Impatiens walleriana	Pythium Spinnmilben, Weichhautmilben Blattläuse, Thrips Falscher Mehltau Pythium	Previcur N Vertimec Marshal 25 CS Fonganiil Previcur N	0,3% 0,025% 0,15% 0,02% 0,3%	Giessen. Oder Fonganiil 0,02%. Giessen. Oder Fonganiil 0,02%.
Kakteen	Wurzelläuse Schildläuse, Thrips, Wollläuse Spinnmilben Basalfäulen Trauermücken	Actara Marshal 25 CS + Etalfix Pro Vertimec Previcur N Kendo	0,02% 0,2% 0,02% 0,05% 0,15% 0,02%	Giessen. Oder Zenar 0,04%. Oder Fonganiil 0,02% giessen. Giessen. Oder Actara 0,04%.
Kalanchoë Stecklinge Kultur bis Blüte Ab Blüte	Vermehrungspilze Trauermückenlarven Thrips, Blattläuse, Dickmaulrüssler Weichhautmilben, Thrips, Spinnmilben Stängel- und Wurzelpilze Echter Mehltau Myrothecium, Stängelfäule Blattläuse, Thrips Blattläuse	Previcur N Kendo Marshal 25 CS Vertimec Previcur N Nimrod Ridomil Gold Marshal 25 CS + Etalfix Pro Actara + Etalfix Pro	0,15% 0,02% 0,15% 0,025% 0,15% 0,1% 0,25% 0,15% 0,02% 0,04% 0,02%	Giessen. Giessen. Giessen. Oder Fonganiil 0,02%. Oder Plenum WG 0,04%.
Kübelpflanzen- Überwinterung	Blattläuse, Schildläuse, Weisse Fliegen, Spinnmilben Botrytis	Marshal 25 CS + Zenar Play	0,2% 0,04% 0,1%	Oder Vertimec 0,025%. Vor allem nach den Schnitтарbeiten.
Lantana	Weisse Fliegen Botrytis	Plenum WG + Vertimec oder Kendo Play	0,06% 0,05% 0,02% 0,05%	Oder zusätzlich Actara 0,04% spritzen. Oder Mapro 0,05%.
Lobelia	Pythium	Previcur N	0,25%	Giessen. Oder Fonganiil 0,02%.
Myosotis (Vergissmeinnicht)	Echter Mehltau Falscher Mehltau Botrytis	Nimrod Fonganiil Play	0,2% 0,02% 0,05%	Oder Previcur N 0,15%, Temperaturen mind. 15°C.

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Orchideen	Blatt-, Schild- und Wollläuse, Thrips, Kellerasseln Bakterien, Blattflecken Milben Wuchsförderung	Marshal 25 CS	0,2%	Oder Cuprosan U-DG 0,25%. Oder Zenar 0,04%. Wöchentlich überbrausen.
		Cuprofix	0,1%	
		Vertimec Wuxal Profi	0,025% 0,1%	
Palma	Blattkrankheiten Spinnmilben, Woll- und Schildläuse	Cuprofix + Etalfix Pro	0,1% 0,02%	Oder Dithane NeoTec 0,3%.
		Marshal 25 CS + Zenar + Etalfix Pro	0,2% 0,04% 0,02%	
Pelargonium (Geranium)	Stecklingsfäule Bodenpilze Bakteriosen Rost Botrytis Macrosporium Spinnmilben Raupen, Blattläuse, Thrips Weisse Fliegen, Thrips	Previcur N Previcur N	0,15% 0,15%	Oder Fonganil 0,02% oder Folpet DG 300 g/m ³ Erds substrat. Oder Tega 0,05%. Oder Mapro 0,1%. Oder Zenar 0,04%. Oder Kendo 0,02%. Wiederholen. Oder Vertimec 0,05%.
		Cuprofix Dithane NeoTec Play Indar 5 EW Vertimec Marshal 25 CS Kendo	0,1% 0,3% 0,05% 0,15% 0,025% 0,15% 0,02%	
Pelargonium grandiflorum				
Petunia Aussaats Jungpflanzen	Vermehrungspilze Wurzelfilze Blattläuse, Weisse Fliegen Eisenchlorose	Previcur N Previcur N Plenum WG Kendo Sequestrene Rapid	0,25% 0,15% 0,06% 0,02% 100 g/m ³	Giessen, sofort nach der Saat. Nach Durchwurzelung wiederholt giessen. Oder Marshal 25 CS 0,2%. Oder Actara 0,04%. Der Pflanz Erde beimischen oder 0,2% + Wuxal Profi 0,2% giessen.
Primula	Schnecken Raupen, Blattläuse, Weisse Fliegen Thrips, Blattläuse Spinnmilben, Thrips, Minierfliegen Botrytis Blattflecken, Ramularia Eisenchlorose	Limax Plus Kendo + Etalfix Pro Marshal 25 CS + Etalfix Pro Vertimec	20–30 g 0,02% 0,02% 0,15% 0,02% 0,05%	Granulat pro m ² . Oder Mapro 0,05%. Oder Ridomil Gold 0,25%. Der Pflanz Erde beimischen oder 0,2% + Wuxal Profi 0,2% giessen. Oder Kendo 0,02%.
		Play Indar 5 EW Sequestrene Rapid	0,05% 0,15% 100 g/m ³	
Im Winter Im Frühling				
Primula obconica	Weisse Fliegen, Thrips	Vertimec		
Saintpaulia Endtopf	Trauermückenlarven Wurzelläuse Phytophthora-Welke Botrytis (Herzfäule) Weichhautmilben, Thrips Echter Mehltau Thrips, Blattläuse	Kendo Actara Previcur N	0,02% 0,04% 0,15%	Giessen. Giessen. Oder Fonganil 0,02% nach dem Topfen angiessen. Oder Mapro 0,05%. Mit feiner Düse nur betauen. Spritzen, Temperatur nicht unter 18 °C. Oder Kendo 0,02%.
		Play Vertimec Nimrod Marshal 25 CS	0,05% 0,025% 0,1% 0,15%	
Ab Blüte				

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Scaevola	Thrips Eisenchlorose	Marshal 25 CS Sequestrene Rapid	0,15% 100 g/m ³	Oder Kendo 0,02%. Oder Vertimec 0,05%. Der Pflanzerde beimischen oder 0,2% + Wuxal Profi 0,2% giessen. Oder Previcur N 0,15% giessen.
	Wurzel- und Stängelgrundfäule	Fonganil	0,02%	
Senecio (Cinerarien) Aussaat	Vermehrungspilze, Stängel- grundfäule	Previcur N	0,25%	Giessen. Oder Fonganil 0,02%.
Jungpflanzen Bis zur Blüte	Raupen, Blattläuse Weisse Fliegen, Thrips Weisse Fliegen, Blattläuse Falscher Mehltau	Kendo Vertimec Plenum WG Previcur N	0,02% 0,05% 0,06% 0,15%	Oder Actara 0,04%. Oder Fonganil 0,02%, Temperaturen mind. 12°C für 12 Stunden.
Beim Aufblühen	Alternaria, Botrytis Echter Mehltau Rost, Blattflecken Blattläuse, Thrips	Mapro Nimrod Indar 5 EW Marshal 25 CS	0,05% 0,2% 0,2% 0,15%	Oder Indar 5 EW 0,2%. Oder Dithane NeoTec 0,3%. Mit feiner Düse spritzen. Oder Kendo 0,02%.
Solanum/Capsicum	Botrytis Weisse Fliegen, Blattläuse	Play Kendo + Etalfix Pro Marshal 25 CS	0,05% 0,02% 0,02% 0,15%	Oder Mapro 0,1%. Oder Actara 0,04%. Oder Plenum WG 0,06%.
	Thrips Weichhautmilben, Thrips, Spinnmilben	+ Etalfix Pro Vertimec	0,02% 0,025%	
Streptocarpus	Stängelfäule, Phytophthora- Welke Weichhautmilben Blattläuse, Thrips	Previcur N Vertimec Kendo	0,15% 0,025% 0,02%	Oder Fonganil 0,02% giessen. 2 mal gründlich spritzen. Oder Marshal 25 CS 0,15%.
Surfinia	Echter Mehltau Minierfliegen Weisse Fliegen, Blattläuse	Nimrod Kendo Plenum WG + Etalfix Pro Marshal 25 CS	0,2% 0,02% 0,06% 0,02% 0,15%	Oder Vertimec 0,025%. Oder Actara 0,04%. Der Pflanzerde beimischen oder 0,2% + Wuxal Profi 0,2% giessen.
	Blattläuse, Thrips Eisenchlorose	+ Etalfix Pro Sequestrene Rapid	0,02% 100 g/m ³	
Verbenen	Blattflecken Echter Mehltau Thrips Weisse Fliegen, Blattläuse	Cuprosan U-DG Nimrod Marshal 25 CS Plenum WG + Kendo	0,25% 0,2% 0,15% 0,06% 0,02%	Oder Dithane NeoTec 0,3%. Oder Vertimec 0,05%. Oder Actara 0,04%.

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung	Bemerkungen
Viola (Pensée) Saatbeet	Bodendesinfektion Bodenpilze	Basamid Granulat Folpet DG	4–5 kg 150–300 g/m ³	Je Are, Wartezeit beachten. Dem Erdszubstrat beimischen. Giessen.
Nach dem Pikieren	Vermehrungspilze, Wurzelhals- fäulen Ramularia-Blattflecken	Previcur N + Folpet DG Ridomil Gold	0,15% 0,12% 0,25%	Oder Indar 5 EW 0,2%, wiederholt spritzen.
Jungpflanzen	Mycocentrospora-Blattflecken Falscher Mehltau, Ramularia Spinnmilben Schnecken Thrips, Blattläuse Blütenbotrytis	+ Dithane NeoTec Indar 5 EW + Ridomil Gold Zenar Limax Plus Marshal 25 CS Play	0,3% 0,15% 0,025% 0,04% 20–30 g 0,15% 0,05%	Temperaturen mind. 12 °C für 12 Stunden. Oder Vertimec 0,025%. Granulat pro m ² . Oder Kendo 0,02%.
Vor dem Einwintern	Bakteriosen	Cuprofix + Play	0,2% 0,05%	Oder Cuprosan U-DG 0,25%.
Ab der Blüte	Blütenbotrytis Blattläuse, Raupen, Thrips	Play + Kendo	0,05% 0,02%	