

Legan

Breit wirksames Kontaktfungizid zur Bekämpfung von verschiedenen Pilzkrankheiten in Zierpflanzen, Obst- und Weinbau

- Kein Resistenzrisiko
- Verhindert die Sporenkeimung
- Sehr gute Regenfestigkeit
- DER Mischpartner für andere Fungizide

Wirkstoff	70 % Dithianon
Formulierung	Wasserdispergierbares Granulat (WG)
Wirkung	Legan ist ein Kontaktfungizid mit dem Wirkstoff Dithianon. Es wirkt gegen zahlreiche Pilzkrankheiten ohne Resistenzrisiko. Der Wirkstoff greift an verschiedenen Stellen das Atmungssystem der Pilzzellen an. Legan verhindert die Sporenkeimung und das Mycelwachstum der Pilze. Nach der Spritzung bildet Legan einen feinen, sehr regenbeständigen Belag auf Blättern und Früchten. Diese Wirkstoffdepots werden durch Niederschläge und Tau immer wieder aktiviert und gewährleisten eine sichere und langanhaltende Wirkung.
Anwendung	<p>Allgemein: 10 ml von Messbecherlinie = 5 g 1 voller Messbecher = 40 g</p> <p>Zierpflanzen Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst), Blumenkulturen und Grünpflanzen, Rosen: 0,05 % (5 g in 10 l Wasser) gegen Blattfleckenpilze, Falsche Mehltau Pilze, Rostpilze und Sternrusstau der Rosen. Azaleen: 0,05 % gegen Ohrläppchenkrankheit der Azaleen.</p> <p>Obst Allgemein: Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf ein Baumvolumen von 10'000 m³ pro ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen des BLW an das Baumvolumen anzupassen. Ausser Kernobst: pro Parzelle und Jahr insgesamt nicht mehr als 1'680 g des Wirkstoffs Dithianon pro Hektar anwenden. Kernobst: 0,05 % (0,8 kg/ha) gegen Schorf des Kernobstes. Anwendung: Ab Austrieb bis Ende Juni. Behandlungen nach der Blüte: Pro Parzelle und Jahr insgesamt nicht mehr als 3'400 g des Wirkstoffs Dithianon pro Hektar anwenden. Kirsche: 0,05 % (0,8 kg/ha) gegen Bitterfäule der Kirsche, Schrotschuss und Sprühfleckenkrankheit der Kirsche. Wartefrist: 3 Wochen.</p>

Legan

Anwendung 2

Zwetschge/Pflaume: 0,05 % (0,8 kg/ha) gegen Narren- oder Taschenkrankheit der Zwetschge.

Anwendung: Einmalige Behandlung beim Aufbrechen der Knospen. 0,05 % (0,8 kg/ha) gegen Rost der Zwetschge. Wartefrist: 3 Wochen.

Reben

Allgemein: Maximal 8 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit einem Produkt, das den Wirkstoff Dithianon enthält. Keine Behandlung von Tafeltrauben. 0,05 % (0,8 kg/ha) gegen Falscher Mehltau der Rebe.

Anwendung: Vor- und Nachblütebehandlungen bis spätestens Mitte August. Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium BBCH 71–81 (J–M, Nachblüte) und eine Referenzbrühmenge von 1'600 l/ha (Berechnungsgrundlage) oder auf ein Laubwandvolumen von 4'500 m³ pro ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen des BLW an das Laubwandvolumen anzupassen.

0,075 % (0,6 kg/ha) gegen Schwarzfleckenkrankheit der Rebe. Anwendung: BBCH 7–10 (Stadium C–D).

Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium BBCH 07–10 (C–D) und eine Referenzbrühmenge von 800 l/ha (Berechnungsgrundlage). 0,075 % (0,6 kg/ha) gegen Rotbrenner.

Anwendung: bis BBCH 55 (Stadium G). Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium BBCH 55 (G) und eine Referenzbrühmenge von 800 l/ha (Berechnungsgrundlage).

Beachten

Die Wiederverwendung der Gebinde ist verboten.

Abstandsauflagen: Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von **Drift** ist eine unbehandelte Pufferzone von **50 m** (Obst, Bäume und Sträucher), von **20 m** (Reben, Azaleen, Blumenkulturen, Grünpflanzen und Rosen) zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer **Abschwemmung** ist eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens **6 m** einzuhalten. Reduktion der Distanz aufgrund von Drift und Ausnahmen gemäss den Weisungen des BLW.

Anwenderschutz: Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.

Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung des Mittels Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.

Brühezubereitung

Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, notwendige Menge an Produkten begeben und bei laufendem Rührwerk mit Wasser auffüllen.

Mischbarkeit

Legan kann mit anderen Fungiziden (Score Profi, Topas, Nimrod, Alibi Flora) und Insektiziden gemäss den Maag Profi Ratgeber gemischt werden.

Eigenschaften

Vorsichtsmassnahmen auf der Packung beachten.

Packungen

500 g, 12x 500 g

Version

72940/1121