

Regolatore di crescita per piante ornamentali

- Effetto rapido e durevole
- Foglie si un verde più intenso
- Ampio spettro d'applicazione

Principio attivo Paclobutrazolo 4 g/l

Formulazione Sospensione concentrata (SC)

Impiego

Tecnica di applicazione: effettuare la spruzzatura con un ugello fine; bagnare le piante in maniera uniforme senza tuttavia far sgocciolare la soluzione. Non irrigare nelle 24 ore successive. Rinunciare alle applicazioni per annaffiatura, in quanto nel terreno si formerebbero residui difficilmente degradabili. Non mischiare Bonzi® con altri prodotti.

Dosaggio: i seguenti rapporti di miscelazione hanno valore puramente indicativo. È indispensabile verificare il numero ottimale di trattamenti e la concentrazione appropriata nella propria azienda. In molti casi basta un solo trattamento, in altri casi sono necessari dei trattamenti successivi. Rispetto ai regolatori di crescita convenzionali, con Bonzi® è necessario un numero inferiore di trattamenti.

Coltura	Dosaggio	Coltura	Dosaggio
Ageratum	0,15–0,25%	Gnaphalium	0,25–0,5%
Anthemis	0,25%	Hibiscus	0,1–0,2%
Azalea	2,0–3,0%	Hydrangea / ortensie	0,5–1,0%
Begonia Elatior	0,25–0,5%	Impatiens Nuova Guinea	0,15–0,25%
Begonia tuberhybrida	0,25–0,5%	Impatiens walleriana	0,1–0,15%
Begonia Semperflorens	0,05–0,15%	Kalanchoe blossfeldiana	0,05–0,2%
Bellis	0,05–0,25%	Lantana camara	0,25–0,5%
Calceolaria rugosa e hybrida	0,15–0,25%	Lavatera	0,15–0,25%
Capsicum annum	0,25–0,5%	Lilium, in vaso	0,2–0,3%
Chrysanthemum frutescens	0,25–1,0%	Pelargonium	
Chrysanthemum indicum	0,5–1,5%	- plantule alla ripicchettatura	0,1%
Cuphea ignea	0,15–0,5%	- all'inizio della crescita longitudinale	0,1–0,25%
Dianthus, in vaso	0,2–0,3%	- nel vaso definitivo	0,25–0,5%
Euphorbia /Poinsettia	0,1–0,25%	Viola (colture in vaso)	0,05–0,25%
Fuchsia hybrida	0,1–0,5%	Petunia	0,1–0,25%

Ranunculus, ibridi (in vaso)	0,25-0,5%
Rose, in vaso	1,0-1,5%
Scaevola	0,25%
Senecio	0,25-0,5%
Surfinia	0,25-0,5%
Solanum	0,25-0,5%
Tagetes	0,25%
Verbena, ibridi	0,25-0,5%

Ai dosaggi consigliati, la quantità di soluzione da impiegare va adattata alla massa fogliare. Considerate la profusione di specie e varietà e la diversità delle condizioni colturali, si raccomanda di utilizzare le concentrazioni inferiori e di ripetere il trattamento se necessario.

Attenzione
Trattamenti frazionati

Con il termine «trattamento frazionato» si intende l'applicazione ripetuta di regolatori della crescita mediante spruzzature a concentrazione ridotta (generalmente alla metà della concentrazione normale).

I trattamenti frazionati si possono effettuare molto presto, vale a dire che non è più necessario attendere il completo radicamento delle piante. In questo modo si ottiene da subito una struttura compatta, stabile e ramificata.

I trattamenti frazionati sono generalmente più efficaci di un'unica spruzzatura a dosaggio pieno.

Tuttavia, se le piante sono in piena crescita, utilizzare le concentrazioni indicate nell'elenco summenzionato.

Azione

Bonzi® è un regolatore di crescita ad ampio spettro d'applicazione. Il prodotto limita l'allungamento degli internodi riducendo così la crescita longitudinale delle piante ornamentali. Bonzi® permette di produrre piante con le proporzioni desiderate, che si distinguono per l'ottima stabilità e per la colorazione intensa di foglie e fiori. Bonzi® agisce rapidamente; il trattamento va effettuato non appena si desidera arrestare la crescita. Bonzi® viene assorbito attraverso le foglie e le radici. La sua azione persiste più a lungo rispetto a quella di altri prodotti.

Caratteristiche

Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.

Confezione

1 l, 12 x 1 l

Marchio

® = marchio registrato di una società del gruppo Syngenta
