

Dithane® Neotec

Fungicida contro le malattie fungine in viticoltura, frutticoltura, orticoltura, campicoltura e per piante ornamentali

- Ampio spettro d'azione
- Ben tollerato dalle piante
- Favorisce la crescita

Principio attivo Macozeb 75%

Formulazione Granulare idrodispersibile (WG)

Impiego

Patate

3 kg/ha contro la peronospora e l'alternaria. Il primo trattamento va effettuato preventivamente su segnalazione del servizio d'allarme o in caso di rischio di infezione. Trattamenti successivi dopo 7-10 giorni a seconda del rischio di infezione e del tempo. Effettuare gli ultimi 2 o 3 trattamenti con l'aggiunta di 0,5 l/ha di Mapro. Periodo di attesa: 3 settimane; patate primaticce: 2 settimane.

Vite

0,25% contro la peronospora; 0,3% contro il rossore parassitario, l'escoriosi e il marciume nero. Ultimo trattamento entro metà agosto. Anche per 1 trattamento aereo all'anno.

Frutticoltura

0,15% contro la ticchiolatura della frutta a granello; 0,2 contro la vaiolatura della frutta a nocciolo e la ruggine del susino.

Periodo di attesa: 3 settimane.

Ortaggi

- Pomodori e melanzane 0,2 – 0,3% contro l'alternaria, la peronospora, la fitoftora e la maculatura fogliare. Periodo di attesa: 3 settimane.
- Fagioli 2 – 3 kg/ha contro l'antracnosi e la ruggine. Periodo di attesa: 3 settimane.
- Carote 2 – 3 kg/ha contro l'alternaria. Periodo di attesa: 3 settimane.
- Sedano rapa, sedano a coste 2 – 3 kg/ha contro la maculatura fogliare. Periodo di attesa: 3 settimane.
- Specie di cavolo (solo allevamento di piantine) 2 – 3 kg/ha contro la peronospora.
- Lattuga cappuccio 1,6 kg/ha contro la peronospora. Applicazione entro 14 giorni dalla messa a dimora definitiva.
- Asparagi 0,2 – 0,3% contro la maculatura nera.
- Cipolle 2 – 3 kg/ha contro la peronospora. Periodo di attesa: 3 settimane.

Piante ornamentali

0,2 – 0,3% contro la maculatura fogliare, la peronospora e la ruggine. 500 g/m³ mescolati alla terra dei vasi contro i funghi patogeni del suolo. 0,2 – 0,3% contro la ticchiolatura della rosa. 0,2 – 0,3% contro i funghi patogeni del tappeto erboso; 0,4% contro le malattie fungine delle conifere (caduta degli aghi); 0,4% contro la ruggine del ginepro in vivaio.

Dithane® Neotec

Preparazione della soluzione	Versare Dithane® Neotec in 1/10 della quantità di acqua richiesta, lasciare depositare il prodotto, dopodiché mescolare vigorosamente e rabboccare.
Attenzione	Non spruzzare Dithane® Neotec sulle facciate delle case.
Miscibilità	Dithane® Neotec è miscibile con gli insetticidi, i fungicidi e i concimi fogliari indicati nella guida Syngenta.
Azione	Dithane® Neotec si distingue per l'ampio spettro d'azione e di applicazione. La nuova formulazione Neotec è vantaggiosa per l'utente (formazione ridotta di polvere e preparazione più semplice della soluzione) e ha una migliore efficacia. Grazie allo scioglimento rapido del granulato si ottiene una soluzione omogenea, che aderisce meglio alla superficie fogliare ed è più resistente alla pioggia. Il principio attivo agisce per contatto. Dithane® Neotec va utilizzato preventivamente e deve poter asciugare a sufficienza in modo da formare una pellicola protettiva continua. Il grande effetto iniziale e il buon effetto persistente contraddistinguono questo prodotto. Dithane® Neotec è ben tollerato dalle piante e stimola la crescita.
Caratteristiche	Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.
Confezione	1kg (10x 1kg)
Marchio	® Registered trademark of Dow AgroSciences, Deutschland
