

Fungicida sistemico contro la peronospora e i funghi patogeni del suolo (*Phytophthora*, *Phytium*) di piante ornamentali

- **Azione preventiva e curativa**
- **Ben tollerato dalle piante**
- **Intervalli dei trattamenti più lunghi**

Principio attivo Metalaxil-M (480 g/l)

Formulazione Concentrato solubile in acqua (SL)

Impiego

Piante ornamentali

Annaffiatura: 0,01–0,02%, primo trattamento subito dopo la piantagione, secondo trattamento dopo 3 settimane. Massimo 2 trattamenti per coltura.

Spruzzatura: 0,02%. Massimo 3 trattamenti per coltura.

Trattamento di substrati: 25 ml/m³ di terriccio. Mescolare al terriccio prima della messa in coltura o incorporare allo strato superficiale del terreno.

Erbe aromatiche

Spruzzatura: 0,02–0,022%. Periodo di attesa: 3 settimane

Considerate la diversità dei metodi di coltura e la profusione di specie e varietà, si consiglia di verificare la tollerabilità del prodotto su una piccola superficie prima di impiegarlo in modo esteso. Una verifica della tollerabilità è consigliata soprattutto prima dell'impiego di Fonganiil® su specie che non figurano nel seguente elenco.

In base alle nostre prove, eseguite secondo il modo d'uso raccomandato, Fonganiil® è ben tollerato dalle piante ornamentali seguenti: Ageratum, Alstroemeria, Alyssum, Anthurium, Antirrhinum, Aphelandra, Aralia, Asplenium, Aucuba, Azalea, Begonia, Clerodendrum, Calluna, Camellia, Celosia, Columnea, Chamaecyparis, Chrysanthemum, Cineraria, Cissus, Crocus, Croton, Cuphea, Cyclamen, Daboëcia, Dianthus, Dieffenbachia, Douglasia, Draceana, Echeveria, Erica, Ficus, Geranium, Gerbera, Gloxinia, Hedera, Hyacinthus, Impatiens, Iris, Juniperus, Kalanchoe, Larix, Ligustrum, Lillium, Matthiola, Monstera, Pelargonium, Peperomia, Petunia, Philodendron, Photinia, Pilea, Pinus, Pittosporium, Poinsettia, Pseudotsuga, Phipsalis, Rhododendron, Rizinus, Saintpaulia, Salvia, Schefflera, Scindapsus, Sedum, Solanum, Syngonium, Tagetes, Tamarix, Tulipa, Verbena, Vinca, Viola.

Preparazione della soluzione Versare mescolando la quantità misurata di Fonganiil® nella quantità di acqua richiesta.

Attenzione

Annaffiare solo pani di terra umidi in modo che il prodotto possa penetrare a fondo.

Per combattere l'eventuale comparsa di altri agenti patogeni, come ad esempio Rhizoctonia, Botrytis e Fusarium, sono necessari trattamenti aggiuntivi con altri prodotti.

Fonganiil®

Miscibilità	Si consiglia di utilizzare Fonganiil® da solo. Eventuali miscele con altri fungicidi e insetticidi andrebbero prima testate tenendo conto delle diverse proporzioni.
Azione	Fonganiil® ha un'azione sia sistemica, sia preventiva. Il principio attivo viene assorbito attraverso le radici e distribuito in tutta la pianta. Nel caso in cui i sintomi della malattia siano già visibili, con Fonganiil® è possibile interrompere la crescita del fungo e impedirne l'ulteriore diffusione.
Confezione	250 ml, 20 x 250 ml
Marchio	® = marchio registrato di una società del gruppo Syngenta
