

Erbicida di postemergenza contro le malerbe a foglia larga in tappeti erbosi e campi sportivi

- Elimina le malerbe resistenti come aparine, viole, canapette e veronica
- Effetto rapido, sicuro e completo
- Può essere utilizzato con temperature a partire da 5 °C

Principi attivi Bifenox 300 g/l / Ioxynil 92 g/l / MCP-P 260 g/l

Formulazione Sospensione concentrata (SC)

Impiego 50 ml di Foxtril® P in 10 litri di acqua; distribuire uniformemente.
Trattare soltanto con terreno umido e cielo coperto o nuvoloso. Nell'anno della semina, per combattere le malerbe usare Duplosan® KV-Combi al posto di Foxtril® P.
In caso di forte presenza di trifoglio, margherite e malerbe infestanti si consiglia di miscelare 40 ml di Foxtril® P con 40 ml di Duplosan® KV-Combi in 10 litri di acqua.

Miscibilità Miscela con Duplosan KV-Combi: sciogliere i prodotti in successione.

Attenzione Dopo l'uso pulire a fondo gli spruzzatori (filtro e tubi flessibili inclusi) con l'aggiunta di carbonato di sodio o di un detergente sgrassante e sciacquare con abbondante acqua.
Attenzione nei pressi di piante coltivate particolarmente sensibili. Già piccole quantità (tracce) di Foxtril® P possono danneggiare gravemente viti, ortaggi, trifoglio, ecc.

Rotazione Dopo l'impiego di Foxtril® P non sussistono limitazioni nella rotazione delle colture.
In caso di dissodamento anticipato, dopo tre settimane e in seguito all'aratura è possibile riseminare ogni tipo di coltura.

Azione I tre principi attivi di Foxtril® P sono complementari, per uno spettro d'azione che comprende tutte le principali malerbe annuali da seme.
Il bifenox agisce per contatto sulle malerbe esistenti, nonché su quelle in germinazione, appena spuntano dal terreno.
Lo ioxynil agisce solo per contatto.
L'MCPP-P è una sostanza assorbibile dalle piante e agisce bloccandone la crescita.

Spettro d'azione	
Amaranto	●
Margherita	○
Mercorella	●
Romice (plantule)	●
Romice (piante grandi)	○
Ortica	○
Prunella	●
Cardo (campestre)	○
Veronica, specie	●
Fumaria	●
Galinsoga	●
Ventagliana	●
Graspino	●
Farinello	●
Edera terrestre	●
Bugula	●
Ranuncolo (dei campi)	○
Ravanello selvatico	●
Erba storna	●
Borsapastore	●
Canapetta	●
Tossilaggine	○
Erba aglina	●
Camomilla	●
Patata, icacci	◆
Caglio asprello	●
Trifoglio, specie	○
Poligono periscaria	●
Poligono centinodia	◆
Poligono convolvolo	●
Senecio	●
Tarassaco	○
Atriplice	●
Menta	○
Papavero	●
Colza, ricacci	●
Senape selvatica	●
Girasole	● ¹⁾
Viola	●
Geranio	● ¹⁾
Crescione palustre	◆
Falsa ortica	●
Nontiscordardimé	●
Centocchio	○
Piantaggine	○
Pisello odoroso	●
Convolvolo	○
Anemone	○

1) Fino allo stadio di 2 foglie

- Effetto totale
- Effetto parziale
- ◆ Effetto insufficiente

Caratteristiche Osservare scrupolosamente le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.

Confezione 1 l, 12 x 1 l

Marchio ® = Marchio registrato della FCS Feinchemie Schwebda GmbH