

Contro ruggine, ticchiolatura e altre malattie fogliari di piante ornamentali

- Ampio spettro d'azione
- Ben tollerato dalle piante
- Non macchia

Principio attivo Fenbuconazolo 50 g/l, famiglia chimica: triazoli

Formulazione Emulsione olio/acqua (EW)

Modo d'uso **Colture coperte e in pieno campo**
0,2% (20 ml in 10 litri di acqua) contro ramularia (primula), maculatura fogliare da mycoцентrospora (viola), ruggine delle piante ornamentali e ticchiolatura della rosa. Indar® 5EW ha anche un'azione secondaria contro l'oidio.
Bagnare bene le piante su tutti i lati.
Trattare preventivamente ogni 10-14 giorni; in caso di infestazione o rischio acuto di infestazione impiegare il prodotto ogni 7 giorni.
Ippocastano
0.2% contro l'imbrunimento fogliare; dall'apertura delle gemme ripetere 2-3 volte il trattamento a intervalli di 3-4 settimane.

Miscibilità Indar® 5EW è miscibile con Dithane NeoTec, Kendo®, Marshal®, Vertimec® e Wuxal® concimi fogliari. Miscela con Marshal® o altri prodotti fortemente umettanti: impiegare su piante in fiore solo se dopo il trattamento hanno modo di asciugare rapidamente.

Attenzione

- In generale Indar® 5EW è ben tollerato dalle colture. Per le colture in serra è indispensabile che le piante abbiano modo di asciugare rapidamente dopo il trattamento.
- Senza esperienza pratica con il prodotto in condizioni paragonabili (varietà, colture, miscele, ecc.), va eseguito un trattamento di prova con alcune piante per verificarne la tollerabilità prima dell'applicazione estesa.

Indar® 5 E W



veramente efficace

Azione	<p>Indar® 5EW è un fungicida sistemico ad azione preventiva e curativa contro ruggine, ticchiolatura, ramularia, mycocentrospora e altre malattie fogliari delle piante ornamentali. Non macchia.</p> <p>Possiede inoltre una notevole azione secondaria contro l'oidio. Indar® 5EW agisce anche contro l'imbrunimento fogliare dell'ippocastano.</p> <p>Il principio attivo penetra entro un'ora attraverso le foglie. Grazie alle sue proprietà sistemiche, Indar® 5EW è in grado di arrestare un'infezione in corso. Si raccomanda tuttavia di utilizzare Indar® 5EW preventivamente, prima che si manifestino i sintomi di infestazione.</p> <p>Il principio attivo inibisce la biosintesi degli steroli (sterolo C14 demetilasi) nei funghi, agendo in diversi stadi di sviluppo delle malattie fungine.</p>
Caratteristiche	Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.
Confezione	1 l, 12 x 1 l
Marchio	® = marchio registrato della Dow AgroSciences, D.
