

Regolatore di crescita per tappeti erbosi, campi da golf e campi sportivi

- **Esente da classe di tossicità, non lascia residui nel terreno e si decompone rapidamente alla luce**
- **Inodore, facile da dosare**
- **Miscibile con fungicidi Maag/Syngenta e con altri prodotti per il tappeto erboso**
- **Per tutte le superfici erbose**

Principio attivo Trinexapac-etile 11,3% (120,9 g/l)

Formulazione Concentrato solubile in acqua (SL)

Modo d'uso Dosaggio: 0,4 – 3,2 l/ha
Il dosaggio viene stabilito in funzione del genere di tappeto erboso, della specie di erba più ricorrente e dell'effetto desiderato (inibizione più o meno marcata della crescita).

Campi da golf e polo
Green (0,4 l/ha), Fairway (sfalcio < 18mm, 0,8-1,6 l/ha), in caso di forte presenza di Lolium fino a massimo 2,4 l/ha.

Tappeti erbosi e campi sportivi
Specie di festuca e poa 2,4 l/ha, in caso di forte presenza di Lolium massimo 3,2 l/ha.

I trattamenti vanno ripetuti a intervalli di 4 settimane e solo su prati in piena crescita. Se il manto erboso si trova in condizioni di stress non effettuare trattamenti; rispettare un intervallo di due settimane prima o dopo lavorazioni intensive (ad es. arieggiamento).
Ripetendo i trattamenti a intervalli più brevi (2 settimane), è possibile ridurre il dosaggio.
In caso di forte presenza di Poa annua, dimezzare il dosaggio per evitare ingiallimenti.

Attenzione Primo Maxx® può causare un momentaneo ingiallimento dell'erba. È possibile ridurre questo rischio ammendando le superfici erbose con un concime azotato.
Non impiegare in caso di forte siccità.
Applicare al massimo 16 l/ha all'anno di Primo Maxx® sulla stessa superficie.
Trattamenti regolari con Primo Maxx® permettono di contenere lo sviluppo di Poa annua.
Applicare idealmente 1 ora dopo lo sfalcio.

Azione	<p>Primo Maxx® inibisce la crescita longitudinale delle specie di erba di tappeti erbosi ornamentali e sportivi. Il prodotto influisce sul meristema apicale e l'effetto inibitore della crescita subentra 3-5 giorni dopo il trattamento. Il principio attivo viene assorbito attraverso le foglie. Un'ora dopo il trattamento lo strato di soluzione è resistente alla pioggia.</p> <p>Gli altri interventi di cura del manto erboso come irrigazione, concimazione, lotta contro le malerbe e le malattie possono continuare come di consueto. Anche le condizioni ambientali, i fattori agronomici e gli altri interventi di cura influenzano la crescita dell'erba e di conseguenza l'effetto di Primo Maxx®. Sono in particolare la concimazione, l'umidità e gli intervalli di taglio a incidere maggiormente sull'effetto inibitore della crescita esercitato dal prodotto.</p> <p>Impiegando correttamente Primo Maxx® è possibile ridurre le tosature fino al 50% (meno residui di sfalcio). L'erba preserva una colorazione verde intensa e viene favorita la crescita vegetativa. Primo Maxx® inibisce la fioritura di Poa annua e Poa trivialis permettendo di contenerne lo sviluppo.</p> <p>Se applicato su campi sportivi, Primo Maxx® migliora il rotolamento dei palloni e le demarcazioni risultano più visibili.</p>
Caratteristiche	<p>Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.</p> <p>Il prodotto è innocuo per gli insetti utili. Primo Maxx® non è persistente e l'emivita del principio attivo è molto breve. Primo Maxx® non è volatile né dilavabile.</p>
Confezione	1 l, 12 x 1 l
Marchio	® = marchio registrato di una società del gruppo Syngenta
