

Contro le graminacee annuali in vivai e colture ornamentali, panichi e malerbe da semi incluse

- Adatto a tutti gli arbusti già a partire dal 2° anno
- Combatte le malerbe resistenti alla triazina
- Un singolo trattamento in primavera è sufficiente

Principio attivo Orizalina 480 g/l

Formulazione Sospensione concentrata (SC)

Modo d'uso **Vivai, arbusti ornamentali**

6–8 l/ha contro specie di panichi, plantule di loglio, fienarola, amaranto, farinello, portulaca e centocchio. Impiegare da febbraio ad aprile su terreno privo di malerbe.

Siccome Surflan® non agisce sulle foglie, se sono già presenti malerbe sarà necessario aggiungere un erbicida fogliare (ad es. Touchdown® o Roundup® Ultra). In caso di forte presenza di malerbe, prima del trattamento eliminare la vegetazione esistente.

Surflan® Ultra può essere utilizzato su tutte le specie arbusti a partire dal 2° anno. Sino al rigonfiamento delle gemme Surflan® può essere applicato dall'alto. A partire dal germogliamento, evitare qualsiasi contatto del prodotto con gemme e foglie.

Se si preparano miscele, attenersi alle limitazioni e alle prescrizioni d'uso del secondo prodotto.

Attenzione Può causare un forte ingiallimento delle foglie e dei rami più bassi di alcune specie di rose e arbusti ornamentali.

Effetto Surflan® viene assorbito dai germogli delle malerbe quando spuntano dalla superficie del terreno. Pertanto, agisce solo se applicato prima della germinazione.

Surflan® viene trattenuto dallo strato superiore del terreno. Perché abbia effetto, il terreno deve essere molto umido. È importante effettuare il trattamento all'inizio della stagione (febbraio-marzo), in modo che le precipitazioni primaverili attivino il prodotto prima della germinazione delle malerbe. L'azione del prodotto perdurerà sino ad agosto-settembre, a seconda del dosaggio.

Surflan® impedisce la divisione cellulare della malerba e blocca lo sviluppo radicale delle plantule. Grazie a questo meccanismo d'azione, Surflan® è efficace anche su panichi e amaranto resistenti alla triazina.

Spettro d'azione	Malerbe	Effetto	Malerbe	Effetto
		Amaranto, specie	●	Senecione
	Romice, specie	◆	Tarassaco comune	◆
	Cardo, specie	◆	Atriplice	●
	Veronica, specie	◆	Morella	●
	Galinsoga	◆	Portulaca	●
	Grespino dei campi	◆	Gramigna comune	◆
	Farinello comune	●	Loglio (plantule)	●
	Ravanello selvatico	◆	Fienarole	●
	Erba storna	◆	Senape selvatica	◆
	Panichi	●	Viola	◆
	Borsapastore	◆	Geranio	◆
	Camomilla	◆	Falsa ortica	◆
	Saeppola canadese	◆	Centocchio comune	●
	Caglio asprello	◆	Piantaggine	◆
	Poligono, specie	◆	Convolvolo	◆

● Effetto totale ◆ Effetto insufficiente

Caratteristiche Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.

Confezione 1 l, 10 x 1 l

Marchio ® = marchio registrato della Dow AgroSciences.