

	Saat	Keimung	Wachstum	Pikieren	Wachstum	Topfen	Wachstum	Blühbeginn	Verkauf	Pflanzbeete	
W	1	2	3-6	7	8-11	11	12-17	18	18-20	ab 18	
Σ	M.Jan.	E.Jan	A.Febr.-A.März	M.März	M.März-A.April	M.April	M.Apr.-M.Mai	M.Mai	ab Mai	ab Mai	
											<b>Begonia semperflorens (Eisbegonie)</b> <b>8-er Topf oder Multipack für Verkauf M.Mai</b> Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger
											<b>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</b> <b>Vermehrungspilze, Wurzelpilze:</b> Previcur Energy 0,25 % giessen, sofort nach der Saat. <b>Tipp:</b> Nach Durchwurzelung wiederholt giessen mit 0,15 %. Alternativ kann auch Fonganil angewendet werden. <b>Vermehrungspilze, Wurzelfäule:</b> Fonganil 0,02 % giessen, nach dem Pikieren. <b>Tipp:</b> Alternative ist Previcur Energy. Schützt vorbeugend gegen Falschen Mehltau. <b>Blattläuse, Weisse Fliegen:</b> 1 g/l Substrat 1 Woche nach dem Topfen streuen. Nach dem Streuen Granulat einwässern. <b>Tipp:</b> Wirkt über mehrer Wochen. Alternative zum Streuen und Einwässern ist Flagship hält aber nicht so lange an. <b>Trauermücken und -larven:</b> 0,01 % (1 ml/10 l Wasser) spritzen. <b>Tipp:</b> Substrat-oberfläche gut benetzen. Anwendung in Abständen von 5 Tagen wiederholen bis keine Adulten mehr auffliegen. Dadurch wird Lebenszyklus unterbrochen. <b>Graufäule:</b> Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen und Pflanzen gut besprühen. <b>Tipp:</b> Klimaführung für Abtrocknen und nicht zu hohe Luftfeuchte nutzen. <b>Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen:</b> 0,2 % giessen. <b>Tipp:</b> Giessen über die Pflanze hinweg wirkt als Blattdüngung. Dann bei vollständig bedecktem Himmel oder abends giessen. Dies fördert Wurzelbildung und Nährstoffaufnahme erhöht. <b>Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern:</b> 0,25 % spritzen oder giessen. <b>Tipp:</b> Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen. <b>Blattfressende Raupen, Thripse:</b> 0,6–0,8 % und 6–8 ml/10 m <sup>2</sup> (60–80 ml/10 l Wasser). <b>Minierfliegen:</b> 0,8–1,6 % bei 8–16 ml/10 m <sup>2</sup> (80–160 ml/10 l Wasser). <b>Tipp:</b> Translaminare Wirkung, dringt in grüne Pflanzenteile ein. <b>Blattläuse, Weisse Fliegen, Minierfliegen, Thrips:</b> 0,01 % spritzen. <b>Tipp:</b> Netzmittel Etalfix Pro oder Blattdünger Wuxal Profi verbessern die Wirkung. <b>Blattläuse, Weisse Fliegen:</b> 0,04-0,06 % spritzen. Höhere Dosierung gegen Weisse Fliegen. <b>Tipp:</b> Netzmittel oder Wuxal Profi verbessert die Wirkung. Resistenzmanagement: Alternativ Kendo einsetzen. <b>Blattläuse, Weisse Fliegen:</b> 0,02-0,04 % spritzen. <b>Tipp:</b> Alternative zum Streuen und Einwässern ist Actara G Profi (kein Netzmittel). <b>Blattläuse, Weisse Fliegen, Thrips, Spinnmilben und Minierfliegen:</b> Plenum WG 0,04-0,06 % + Kendo 0,01 % spritzen. <b>Tipp:</b> Sehr breit wirkende Kombination. Gegen Weisse Fliegen Dosierung von Plenum WG mit 0,06 %.
											Previcur Energy
											Fonganil
											Actara G Profi
											Kendo
											Play
											Wuxal Profi
											Hicure
											NEU Perfetto
											Kendo
											Plenum WG
											Flagship
											Plenum WG
											+ Kendo

	Saat	Keimung	Wachstum	Pikieren	Wachstum	Topfen	Wachstum	Blühbeginn	Verkauf	Pflanzbeete	
W	1	2	3-6	7	8-11	11	12-17	18	18-20	ab 18	
Σ	M.Jan.	E.Jan	A.Febr.-A.März	M.März	M.März-A.April	M.April	M.Apr.-M.Mai	M.Mai	ab Mai	ab Mai	
											<b>Begonia semperflorens (Eisbegonie)</b> <b>8-er Topf oder Multipack für Verkauf M.Mai</b> Insektizide    Fungizide    Herbizide    Netzmittel    Hemmstoff    Dünger
				NEU	Vertimec Gold + Plenum WG						<b>Blattläuse, Weisse Fliegen, Thrips, Spinnmilben und Minierfliegen:</b> Vertimec 0,025 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. <b>Tipp:</b> Mischung mit sehr breiter Wirkung. Gegen Weisse Fliege Plenum mit WG 0,06 % dosieren.
					Match Profi						<b>Thrips:</b> 0,2 % spritzen. <b>Tipp:</b> Netzmittel oder Blattdünger Wuxal Profi erhöht die Wirkung.
				NEU	Vertimec Gold						<b>Weichhautmilben, Thrips, Spinnmilben, Weisse Fliegen:</b> 0,025 % spritzen. <b>Tipp:</b> In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur im Gewächshaus) anwenden. Nebenwirkung auf Blattählsen. Blüten nicht behandeln.
					Vertimec						<b>Weichhautmilben, Thrips, Spinnmilben, Weisse Fliegen:</b> 0,025 % spritzen. <b>Tipp:</b> In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur im Gewächshaus) anwenden. Nebenwirkung auf Blattählsen. Blüten nicht behandeln.
					Match Profi + Plenum WG oder + Flagship						<b>Thrips, Blattläuse und Weisse Fliegen:</b> Match Profi 0,2 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. <b>Tipp:</b> Weisse Fliegen Plenum WG 0,06 % in den frühen Morgenstunden anwenden wenn sie weniger beweglich sind. Resistenzmanagement: Flagship statt Plenum WG.
					Zenar						<b>Spinnmilben:</b> 0,04 % spritzen. <b>Tipp:</b> Resistenzmanagement: Statt Zenar Vertimec der Spritzbrühe zusetzen.
							+ Ealfix Pro oder + Wuxal Profi				<b>Zusatz von Netzmittel oder netzenden Blattdüngen Wuxal:</b> Ealfix Pro 0,02 % oder Wuxal Profi 0,2 % der Spritzbrühe zusetzen. <b>Tipp:</b> Bei Zusatz von Blattdünger Spritzung nur abends oder bei vollständig bedecktem Himmel. Blattdünger wirken vitalisierend auf die Blätter und fördern auch die Aktivität und Nährstoffaufnahme der Wurzeln.
							Nimrod				<b>Echter Mehltau:</b> 0,1-0,2 % spritzen. Blühende Pflanzen mit 0,1 % spritzen. <b>Tipp:</b> Blühende Pflanzen nur leicht betauen. Keine Tankmischungen anwenden. Überdosierung vermeiden!
							Score Profi				<b>Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Rost:</b> 0,05 % spritzen. <b>Tipp:</b> Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, Spezialist gegen Blattflecken, sehr verträglich, fleckt nicht.
							Topas				<b>Echter Mehltau:</b> 0,025 % spritzen. <b>Tipp:</b> Resistenzere Sorten bevorzugen.
							Tega				<b>Falscher Mehltau, Graufäule:</b> Tega 0,05 % spritzen. <b>Tipp:</b> Kein Netzmittel zusetzen. Resistenzmanagement: Statt Tega Fongamil oder Dithane Neotec verwenden.

	Saat	Keimung	Wachstum	Pikieren	Wachstum	Topfen	Wachstum	Blüh- beginn	Verkauf	Pflanz- beete	
☞	1	2	3-6	7	8-11	11	12-17	18	18-20	ab 18	
☞	M.Jan.	E.Jan	A.Febr.-A.März	M.März	M.März-A.April	M.April	M.Apr.-M.Mai	M.Mai	ab Mai	ab Mai	
											<b>Begonia semperflorens (Eisbegonie)</b> <b>8-er Topf oder Multipack für Verkauf M.Mai</b> Insektizide   Fungizide   Herbizide   Netzmittel   Hemmstoff   Dünger
											<b>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</b> <b>Blattfleckenkrankheiten:</b> 0,2 % spritzen. Netzmittel Etalfix Pro 0,02 % gegen Spritzflecken zusetzen. <b>Tipp:</b> Für alle Pflanzen besser verträglich.
											<b>Bakteriose Xanthomonas:</b> 0,15 % (15 g/10 l Wasser) und 1,5 kg/ha als Prophylaxe. <b>Tipp:</b> Netzmittel Etalfix Pro 0,02 % gegen Spritzflecken zusetzen.
											<b>Bakteriose Xanthomonas:</b> 0,1 % als Prophylaxe spritzen. <b>Tipp:</b> Netzmittel Etalfix Pro 0,02 % gegen Spritzflecken zusetzen.
											<b>Langzeitdünger: Plantomaag Normal</b> Aufdüngung von Topfsubstraten: mässig nährstoffbedürftige Kulturen: 0,75 kg/m <sup>3</sup> , normal nährstoffbedürftige Kulturen: 1,0 kg/m <sup>3</sup> und stark nährstoffbedürftige Kulturen: 1,5–2,0 kg/m <sup>3</sup> . <b>Plantomaag Mix 4M</b> für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. <b>Tipp:</b> Wirkung Plantomaag Normal 2-3 und Plantomaag 4 M bis 4 Monate zumischen. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.
											<b>Wachstumsregulierung:</b> 0,25-0,5 % spritzen. <b>Tipp:</b> Bei beginnendem Längenwachstum evtl. wiederholen.
											<b>Echter Mehltau:</b> Blühende Pflanzen mit 0,1 % spritzen. <b>Tipp:</b> Blühende Pflanzen nur leicht betauen. Keine Tankmischungen anwenden. Überdosierung vermeiden!
											<b>Pflanzbeetdüngung:</b> Für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat, bedürftige Kulturen: 3,5 g/l Substrat einarbeiten. <b>Tipp:</b> Wirkt bis zu 6 Monate.

NEU