

Annahme	Einwintern	Winterruhe	Auswintern	Rückgabe	Kübelpflanzen allgemein, Überwinterung
					<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger </div>
A. Okt.	M.-E. Oktober	November bis Februar	März	April bis Mai	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp Bodenpilze: Folpet DG 150-300 g/m ³ ins Substrat zum Umtopfen mischen. Tipp: Der Erde zumischen um Neuinfektionen vorzubeugen. Bodenpilze (Phytophthora, Phytium): 0,01–0,02% giessen. Tipp: Erste Behandlung unmittelbar bei Empfang der Pflanzen. Weitere Behandlungen bei Gefahr für boden-bürtige Krankheiten. Auf feuchten Ballen giessen, so kann der Wirkstoff tief eindringen. Spinnmilben, Thrips, Minierfliegen, Weisse Fliege: Vertimec 0,025 % + Blattläuse, Weisse Fliegen: Plenum 0,06 % spritzen. Tipp: Spritzung um Pflanzen schädlingfrei einzuwintern. Der Spritzbrühe Wuxal Profi 0,2 % oder Etalfix Pro 0,02 % zur gleichmässigeren Benetzung zufügen. Für optimale Wirkung bei 15-20 °C behandeln. Vermehrungspilze, Wurzelhalsfäulen: Previcur 0,15 % + Folpet 0,12 % giessen. Tipp: Previcur Energy z.B. nach Pflanzenteilung angewendet hat pflanzenstärkende Wirkung und erhöht damit die Resistenz gegenüber Bakteriosen. Eisenmangel, Verbesserung Blattfarbe: 0,2 % giessen. Tipp: Beim Giessen die Blätter nicht treffen. Benetzte Blätter abwaschen um Verbrennungen zu vermeiden. Netzmittel, fördert Verteilung und Eindringen: 0,02 % spritzen. Tipp: Mischmöglichkeiten siehe Ratgeber. Nicht mit Blattdüngern mischen. Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen. Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittlersatz zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme. Blattläuse, Weisse Fliegen: Actara G Profi 1-2 g/l Substrat bei Töpfen kleiner 10 l und 30 g/m ² bei Pflanzgefässen > 10 l Substrat. Tipp: Nebenwirkung auf Dickmaulrüssler. Für Pflanzen, die nicht blühen. Ideal zum Sanieren der Pflanzen und als Service bei Übergabe. Algen, Flechten, Mosse (Bryophyta) und Lebermoose: Spritzbrühe im Verhältnis 1 Teil MossKade zu 10 Teilen Wasser mischen. Tipp: MossKade nur mit grosser Flachstrahldüse (z.B. TeeJet 8005) ausbringen. Algen, Moos und Lebermoos gründlich benetzen. Langzeitdünger: Plantomaag Normal: Aufdüngung von Topfsubstraten: mässig nährstoffbedürftige Kulturen: 0,75 kg/m ³ , normal nährstoffbedürftige Kulturen: 1,0 kg/m ³ und stark nährstoffbedürftige Kulturen: 1,5–2,0 kg/m ³ . Tipp: Wirkung 2-3 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.
Folp.					
Fonganil					
Vertimec Gold	NEU				
Plenum WG					
Previcur Energy					
+ Folpet DG					
Sequestrene Rapid					
Etalfix Pro					
Hicure					
Wuxal Profi					
Actara G					
NEU MossKade		MossKade			
Plantomaag Normal			Plantomaag Normal		

Annahme	Einwintern	Winterruhe	Auswintern	Rückgabe	Kübelpflanzen allgemein, Überwinterung	
					<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger </div>	
	A. Okt.	M.-E. Oktober	November bis Februar	März	April bis Mai	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp Langzeitdünger: Plantomaag Mix 4M/6M für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. Tipp: Wirkung 4 M bis 4 und 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau. Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert Blattgrün. Nicht in die Blüten. Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen. Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Rost: 0,05 % spritzen Tipp: Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, Spezialist gegen Blattflecken, sehr verträglich, fleckt nicht. Blattflecken, Echter Mehltau, Falscher Mehltau: Indar 0,2 % + Dithane 0,3 % spritzen, nach dem Pikieren. Tipp: Ridomil Gold statt Dithane wenn bei Pflanzen die Gefahr für Falschen Mehltau gross ist. Blattflecken-Krankheiten, Echter Mehltau, Falscher Mehltau: Indar 0,15 % + Ridomil 0,25 % spritzen. Blattfleckenkrankheiten, Falscher Mehltau, Bakteriosen: Cuprofix Fluid 0,4 %, Cuprofix 35 0,7 % oder Cuprofix 0,2 %. Tipp: Der Spritzbrühe Blattdünger Wuxal Profi 0,02 % oder Netzmittel Etalfix Pro 0,02 % zufügen verbessert die gleichmässige Benetzung und verhindert Spritzflecken. Graufäule: Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen, in Kulturen für Herbstverkauf oder nach dem Auswintern. Blatrfressende Raupen, Thripse: 0,6–0,8 % und 6–8 ml/10 m ² (60–80 ml/10 l Wasser). Minierfliegen: 0,8–1,6 % bei 8–16 ml/10 m ² (80–160 ml/10 l Wasser). Tipp: biologischer und teilsystemischer Wirkstoff. Blattläuse, Raupen, Thrips: 0,01 % spritzen. Tipp: Sehr gute Wirkung bereits ab 5 °C. Kann gut mit Play gegen Botrytis kombiniert werden. Spinnmilben: Zenar 0,04 % spritzen. Tipp: Für Behandlung optimale Temperatur > 15 °C.
		Plantomaag Mix 4M / 6M		Plantomaag Mix 4M / 6M		
		Wuxal Suspension Mg				
		Wuxal Suspension Mn				
		Score Profi				
		Indar 5 EW				
		+ Dithane Neotec				
		Indar 5 EW				
		+ Ridomil Gold				
		Cuprofix Fluid				
		oder				
		Cuprofix 35				
		oder				
		Cuprofix				
		Play				
	NEU	Perfetto				
		Kendo				
		Zenar				

	Annahme	Einwintern	Winterruhe	Auswintern	Rückgabe	Kübelpflanzen allgemein, Überwinterung										
	A. Okt.	M.-E. Oktober	November bis Februar	März	April bis Mai	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger					
						Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp										
		NEU	Vertimec Gold				Spinnmilben, Thrips, Minierfliegen, Weisse Fliegen: Vertimec 0,025 % spritzen. Tipp: Für optimale Behandlung Temperatur > 15 °C und Netzmittel zufügen.									
			Vertimec				Spinnmilben, Thrips, Minierfliegen, Weisse Fliegen: Vertimec 0,025 % spritzen. Tipp: Für optimale Behandlung Temperatur > 15 °C und Netzmittel zufügen.									
			Match Profi				Thrips: 0,1 % spritzen, nur unter Glas. Tipp: Abwechseln mit anderen Produkten (Kendo, Vertimec) um Resistenzen vorzubeugen.									