

	Saat	Keim- ung	Wachs- tum	Pikie- ren	Wachstum	Top- fen	Wachstum	Kno- spe	Blüh- beginn	Verkauf	<b>Primula vulgaris (Kissenprimel)</b> <b>9er-Topf</b>							
☞	1	2-3	4-5	6	7-11	12	13-30	32-33	34-35	36-40	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger		
≥	A.Juli	M.-E.Juli	A.Aug.	M.Aug.	E.Aug.-M.Sep.	E.Sept.	A.Okt.-M.Jan.	E.Jan.	M.Feb.	E.Feb.-E.März	<b>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</b>							
		Sequestrene Rapid					Sequestrene Rapid + Wuxal Profi					Eisenmangel: 100 g/m <sup>3</sup> der Pflanzerde beimischen oder Eisenmangel im Frühjahr, Verbesserung Blattfarbe: Sequestrene 0,2 % + Allgemeine Düngung: Wuxal Profi 0,2 % giessen. Tipp: Beim Giessen die Blätter nicht treffen. Benetzte Blätter abwaschen um Verbrennungen zu vermeiden.						
		Previcur Energy										Vermehrungspilze, Wurzelhalsfäulen: Previcur 0,15 % giessen, nach dem Pikieren. Tipp: Previcur Energy fördert die Resistenz der Pflanze und hat damit einen präventiven Nebeneffekt auf Bakteriosen.						
		Hicure										Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.						
		Wuxal Profi										Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.						
		Wuxal Suspension Mn										Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.						
		Limax Power										Schnecken: 5 g/10 m <sup>2</sup> spritzen. Tipp: Vorbeugend bei kleiner Pflanze streuen, damit die Schneckenkörner nicht auf den Blättern liegen bleiben.						
			NEU	Perfetto										Blatffressende Raupen, Thripse: 0,6–0,8 % und 6–8 ml/10 m <sup>2</sup> (60–80 ml/10 l Wasser). Minierfliegen: 0,8–1,6 % bei 8–16 ml/10 m <sup>2</sup> (80–160 ml/10 l Wasser). Tipp: biologischer und teilsystemischer Wirkstoff.				
				Kendo + Etalfix Pro										Blattläuse, Raupen, Thrips: Kendo 0,01 % + Netzmittel: Etalfix Pro 0,02 % spritzen. Tipp: Kendo wirkt als Frass- und Kontaktmittel bereits ab 5 °C.				
				Match Profi + Etalfix Pro										Thrips: Match 0,1 % (nur unter Glas) + Netzmittel: Etalfix Pro 0,02 % spritzen. Tipp: Match ist bereits ab 5 °C wirksam.				
			NEU	Vertimec Gold + Plenum WG										Spinnmilben, Thrips, Minierfliegen: Vertimec 0,025–0,05 % + Weisse Fliegen, Blattläuse: 0,06 % spritzen. Tipp: Für systemische Wirkung Plenum WG auf wüchsige Pflanzen und bei Temperaturen > 12 °C.				

	Saat	Keim-ung	Wachs-tum	Pikie-ren	Wachstum	Top-fen	Wachstum	Kno-spe	Blüh-beginn	Verkauf	<b>Primula vulgaris (Kissenprimel)</b>					
	1	2-3	4-5	6	7-11	12	13-30	32-33	34-35	36-40	<b>9er-Topf</b>					
	A.Juli	M.-E.Juli	A.Aug.	M.Aug.	E.Aug.-M.Sep.	E.Sept.	A.Okt.-M.Jan.	E.Jan.	M.Feb.	E.Feb.-E.März	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger
☞											<b>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</b>					
											<b>Blütenbotrytis im Winter:</b> Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen. <b>Tipp:</b> Oder Mapro 0,05 % als Alternative gegen Botrytis mit Wirkstoff aus anderer Gruppe.					
											<b>Blütenbotrytis im Winter:</b> Mapro 0,05 % spritzen. <b>Tipp:</b> Oder Play 0,05 % mit systemischem Wirkstoff und Belagswirkstoff aus anderen Gruppen.					
											<b>Wachstumsregulierung:</b> 0,03 % spritzen. <b>Tipp:</b> 1. Anwendung sobald getopfte Jungpflanze angewachsen bzw. erste Wurzeln sichtbar sind. 2. Anwendung ca. 10–14 Tage später. Auf wüchsige Pflanzen behandeln.					
											<b>Wachstumsregulierung:</b> 0,25 % spritzen, je nach Sorte und Wuchskraft. <b>Tipp:</b> Auf wüchsige Pflanzen behandeln.					
											<b>Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Rost:</b> 0,05 % spritzen <b>Tipp:</b> Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, Spezialist gegen Blattflecken, sehr verträglich, fleckt nicht.					
											<b>Ramularia-Blattflecken:</b> Indar 0,2 % spritzen. <b>Tipp:</b> Indar ab 12 °C einsetzen. Oder Delan bzw. Dithane NeoTec zum Abwechseln der Wirkstoffgruppen.					
											<b>Ramularia-Blattflecken:</b> Delan WG 0,05 % spritzen. <b>Tipp:</b> Kontaktfungizid bereits ab 5 °C und vorbeugend einsetzen.					
											<b>Ramularia-Blattflecken:</b> 0,2 % spritzen. <b>Tipp:</b> Nebeneffekt gegen vereinzelt auftretenden Falschen Mehltau. Wirkt bereits ab 5 °C. Vorbeugend einsetzen.					
											<b>Langzeitdünger:</b> Aufdüngung von Topfsubstraten: mässig nährstoffbedürftige Kulturen: 0,75 kg/m <sup>3</sup> , normal nährstoffbedürftige Kulturen: 1,0 kg/m <sup>3</sup> und stark nährstoffbedürftige Kulturen: 1,5–2,0 kg/m <sup>3</sup> . <b>Tipp:</b> Wirkung 2-3 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.					
											<b>Langzeitdünger: Plantomaag Mix 4M/6M</b> für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. <b>Tipp:</b> Wirkung 4 M bis 4 und 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.					
											<b>Plantomaag Normal</b>					
											<b>Plantomaag Mix 4M / 6M</b>					