

## Regolatore di crescita per tappeti erbosi, campi da golf e campi sportivi

- Esente da classe di tossicità, non lascia residui nel terreno e si decompone rapidamente alla luce
- Inodore, facile da dosare
- Per tutte le superfici erbose

---

**Principio attivo** 11,3 % Trinexapac-etile (116 g/l)

---

**Formulazione** Concentrato solubile in acqua (SL)

---

**Effetto** Primo Maxx inibisce la crescita longitudinale delle specie di erba di tappeti erbosi ornamentali e sportivi. Il prodotto influisce sul meristema apicale e l'effetto inibitore della crescita subentra 3–5 giorni dopo il trattamento. Il principio attivo viene assorbito attraverso le foglie. Un'ora dopo il trattamento lo strato di soluzione è resistente alla pioggia. Gli altri interventi di cura del manto erboso come irrigazione, concimazione, lotta contro le malerbe e le malattie possono continuare come di consueto. Anche le condizioni ambientali, i fattori agronomici e gli altri interventi di cura influenzano la crescita dell'erba e di conseguenza l'effetto di Primo Maxx. Sono in particolare la concimazione, l'umidità e gli intervalli di taglio a incidere maggiormente sull'effetto inibitore della crescita esercitato dal prodotto.

Impiegando correttamente Primo Maxx è possibile ridurre le tosature fino al 50 % (meno residui di sfalcio). L'erba preserva una colorazione verde intensa e viene favorita la crescita vegetativa. Primo Maxx inibisce la fioritura di *Poa annua* e *Poa trivialis* permettendo di contenerne lo sviluppo. Se applicato su campi sportivi, Primo Maxx migliora il rotolamento dei palloni e le demarcazioni risultano più visibili.

---

### Modo d'uso

#### Tappeti erbosi e terreni sportivi

**Dosaggio in generale:** da 0,4 a 2,4 l/ha. Il dosaggio è da adattare al tipo di tappeto, alla specie dominante e all'intensità dell'effetto ricercato (inibizione forte o meno forte della crescita delle graminie).

**Terreni da golf e da polo:** green 0,4–0,8 l/ha, fairway 0,8–1,6 l/ha (sfalcio <18 mm), in forte presenza di loietto sino a 2,4 l/ha.

**Tappeti sportivi e ornamentali:** consiglio generale: 1,5 l/ha (15 ml in 10 l d'acqua per 100 m<sup>2</sup>). Festuche e *Poa pratensis* 2,4 l/ha. Nel caso di forte presenza di *Poa annua* ridurre i dosaggi della metà. Per i tappeti verdi costituiti unicamente da festuca rossa la dose massima è di 1,6 l/ha.

---

# Primo Maxx<sup>®</sup>

## Modo d'uso 2

**Applicazione:** Idealmente, l'applicazione dovrebbe avvenire dopo la falciatura e non prima di 1 ora dopo il taglio. Per garantire che Primo Maxx sia pienamente efficace, deve essere utilizzato almeno 3 ore prima dell'irrigazione successiva. Ripetere le applicazioni ad intervalli di 4 settimane ed applicare solo quando il tappeto è in fase di crescita attiva. Non applicare Primo Maxx se il tappeto si trova sotto stress per una qualsiasi ragione. Non applicare Primo Maxx nelle due settimane precedenti, come pure nelle due settimane seguenti pratiche colturali intensive (una scarificazione per esempio). Se si riducono gli intervalli d'applicazione (a due settimane circa) è possibile ridurre i dosaggi.

## Attenzione

- Primo Maxx può causare un momentaneo ingiallimento dell'erba. È possibile ridurre questo rischio ammendando le superfici erbose con un concime azotato.
- Non impiegare in caso di forte siccità.
- Applicare al massimo 16 l/ha all'anno di Primo Maxx sulla stessa superficie. Utilizzare da 300–1'000 l di poltiglia per ettaro.
- Trattamenti regolari con Primo Maxx permettono di contenere lo sviluppo di Poa annua.
- Dopo l'applicazione non deve piovere per almeno un'ora.
- Evitare gli accavallamenti durante l'irrorazione.
- Non applicare in caso di elevato rischio di gelo.
- In assenza di trattamenti ripetuti con Primo Maxx, la crescita di tappeto erboso precedentemente trattato e inibito può dopo un certo periodo crescere per alcuni settimane più velocemente di quanto l'erba non trattata.

**Protezione dell'utilizzatore:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.

**Protezione della gioventù:** I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto (questa sostanza/questo preparato) soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le condizioni del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono una formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto (questa sostanza/questo preparato). Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.

## Caratteristiche

Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.

Il prodotto è innocuo per gli insetti utili. Primo Maxx non è persistente e l'emivita del principio attivo è molto breve. Primo Maxx non è volatile né dilavabile.

## Confezione

1 l, 12x 1 l

## Marchio

<sup>®</sup> = marchio registrato di una società del gruppo Syngenta

## Versione

62764/0220