Neem Maag

Concentrato contro diversi insetti nocivi su piante ornamentali, verdure e altre colture

- **Prodotto biologico**
- **Azione translaminare**
- **Autorizzato FIBL**

Principio attivo	1 % Azadiractina A (9,8 g/l).
Formulazione	Concentrato emulsionato (EC)
Effetto	Neem Maag è un concentrato di acarico/insetticida e contiene il principio attivo azadiractina A, che si ottiene dai semi dell'albero di Neem. Il principio attivo è translaminare (citotropico), penetra nelle foglie ed è impermeabile alla pioggia dopo poche ore. Quando i parassiti entrano in contatto con Neem Maag, la loro attività di distruzione della pianta viene interrotta. Di norma, essi sono ancora visibili dopo un po' di tempo, ma non causano più alcun danno alla pianta.
Modo d'uso	**In generale:** 2–3 trattamenti (spruzzare) a distanza di 7–10 giorni. Bagnare bene e a fondo tutta la pianta. **Piante ornamentali** **Alberi e arbusti** (al di fuori della foresta), **colture da fiore e piante verdi, rose:** 0,3 % contro afidi, mosche bianche (aleuroididi), tripidi, minatrici, ragnetti. Dalla comparsa dell'attacco, 2–3 applicazioni a intervalli di 7–10 giorni. Nessuna applicazione su begonie, margherite e Saintpaulia. **Ippocastano:** 0,5 % contro la minatrice dell'ippocastano. In caso di infestazione effettuare un trattamento ad inizio maggio e ripetere dopo 14 giorni. Se necessario ripetere il trattamento in estate. **Rododendro:** 0,3 % contro le cicaline nane. Al massimo 3 trattamenti per anno e particella. **Alberi e arbusti** (al di fuori della foresta): 0,5 % trattamento immediatamente dopo la schiusura delle uova, contro le giovani larve della processionaria della quercia, trattare la mattina presto o la sera. **Bosso (Buxus):** 0,3 % contro la piralide del bosso. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con un intervallo di 10 giorni. **Ortaggi** **Melanzane (in serra):** 0,3 % contro i tripidi e gli afidi. Dalla comparsa dell'attacco, 2–3 applicazioni a intervalli di 7–10 giorni. Termine d'attesa: 3 giorni. **Cetrioli (in serra):** 0,3–0,5 % contro i ragnetti. Al massimo 5 trattamenti per coltura. Termine d'attesa: 3 giorni. **Peperone (in serra):** 0,2 % contro le cicaline nere e 0,3 % contro gli afidi. Al massimo 3 trattamenti per coltura. Termine d'attesa: 3 giorni. **Pomodori (in serra):** 0,3 % contro gli afidi, aleurodidi, minatrici e tripidi. Dalla comparsa dell'attacco, 2–3 applicazioni a intervalli di 7–10 giorni. Termine d'attesa: 3 giorni.

Neem Maag

Modo d'uso 2

Baby-Leaf (Asteraceae): 3 l/ha contro gli afidi. Al massimo 5 trattamenti per coltura.
Termine d'attesa: 7 giorni.
Finocchio dolce: 3 l/ha contro gli afidi. Al massimo 3 trattamenti per coltura. Termine d'attesa: 14 giorni.
Erbette da cucina: 3 l/ha contro gli afidi, aleurodidi, cicaline nere, ragnetti e tripidi. Dalla comparsa dell'attacco, 2–3 applicazioni a intervalli di 7–10 giorni. Termine d'attesa: 7 giorni.
Bietola: 3 l/ha contro la mosca della barbabietola. Al massimo 3 trattamenti per coltura con un intervallo di almeno 7 giorni. Termine d'attesa: 7 giorni.
Porro: 3 l/ha contro i tripidi. Al massimo 3 trattamenti per coltura. Termine d'attesa: 14 giorni.
Cavoli di Bruxelles: 3 l/ha contro gli aleurodidi. Al massimo 3 trattamenti per cultura a intervalli di 7–10 giorni. Termine d'attesa: 14 giorni.
Insalate (Asteraceae): 3 l/ha contro gli afidi. Al massimo 5 trattamenti per coltura.
Termine d'attesa: 7 giorni.
Asparagi: 3 l/ha contro la criociera a dodici punti e la criociera dell'asparago. Applicazione: dopo il raccolto. 2 trattamenti per particella e per anno ad un intervallo di 10 giorni.
Spinaci: 3 l/ha contro gli afidi. Al massimo 3 trattamenti per coltura con un intervallo di almeno 7 giorni.
Periodo d'attesa: 7 giorni.

Campicoltura:
Patate: 2,5 l/ha contro la dorifora. Al massimo 2 trattamenti per coltura. Termine d'attesa 3 settimane.

Bacche
Specie di ribes: 3 l/ha (0,3 %) contro gli afidi. Al massimo due trattamenti per anno e particella. La dose indicata si riferisce allo stadio "allegagione (50–90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1'000 l/ha. Periodo d'attesa: 7 giorni.
Sambuco nero: 0,3 % contro gli afidi. Applicazione: Prima dell'inizio della fioritura.
Al massimo 1 trattamento per particella e anno. Termine d'attesa: 7 giorni.

Frutta
In generale: La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m^3/ha.
Melo: 0,2–0,25 % (3,2–4 l/ha) contro gli afidi. Nessuna efficacia contro l'afide verde migrante. Applicazione prima e dopo la fioritura (BBCH 59 o 69) entro al più tardi fine maggio. Inoltre contro l'afide grigio – rosa del melo allo 0,15 % (2,4 l/ha). Applicazione prefioritura e postfioritura (2 trattamenti: il primo prima della fioritura (BBCH 59) e il secondo dopo la fioritura (BBCH 69)), al più tardi entro fine maggio.
Ciliegio: 0,3 % (4,8 l/ha) contro gli afidi. Applicazione dopo la fioritura. Periodo di attesa: 3 settimane. In più 0,25 % (4 l/ha) contro la mosca della ciliegia con al massimo 3 trattamenti per particella e anno. Applicazione: A partire dell'inizio del volo. Trattamenti con un intervallo di 7–10 giorni.
Termine d'attesa: 2 settimane.
Pesco/pesco noce: 0,1875 % (3 l/ha) contro gli afidi. Applicazione: Prefioritura o postfioritura.
Al massimo 3 trattamenti per particella e anno con un intervallo di 7 giorni. Termine d'attesa: 3 settimane.

Neem Maag

Attenzione

Autorizzato per l'utilizzazione non professionale.
Impiegare con un serbatoio per la poltiglia con miscelatore in funzione. Per gli apparecchi di irrorazione senza miscelatore agitare/rimescolare la poltiglia regolarmente.
Specie di ribes, pesco / pesco noce, finocchio dolce,bietola, porro, peperone, bosso e rododendro autorizzati come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).

Tolleranza delle piante: alcune specie e varietà di piante possono reagire in modo sensibile (danni alle foglie e ai fiori). La stagione e le condizioni di coltivazione possono influenzare la compatibilità delle piante e delle varietà (maggiori informazioni nella scheda tecnica). Si raccomanda di effettuare una polverizzazione di prova su alcune piante o foglie nella rispettiva fase di crescita, prima di trattare grandi superfici. Non si assume alcuna responsabilità per danni.

Fitotossicità su piante ornamentali: I danni sui fiori dipendono dalla varietà. Begonia semperflorens, B. elatior-ibridi, Chrysanthemen (Deep Luv), Euphorbia pulcherrima (Peter Star, Cortez), Gerbera (Pretty Red, Sigma, Luciana, Hydroponics-Chateau, Emperor, Goldspark, Icefolly, Leila, Margarita, Mario, Napoli, Olilia, Optima, Purity, Red Explosion, Rosty, Ruby Red, Santos, Serena, Timo, Vigoury, Dream, Kimsey, Siby), Impatiens-Neu-Guinea-ibridi, Impatiens walleriana, Isotoma Pratia fluviatillis (Blue Star Creeper), PelargonienPeltatum-ibridi, P.-Zonale-ibridi, Solanum rantonnetti, Saintpaulia (Miho io), Tagetes, Tulbaghia vioacea (Tricolos Society), Verbene (alcune varietà).

Danni alle foglie (ondulature, arrotolamenti): Abutilon-ibridi, Begonia elatior-ibridi, Callistemon citrinus (Dwarf Botle Brush), Cestrum, Clytostoma callistegiodes (Lavender Trumpet Vine), Dahlia-ibrido (Dwarf Dahlia), Datura, Euphorbia pulcherrima, Impatiens-Neu-Guinea-ibridi, Impatiens walleriana, Gypsophila paniculata (Baby´s Breath), Liriope spicata (Silver Dragon Lilyturf), Magnolia stellata (Royal Star), Oleander (piante indebolite), Passiflora, Plectranthus, Solanum rantonnetti, Rose (Alina, Arabia, Baronesse, Black Magic, Funcky Jazz Ducat, Eveline, Lola, Noblesse, Papa Meilland, Saphir, Roulette, White Noblesse, Hydroponics-First Red, Lenny, Poison, Prima Donna, Red Berlin).

Effetti sugli ausiliari: L'uso ripetuto può avere effetti collaterali sui sirfidi e sugli insetti predatori Macrolophus. Non dannoso per le popolazioni delle seguenti specie: Typhlodromus pyri (acaro predatore), Poecillus cupreus (coleottero), Coccinella septempunctata (coccinella a sette punte), Aphidius rhopalosiphi (vespa salmastra).

Protezione dell'utilizzatore: Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Inoltre, in tutte le colture eccetto le patate: applicazione della poltiglia: Indossare indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Neem Maag

Attenzione 2	**Protezione dei giovani:** Articolo 4 capoverso 4 Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5, RS 822.115) e articolo 1 lett. f Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (822.115.2): I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le condizioni del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono una formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto (questa sostanza/questo preparato). Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti. Il riutilizzo di questo imballaggio è proibito.
Preparazione della soluzione	Riempire il contenitore a metà con acqua, aggiungere la quantità necessaria di prodotto e rabboccare con l'agitatore in funzione.
Miscele	Neem Maag è miscibile con i fungicidi e gli insetticidi indicati nella guida Maag Profi. **Attenzione:** Miscele con captan o ditianone causano forte fitotossicità. Tra le applicazioni di Neem Maag e captan o ditianone mantenere un intervallo di 7-14 giorni a dipendenza della coltura e varietà.
Caratteristiche	Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.
Confezione	500 ml, 10x 500 ml
Versione	67298/0120