

Insetticida contro la piralide del bosso e altri lepidotteri della frutta a granella, orticoltura

- Nuovo gruppo di principi attivi per il controllo di diverse specie di lepidotteri
- Agisce anche contro gli insetti nocivi resistenti
- Miscelabile con molti fungicidi
- Azione molto specifica, perciò rispettoso degli insetti utili

Principio attivo	0,95 % Eamectina benzoato
Formulazione	Granulare solubile in acqua (SG)
Azione	Affirm Profi agisce in modo specifico contro le larve di farfalla (lepidotteri) su piante ornamentali, ortaggi e frutticoltura. Affirm Profi ha il grande vantaggio di avere un effetto sicuro anche sulla carpocapsa delle mele resistente ad altri prodotti fitosanitari. Tenuto conto della decomposizione relativamente rapida del prodotto in natura, la sua efficacia è di circa 2–3 settimane. Affirm Profi interviene sulle cellule nervose dei bruchi, che smettono di nutrirsi poco dopo l'applicazione. In tal modo si evitano danni alle colture.
Applicazione	Piante ornamentali Bosso: 0,2 % (20 g/10 l) contro la piralide del bosso. Bagnare bene la pianta su tutti i lati, anche nella parte interna. Frutticoltura In generale: 0,2 % e 3,2 kg / ha. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. Solo in frutteti secondo l'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (RS 910.91, OTerm). Questo significa che Affirm Profi può essere utilizzato solo in frutteti chiusi con un minimo di 300 alberi per ettaro. Termine d'attesa: 3 settimane con eccezione per il noce di 3 giorni. Albicocco, Pesco/pesco noce: contro la carpocapsa delle mele, la tignola del pesco e la tortrice orientale del pesco. Trattamenti all'inizio di schiusa delle larve. Frutta a granella: contro la carpocapsa e piccola tortrice dei frutti. Primo trattamento ad inizio della schiusa. Ripetere il trattamento 2–3 settimane dopo, oppure inserire Affirm Profi in una strategia di lotta alternandolo ad altri prodotti. Contro le falene prima della fioritura, dopo la schiusa delle uova. Oppure contro le tortrici ricamatrici prima della fioritura (BBCH 57 – 59) contro tutti gli stadi larvali (in Vallese dopo la fioritura BBCH 69–71). Metà giugno/inizio luglio contro le larve della generazione estiva, come pure in agosto contro la generazione autunnale Noce comune: contro la carpocapsa delle mele all'inizio di schiusa delle larve. Pruno/susino: contro la tortrice delle susine.

(Applicazione 2)

Ortaggi

Cavoli fogliacei, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli di Bruxelles: 0,15 % e 1,5 kg/ha contro le nottue (defogliatrici), tignola delle crocifere, cavolaie. Termine d'attesa: 1 settimana.

Cucurbitacee: 0,15 % e 1,5 kg / ha contro le nottue (defogliatrici). Termine d'attesa: 3 giorni.

Pomodori: 0,15 % e 1,5 kg/ha contro la Tuta assoluta. Termine d'attesa: 3 giorni.

Campicoltura

Pisello proteico: 1,5 kg/ha contro la tortrice del pisello, nottue (defogliatrici) dall'inizio della presenza dell'insetto.

Attenzione

Pericoloso per le api: In generale: non deve entrare in contatto con piante fiorite o ricoperte di melata (per esempio colture, trasemine, malerbe, colture vicine, siepi). **Inoltre in frutticoltura:** Può venir utilizzato solo impiegando un sistema che riduca la deriva di almeno il 75 %. Nella piantagione così come in una fascia-tampone circostante di una larghezza di 3 m, le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba).

Distanze di sicurezza: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della **deriva** rispettare una zona tampone non trattata di 6 m (ortaggi e pisello proteico) o 50 m (bosso, frutta) dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un **dilavamento**, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG

Per la protezione di artropodi non target dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m (ortaggio e pisello proteico), 50 m (bosso) o 100 m (frutta) dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.

Protezione del utilizzatore: frutticoltura: Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Insorgenza di resistenza: Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti Eamectina benzoato più di due volte per anno e particella. – È consigliato alternare insetticidi con diversi sistemi d'azione. Siccome l'insorgere di resistenze non è prevedibile, eventuali perdite di raccolto causate da insetti resistenti sono sotto la responsabilità dell'utilizzatore.

Preparazione della soluzione

Riempire il contenitore per ¼ con acqua, aggiungere la quantità necessaria di prodotto e rabboccare con l'agitatore in funzione. Applicare la soluzione nelle ore successive.

Miscibilità

Affirm Profi è miscibile con i comuni fungicidi e insetticidi Syngenta, come indicato nella Guida Maag e Syngenta.

Affirm[®] Profi



Caratteristiche	Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.
------------------------	--

Confezione	1 kg, 10 x 1 kg
-------------------	-----------------

Marchio	[®] = Marchio registrato di una società del gruppo Syngenta
----------------	--

Versione	57047/0219
-----------------	------------
