

Wuxal[®] Suspension Mg

Fertilizzante liquido a base di magnesio per la concimazione fogliare

- Corregge le carenze di magnesio
- Agisce rapidamente su foglie e frutti
- Migliora la crescita e la qualità

Tenore	180 g MgO, 65 g S, 54 g N azoto totale (48 g azoto nitrico, 3 g azoto ammonico, 3 g azoto organico di aminoacido), 15 g Mn, 10,5 g Zn, 4,5 g B. Manganese e zinco sotto forma di chelati EDTA.
---------------	--

Formulazione	Sospensione concentrata (SC)
---------------------	------------------------------

Azione	Wuxal Sospensione Mg è una soluzione fertilizzante concentrata per prevenire e correggere le carenze nelle colture. Le concimazioni fogliari sono particolarmente indicate quando l'assorbimento dei nutrienti attraverso le radici è difficoltoso a causa di condizioni sfavorevoli (pioggia, freddo, siccità, pH troppo alto o troppo basso, carenze). Al fine di prevenire o correggere efficacemente le carenze, utilizzare Wuxal Sospensione Mg a più riprese durante il periodo critico.
---------------	--

Modo d'uso	Irrorazioni ripetute con Wuxal Sospensione Mg prevengono le carenze e contribuiscono a garantire il raccolto. Con la concimazione fogliare i nutrienti vengono assorbiti molto velocemente anche in condizioni sfavorevoli (siccità, pioggia).
-------------------	--

Tappeto erboso e piante ornamentali

3–5 l/ha* per intensificare il verde del tappeto erboso (utilizzo regolare), per correggere carenze latenti e acute di magnesio di piante ornamentali, aggiungere 2–3 volte alle irrorazioni. Non irrorare le infiorescenze.

Frutticoltura

3–5 l/ha* contro alterazioni fisiologiche dovute alla carenza di magnesio (macchie fogliari, caduta precoce delle foglie alla base della zona di accrescimento, necrosi del margine fogliare).

Wuxal Sospensione Mg dovrebbe essere aggiunto almeno 3 volte alle irrorazioni post-fioritura, soprattutto in caso di specie sensibili, ad es. Idared.

Wuxal[®] Suspension Mg

(Modo d'uso)	<p>Viticultura</p> <p>5 l/ha* in caso di carenza di magnesio, aggiungere alle irrorazioni 2–3 volte fino a fine luglio. Non irrorare le infiorescenze. Contro il disseccamento del raspo irrorare 2 volte la zona del grappolo con 5 l/ha Wuxal Sospensione Mg. La prima irrorazione dovrebbe avvenire non appena gli acini incominciano ad ammorbidirsi e raggiungono i 30° Oechsle (da inizio a metà agosto), la seconda irrorazione 14 giorni dopo. La soluzione irrorata deve bagnare uniformemente e a fondo la zona del grappolo.</p> <p>Grandi colture</p> <p>3–5 l/ha* Cereali: fino alla fioritura (stadio DC 59). Patate: non appena gli arbusti serrano le fila; ripetere 3–5 volte, può essere aggiunto ai primi trattamenti contro la peronospora. Mais: nello stadio di 4–6 foglie e nello stadio di 8–10 foglie. Rape, tabacco: ai primi sintomi di carenza.</p> <p>Orticoltura</p> <p>3–5 l/ha* ai primi sintomi di carenza. Ripetere l'irrorazione 2–3 volte.</p> <p>* per ogni irrorazione</p>
Attenzione	<p>Per ottenere il massimo effetto della concimazione fogliare, le irrorazioni andrebbero fatte nelle ore mattutine o serali, oppure con cielo coperto. Non irrorare le infiorescenze di piante ornamentali. Evitare uno stoccaggio prolungato a temperature inferiori a +5 °C e superiori a +40 °C. Uno stoccaggio a temperature troppo alte o troppo basse può portare a cambiamenti di colore e alla formazione di cristalli. I cristalli si sciolgono dopo la diluizione. La qualità del prodotto rimane invariata.</p>
Preparazione della soluzione	<p>Aggiungere Wuxal Sospensione Mg all'acqua corrente attraverso un colino con l'agitatore in funzione. Se non è presente un colino, diluire con acqua in una cisterna. Mescolare molto bene prima di un prelievo parziale dalla cisterna.</p>
Miscibilità	<p>Wuxal Sospensione Mg è miscibile con fungicidi Maag Profi o Syngenta, eccetto Delan 500 SC, Delan WG, Slick e Malvin WG.</p>
Caratteristiche	<p>Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.</p>
Confezione	<p>10 l</p>
Marchio	<p>® = Marchio registrato di Aglukon Spezialdünger GmbH & Co. KG</p>
Versione	<p>56333/0318</p>