

## PLAN PÉPINIÈRES ET GAZON

|  | Problème  | Produit                       | Dosage<br>% ou par are | Remarques  |
|--|---|-------------------------------|------------------------|--|
| <b>Nouveaux gazons</b>                           |   |                               |                        |  |
| En cas d'attaque                                 | Courtilières, vers gris, larves de tipules  | <b>Cortilan</b>               | 500 g                  | Par are en épandage sur sol humide.  |
| Dès la 1 <sup>re</sup> tonte printemps à automne | Champignons du gazon, maladies  | <b>Headway</b>                | 22,5 ml                | Dans 10 l d'eau ou <b>Heritage</b> 5 g, par are.   |
|  | Champignons pathogènes du sol, rouille  | + <b>Daconil Weather Stik</b> | 0,3 %                  |  |
|  | Taches sèches (dry patch), rend le sol plus facile à réhumidifier et favorise sa capacité de rétention de l'eau, contre ronds de sorcière | <b>Qualibra</b>               | 200 ml                 | Premiers traitements à partir de mars/avril. Meilleurs résultats avec un traitement toutes les 4 à 6 semaines. Arroser 2 à 3 mm d'eau. |
| Dès la 3 <sup>ème</sup> tonte                    | Dicotylédones   | <b>Duplosan KV-Combi</b>      | 40 ml                  | Dans 10 l d'eau, par are.  |
| Octobre à décembre                               | Moisissure des neiges   | <b>Headway</b>                | 22,5 ml                | Traitement en octobre.   |
|  | Moisissure des neiges, Leaf spot, anthracnose et brown patch  | <b>Medallion TL</b>           |                        | Dans 125–500 l d'eau.  |
|  | Moisissure des neiges   | ou <b>Play</b>                | 15 g                   | 1 <sup>er</sup> Traitement en octobre.<br>2 <sup>ème</sup> App. avant la 1 <sup>er</sup> chute de neige.                               |

### Anciens gazons

|                         |  |                               |           |  |
|-------------------------|--|-------------------------------|-----------|--|
| D'avril à début octobre | Taches sèches (dry patch), rend le sol plus facile à réhumidifier et favorise sa capacité de rétention de l'eau, contre ronds de sorcière  | <b>Qualibra</b>               | 200 ml    | Pulvériser toutes les 4–6 semaines. Arroser après avec 2–3 l/m <sup>2</sup> .  |
|                         | Biostimulant, favorise la croissance des racines, qualité de gazon et force de résistance  | <b>Hicure</b>                 | 25 ml     | En cas de pulvérisation ajouter <b>Hicure</b> toutes les 10–14 jours. Augmente la tolérance au stress causé par la chaleur et la sécheresse.                                     |
|                         | Engrais foliaire, vitalisation   | <b>Wuxal Profi</b>            | 0,2 %     | Ajouter régulièrement lors de traitements.   |
|                         | Croissance des racines, carence de calcium   | <b>Wuxal Suspension Ca</b>    | 0,3–0,5 % | Améliore la vitalité des racines et la résistance contre les maladies de gazon.  |
|                         | Carence de magnésium, effet vert   | <b>Wuxal Suspension Mg</b>    | 0,3–0,5 % | Favorise un vert intense et corrige également la carence de magnésium latente.   |
|                         | Carence de manganèse, effet vert   | <b>Wuxal Suspension Mn</b>    | 0,3–0,5 % | Favorise un vert intense et corrige également la carence de manganèse latente.   |
|                         | Ronds de sorcières, maladies fongiques   | <b>Heritage</b>               | 0,05 %    | Injecter la bouillie dans la zone malade avec un pal-injecteur. Ajouter encore <b>Qualibra</b> 200 ml/are. Avec ça on traitera également les ronds de sorcière de couleur brune. |
|                         |  | + <b>Daconil Weather Stik</b> | 0,3 %     |  |
|                         | Larves de tipules  | <b>Cortilan</b>               | 500 g     | Par are en épandage sur sol humide.  |
|                         | Larves de tipules  | <b>Kendo</b>                  | 3 ml      | 10 l d'eau/are. Pulvériser de préférence en soirée.  |
|                         | anthracnose du gazon, fil rouge du gazon, Fusarium spp., Gaeumannomyces graminis var. avenae (gazon), helminthosporioses moisissure des neiges, Ophiosphaerella herpotricha, Pythium spp., rhizoctones des graminées, rouille des graminées taches d'été | <b>Heritage</b>               | 5 g       | Dans 10 l d'eau, par are. *2   |
|                         |  | <b>Headway</b>                | 22,5 ml   | Dans 10 l d'eau, par are. *2   |
|                         | Champignons du gazon (voir ci-dessus)  | <b>Daconil Weather Stik</b>   | 0,3 %     | Dans 10 l d'eau, par are. *2   |
|                         | Anthracnose du gazon, dollar spot des graminées, fil rouge du gazon, helminthosporioses, oïdium des graminées, rhynchosporiose du gazon, rouille des graminées, taches d'été   | <b>Tega</b>                   | 8 g       | Dans 10 l d'eau, par are. *2   |

| Problème  | Produit   | Dosage<br>% ou par are      | Remarques  |   |
|---|---|-----------------------------|--|---|
| Pythium, champignons pathogène du sol   | <b>Dithane Neotec</b>   | 0,3 %                       |  |   |
| Mauvaises herbes à large feuilles   | <b>Banvel Quattro</b>   | 100 ml/10 l                 | Pulvériser.  |   |
| Mauvaises herbes annuelles  | <b>Pixie</b>  | 20 ml/10 l                  | Dans 10 l d'eau par are. Du ciel nuageux à couvert                           |   |
| Mauvaises herbes récalcitrantes   | + <b>Duplosan KV-Combi</b>  | 40 ml/10 l                  |  |   |
| Millets   | <b>Hirso Maxx</b>   | 0,4–1,0 l/ha                | Ou 10–15 ml/10 l d'eau avec la pompe à dos.                                  |   |
| Mousse, algues, lichens   | <b>MossKade</b>   | 1 l                         | 1 part de MossKade sur 10 parts d'eau. Aussi pour les chemins et les places. |   |
| Uniquement trèfle, pâquerettes, plantain, rumex, renoncule rampante ou dent-de-lion | <b>Duplosan KV-Combi</b>  | 60 ml                       | Dans 10 l d'eau par are.   |   |
| Envahissement de mauvaises herbes mélangées   | <b>Foxtril P</b>  | 40 ml                       | Dans 10 l d'eau, par are. Du ciel nuageux à couvert.                         |   |
| Mauvaises herbes annuelles et tenaces   | + <b>Duplosan KV-Combi</b>  | 40 ml                       |  |   |
| D'octobre à février   | Moisissure des neiges   | <b>Headway</b>              | 22,5 ml  | Traitement en octobre.                                |
|   | Anthraxose du gazon, dollar spot des graminées, fil rouge du gazon, moisissure des neiges | <b>Banner Maxx II</b>       | 30 ml  |   |
|   | Anthraxose, Brown Patch, moisissure des neiges, Leaf Spot                                 | <b>Medallion TL</b>         | 30 ml  | Dans 125–500 l d'eau. Gazon tôt jouable à nouveau.    |
|   | Moisissure des neiges   | <b>Play</b>                 | 15 g   | Application avant la première chute de neige.         |
|   | Champignons pathogènes du gazon   | <b>Daconil Weather Stik</b> | 30 ml  | Dans au moins 5 l d'eau/are. Applicable jusqu'à 4 °C. |

### Gazons de golf et de polo

|                             |                   |         |  |
|-----------------------------|-------------------|---------|--|
| Inhibition de la croissance | <b>Primo Maxx</b> | 8–16 ml | Par are (en cas de forte présence de Raygrass augmenter la dose jusqu'à max. 24 ml/are). <sup>*1</sup> |
|-----------------------------|-------------------|---------|--|

### Gazon d'ornement, gazons de sport

|                             |                   |          |   |
|-----------------------------|-------------------|----------|---|
| Inhibition de la croissance | <b>Primo Maxx</b> | 20–23 ml | Par are. <sup>*1</sup> à 2 heures après le tonde. |
|-----------------------------|-------------------|----------|---|

\*1 Dosages exacts voir mode d'emploi sur l'emballage.

\*2 Pour des mélanges voir guide gazon page 32.