

Fungicida sistemico contro la peronospora e i funghi patogeni del suolo (*Phytophthora*, *Phytium*) di piante ornamentali in serra

- Azione preventiva e curativa
- Ben tollerato dalle piante
- Intervalli dei trattamenti più lunghi

Principio attivo	43,9 % Metalaxil-M (465 g/l)
Formulazione	Concentrato solubile in acqua (SL)
Effetto	Fonganil ha un'azione sia sistemica, sia preventiva. Il principio attivo viene assorbito attraverso le radici e distribuito in tutta la pianta. Nel caso in cui i sintomi della malattia siano già visibili, con Fonganil è possibile interrompere la crescita del fungo e impedirne l'ulteriore diffusione.
Modo d'uso	<p>Piante ornamentali</p> <p>In serra: alberi e arbusti (al di fuori della foresta) come anche colture da fiore e piante verdi: irrorazione: contro la peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, <i>phytophthora</i> spp. o <i>pythium</i> spp. Trattamento per irrorazione: 0,02 % (20 ml/100 l d'acqua). Al massimo 3 trattamenti per anno e particella. Annaffiatura: 5 l/ha (50 ml/100 m²). Annaffiare solo pani di terra umidi in modo che il prodotto possa penetrare a fondo. Per combattere l'eventuale comparsa di altri agenti patogeni, come ad esempio <i>Rhizoctonia</i>, <i>Botrytis</i> e <i>Fusarium</i>, sono necessari trattamenti aggiuntivi con altri prodotti. Al massimo 2 trattamenti all'anno sulla stessa superficie. Il primo trattamento subito dopo la piantagione, secondo trattamento dopo 3 settimane. Trattamento dei substrati: 25 ml/ m³ di terriccio. Mescolare al terriccio prima della messa in coltura o incorporare allo strato superficiale del terreno.</p> <p>Considerate la diversità dei metodi di coltura e la profusione di specie e varietà, si consiglia di verificare la tollerabilità del prodotto su una piccola superficie prima di impiegarlo in modo esteso. Una verifica della tollerabilità è consigliata soprattutto prima dell'impiego di Fonganil su specie che non figurano nel seguente elenco. In base alle nostre prove, eseguite secondo il modo d'uso raccomandato, Fonganil è ben tollerato dalle piante ornamentali seguenti: <i>Ageratum</i>, <i>Alstroemeria</i>, <i>Alyssum</i>, <i>Anthurium</i>, <i>Antirrhinum</i>, <i>Aphelandra</i>, <i>Aralia</i>, <i>Asplenium</i>, <i>Aucuba</i>, <i>Azalea</i>, <i>Begonia</i>, <i>Clerodendrum</i>, <i>Calluna</i>, <i>Camellia</i>, <i>Celosia</i>, <i>Columnnea</i>, <i>Chamaecyparis</i>, <i>Chrysanthemum</i>, <i>Cineraria</i>, <i>Cissus</i>, <i>Crocus</i>, <i>Croton</i>, <i>Cuphea</i>, <i>Cyclamen</i>, <i>Daboëcia</i>, <i>Dianthus</i>, <i>Dieffenbachia</i>, <i>Douglasia</i>, <i>Draceana</i>, <i>Echeveria</i>, <i>Erica</i>, <i>Ficus</i>, <i>Geranium</i>, <i>Gerbera</i>, <i>Gloxinia</i>, <i>Hedera</i>, <i>Hyacinthus</i>, <i>Impatiens</i>, <i>Iris</i>, <i>Juniperus</i>, <i>Kalanchoe</i>, <i>Larix</i>, <i>Ligustrum</i>, <i>Lillium</i>, <i>Matthiola</i>, <i>Monstera</i>, <i>Pelargonium</i>, <i>Peperomia</i>, <i>Petunia</i>, <i>Philodendron</i>, <i>Photinia</i>, <i>Pilea</i>, <i>Pinus</i>, <i>Pittosporium</i>, <i>Poinsettia</i>, <i>Pseudotsuga</i>, <i>Phipsalis</i>, <i>Rhododendron</i>, <i>Rizinus</i>, <i>Saintpaulia</i>, <i>Salvia</i>, <i>Schefflera</i>, <i>Scindapsus</i>, <i>Sedum</i>, <i>Solanum</i>, <i>Syngonium</i>, <i>Tagetes</i>, <i>Tamarix</i>, <i>Tulipa</i>, <i>Verbena</i>, <i>Vinca</i>, <i>Viola</i>.</p>

Modo d'uso 2	Ortaggi Cicoria belga: contro <i>Phytophthora cryptogea</i> 10 ml/100 l d'acqua per trattamento delle radici o 4 ml/t di radici come irrorazione, entrambi all'inizio della forzatura. Al massimo 1 trattamento. Termine d'attesa: 3 settimane. Carote: 0,5 l/ha contro <i>Pythium</i> spp. (Cavity spot), spruzzature allo stadio 11–14 (1° a 4° foglia a lembo dispiegato). Al massimo 1 trattamento. Erbe aromatiche: Irrorazione: 0,02–0,022 % (0,2–0,22 l/ha) contro la peronospora (diverse specie) come trattamento per irrorazione. Termine d'attesa: 3 settimane.
Attenzione	Annaffiare solo pani di terra umidi in modo che il prodotto possa penetrare a fondo. Per combattere l'eventuale comparsa di altri agenti patogeni, come ad esempio <i>Rhizoctonia</i> , <i>Botrytis</i> e <i>Fusarium</i> , sono necessari trattamenti aggiuntivi con altri prodotti. Protezione dell'utilizzatore: In generale: durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. In serra: alberi e arbusti (al di fuori della foresta) come anche colture da fiore e piante verdi: In caso di applicazione per irrorazione per lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Cicoria belga: Applicazione della poltiglia o trattamento: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Carote: Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
Preparazione della soluzione	Versare mescolando la quantità misurata di Fonganiil nella quantità di acqua richiesta.
Miscela	Si consiglia di utilizzare Fonganiil da solo. Eventuali miscele con altri fungicidi e insetticidi andrebbero prima testate su superfici ridotte tenendo conto delle diverse proporzioni.
Confezione	250 ml, 20x 250 ml
Marchio	® = Marchio registrato di una società del gruppo Syngenta
Versione	53816/0120
