Pixie®

Erbicida di postemergenza per controllare le malerbe dicotiledoni su tappeti erbosi e campi sportivi

- **Efficacia fogliare e residuale grazie alla combinazione di due sostanze attive**
- **Rapido deperimento delle malerbe**
- **Effetto persistente per diverse settimane**
- **Ottima efficacia tra l'altro su margherite dei prati, nontiscordardime, ranuncoli, denti di leone, trifoglio, veronica**

Principio attivo	2,62 % Diflufenican (33,3 g/l), 39,37 % Mecoprop-P (500 g/l)
Formulazione	Sospensione concentrata (SC)
Effetto	Il principio attivo mecoprop-P (MCPP-P) viene assorbito principalmente attraverso le foglie. Altera numerosi processi metabolici provocando un forte allungamento delle cellule e una crescita incontrollata delle infestanti che, in seguito al rapido consumo delle riserve, seccano e muoiono. Il principio attivo diflufenican viene assorbito principalmente attraverso le radici. Accelera il processo di degrado della clorofilla e quindi il deperimento della pianta. Con terreno sufficientemente umido, il diflufenican rimane efficace per diverse settimane.
Modo d'uso	Irrorazione: 2 l/ha in 1'000 l/ha di acqua (o 20 ml in 10 litri di acqua per 100 m^2). Annaffiatura: 2 ml in 10 litri di acqua per 10 m^2, distribuzione uniforme. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con un intervallo di almeno 21 giorni.
Attenzione	Il trattamento con Pixie andrebbe effettuato 3–4 giorni dopo lo sfalcio in condizioni vegetative, con una temperatura superiore a 8 °C. Dopo il trattamento non dovrebbe piovere per almeno 2 ore. Lo sfalcio successivo va effettuato dopo 4 giorni (ideale da 8 a 10 giorni). Non trattare i tappeti erbosi nell'anno della loro semina. **Protezione dell'utilizzatore:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. **Protezione della gioventù:** I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto (questa sostanza/questo preparato) soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le condizioni del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono una formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto (questa sostanza/questo preparato). Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.

Pixie®

Attenzione 2	L'impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato.
Preparazione della soluzione	• Riempire il contenitore per metà con acqua • Aggiungere la quantità necessaria del prodotto e rabboccare con l'agitatore in funzione (in caso di miscele, aggiungere dapprima la formulazione solida – WP, SG, WG) • Utilizzare la soluzione entro un giorno dalla preparazione • Preparare solo la quantità di soluzione necessaria • Diluire la rimanenza nel rapporto 1 a 10 e applicarla sulla superficie appena trattata • Lavare a fondo i contenitori del prodotto vuoti con acqua e aggiungere l'acqua di lavaggio alla soluzione da applicare
Spettro d'azione	*Efficace fino a molto efficace:* viola dei campi, ricrescita della colza, bellis,veronica, ranuncolo, ravanello selvatico, borsapastore comune, gallio aparine, trifolio, fiordaliso, dente di leone, artiplice aperta, ortica falsa, stellaria, nontiscordardimé minore. *Poco efficace:* cardo campestre, canapetta comune, fumaria, camomilla comune. *Insufficientemente efficace:* convolvolo, poligono, papavero comune.
Caratteristiche	Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.
Confezione	1 l, 12x 1 l
Marchio	® = Marchio registrato di una società del gruppo Syngenta
Versione	54659/0120