

Previcur[®] Energy

Fungicida contro le malattie della germinazione (Phytophthora, Pythium, peronospora)

- **Combinazione di due principi attivi con azione sistemica, preventiva e curativa**
- **Flessibilità temporale nell'utilizzo**
- **Azione persistente per 3–8 settimane**
- **Buona efficacia contro i marciumi del colletto e delle radici, nonché contro le peronospora**

Principio attivo 47,3 % Propamocarb (530 g/l), 27,7 % Fosetil (310 g/l)

Formulazione Concentrato solubile in acqua (SL)

Effetto Previcur Energy è un fungicida sistemico in formulazione liquida, costituito dai principi attivi Propamocarb e Fosetil che vengono assorbiti dalle radici e trasportati nelle parti fuori terra della pianta. In questo modo si garantisce anche una protezione allo stelo e alle foglie. A seconda del tipo di applicazione, delle caratteristiche del substrato e della pressione infettiva, la protezione dura 3–8 settimane. Previcur Energy è efficace contro i marciumi del colletto e delle radici (Pythium), nonché contro le peronospora (Phytophthora, Bremia, Peronospora) nell'applicazione fogliare. L'attività sistemica (acropeta e basipeta) esplica un buon effetto preventivo e curativo. Previcur Energy ha anche un'azione che stimola la crescita. Il Fosetil è sistemico e ad ampio spettro, stimola principalmente i meccanismi di difesa delle piante contro i patogeni fungini, inibisce la germinazione delle spore e la crescita del micelio.

Modo d'uso

Piante ornamentali

Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), **colture da fiore e piante verdi, rose**

Peronospora (diverse specie): irrorare con 0,25 % (25 ml/10 l di acqua) in caso di rischio di infezione irrorare con intervallo di 5–10 giorni. Quantità di poltiglia: 10 l/100 m²). In colture o varietà sensibili può provocare danni legati ad un'eventuale fitotossicità: effettuare un trattamento di prova prima del trattamento generale.

Phytophthora spp., Pythium spp.: annaffiare con 0,25 % (25 ml/10 l di acqua per una superficie di 5 m²) per il trattamento in cassetta e semenzaio. Soltanto per la produzione di piantine oppure annaffiare dopo il trapianto. 1–2 trattamenti in un intervallo di 7–10 giorni. Ciascuno al massimo 2 trattamenti.

Previcur® Energy

Modo d'uso 2

Ortaggi

Trattamento per annaffiatura contro **Pythium spp.** (melanzane, cetriolo, cavoli, peperone, pomidori, insalate (Asteraceae)), **Phytophthora spp.** (melanzane, cavoli, peperone, zucche con buccia commestibile, zucche (buccia non commestibile), meloni, angurie), **Peronospora** (zucche con buccia commestibile, zucche (buccia non commestibile), meloni, angurie, insalate (Asteraceae)) con 6 ml/m². Quantità d'acqua necessaria: 2 l di acqua/m² o 20'000 l di acqua/ha. 1x 6 ml/m² (1 trattamento al massimo) oppure 2x 3 ml/m² (2 trattamenti al massimo). Melanzane, specie di cavoli e peperone soltanto per trattamento in semenzaio. Cetriolo alternativamente con irrigazione a goccia 1–3 l/ha contro Pythium spp. per il trattamento in semenzaio e al massimo 2 trattamenti.

Irrorazione contro la **peronospora** (cetriolo, ravanello, rucola, insalate (Asteraceae), Baby-Leaf (Asteraceae) e spinaci) con 1,5–2,5 l/ha. Per l'applicazione si raccomanda una quantità di poltiglia di 400 l/ha. Per ulteriori irrorazioni è consigliabile alternare i gruppi di principi attivi. Dosaggio superiore per uso singolo e pressione della malattia molto elevata. Ravanello e insalate (Asteraceae): Al massimo 2 trattamenti. Cetriolo: 2 trattamenti. Ripetere l'applicazione dopo 7–10 giorni. Ravanello e spinaci: 1–2 trattamenti in un intervallo di 7–10 giorni. Rucola: 1–2 applicazioni per ricrescita. Insalate (Asteraceae): prima applicazione 2–3 giorni dopo la piantagione, seconda applicazione dopo 12–16 giorni.

Termine d'attesa: Cetrioli 5 giorni, ravanello e spinaci 2 settimane, rucola, insalate (Asteraceae) e Baby-Leaf (Asteraceae) 3 settimane.

Trattamento per annaffiatura nella coltura di **cicoria belga** contro Phytophthora cryptogea e Pythium spp.: spruzzare con 0,4 % e 20 ml/m². Diluire in acqua e spruzzare 4–6 litri di poltiglia/m² sulle radici di cicoria con radici nel contenitore di forzatura o nascoste nella sabbia. Oppure annaffiare con 20 ml/100 l di acqua soltanto come aggiunta alla soluzione nutritiva. Ciascuno ad inizio forzatura, solo 1 trattamento e come applicazione preventiva.

Campicoltura

Tabacco: contro Phytophthora spp. e Pythium spp. annaffiare con 6 ml/m². 2 l di acqua/m² o 20'000 l di acqua/ha. 1x 6 ml/m² (1 trattamento al massimo) oppure 2x 3 ml/m² (2 trattamenti al massimo). Soltanto per la produzione di piantine.

Attenzione

Si consiglia di effettuare diversi test di tollerabilità su alcune piante nel rispettivo stadio di crescita prima di trattare l'intera coltura. La tollerabilità dell'applicazione dovrebbe essere verificata al termine di un ciclo di moltiplicazione. Questo vale anche per le specie e le varietà classificate come ben tolleranti.

Un'applicazione senza prove di tollerabilità avviene a proprio rischio.

- Il prodotto presenta una buona tollerabilità con annaffiatura della superficie prima della ripicchettatura

Previcur[®] Energy

Attenzione 2

Specie e varietà di piante ornamentali ben tolleranti (spruzzatura): Pelargonium zonale, ibridi (varietà: Sassa, Isabell); veronica (ibridi di Hebe-Andersonii); agerato (varietà: Blue hawai); stella di Natale (varietà: Red Fox Metro); balsamina / Impatiens ibridi Nuova Guinea (varietà: Paraidse Grenada); lobelia (varietà: Blue wings); primula comune, ibridi (varietà: mix); begonia rifiorante (varietà: scarlatto salmone).

Specie e varietà di piante ornamentali con problemi di tollerabilità (l'applicazione non è raccomandata): Begonia rifiorante (varietà: White Milet, Rose Milet); salvia splendente (varietà: Maestro); viola cornuta (varietà: Martin), viola del pensiero (varietà: Fancy Gelb, Fancy Orange, Fama Reinblau).

Protezione dell'utilizzatore: È necessario indossare guanti di protezione durante la preparazione della poltiglia. Per l'applicazione "Annaffiare", per i lavori successivi in colture trattate indossare guanti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.

Protezione della gioventù: I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto (questa sostanza/questo preparato) soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le condizioni del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono una formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto (questa sostanza/questo preparato). Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.

Preparazione della soluzione

Riempire il contenitore per metà con acqua. Aggiungere la quantità necessaria del prodotto e rabboccare con l'agitatore in funzione. In caso di miscele, preparare dapprima la formulazione solida (WP, SG, WG). Utilizzare la soluzione entro un giorno dalla preparazione. Preparare solo la quantità di soluzione necessaria. Diluire la rimanenza nel rapporto 1 a 10 e applicarla sulla superficie appena trattata. Lavare a fondo i contenitori del prodotto vuoti con acqua e aggiungere l'acqua di lavaggio alla soluzione da applicare.

Miscela

Per le miscele, consultare la nostra Helpline o effettuare un test di compatibilità. Per il trattamento in semenzaio si sconsiglia l'impiego di Previcur Energy in miscela con altri prodotti.

Caratteristiche

Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.

Confezione

1 l, 12x 1 l

Marchio

® = Marchio registrato di Bayer Group

Versione

54674/0318