

	Saat	Keim-ung	Wachs-tum	Pikie-ren	Wachstum	Top-fen	Wachstum	Kno-spe	Blüh-beginn	Verkauf	Primula vulgaris (Kissenprimel) 9er-Topf	
W	1	2-3	4-5	6	7-11	12	13-30	32-33	34-35	36-40	Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger	
Σ	A.Juli	M.-E.Juli	A.Aug.	M.Aug.	E.Aug.-M.Sep.	E.Sept.	A.Okt.-M.Jan.	E.Jan.	M.Feb.	E.Feb.-E.März	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp	
			Wuxal Eisen Plus									Eisenmangel, Verbesserung Blattfarbe: 0,2 % giessen. Tipp: Kann bei akutem Eisenmangel bis 0,5 % erhöht werden. Wird über Blätter und Wurzeln aufgenommen
			Previcur Energy									Vermehrungspilze, Wurzelhalsfäulen: Previcur 0,25 % giessen, nach dem Pikieren. Tipp: Previcur Energy fördert die Resistenz der Pflanze und hat damit einen präventiven Nebeneffekt auf Bakteriosen.
			Hicure									Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % (25 ml in 10 l Wasser) spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.
			Wuxal Profi									Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.
			Wuxal Suspension Mn									Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.
			Limax Power									Schnecken: 5 g/10 m ² streuen. Tipp: Vorbeugend bei kleiner Pflanze streuen, damit die Schneckenkörner nicht auf den Blättern liegen bleiben.
				Neem Maag								Weisse Fliegen, Thrips, Blattläuse, Spinnmilben: 0,3 % (30 ml/10 l Wasser). Nicht mit anderen Produkten mischen und nicht bei zu starker Sonneneinstrahlung spritzen. Tipp: Biologischer Wirkstoff. Nicht in die Blüte spritzen (Phytotox)
				Perfetto								Blattfressende Raupen, Thripse: 0,6–0,8 % und 6–8 ml/10 m ² (60–80 ml/10 l Wasser). Minierfliegen: 0,8–1,6 % bei 8–16 ml/10 m ² (80–160 ml/10 l Wasser). Tipp: biologischer und teilsystemischer Wirkstoff.
			Kendo									Blattläuse, Raupen, Thrips: Kendo 0,01 % + Netzmittel: Etalfix Pro 0,02 % spritzen. Tipp: Kendo wirkt als Frass- und Kontaktmittel bereits ab 5 °C. Biologische Alternative: Pireto Maag 0,1 - 0,2 %.
			Vertimec Gold									Spinnmilben, Thrips, Minierfliegen, Weisse Fliegen, Blattläuse: Vertimec Gold 0,025-0,05% + Kendo 0,01 % spritzen.
			+ Kendo									
			Score Profi									Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Rost: 0,05% Score Profi + 0,05% Legan spritzen. . Bemerkung: Kontakt- und lokalsystemische Wirkung, abstoppend. Spezialist für Blattfleckenkrankheiten, sehr gut pflanzenverträglich. Kombination mit breitem Wirkungsspektrum.
			+ Legan									
			Play									Blütenbotrytis im Winter: Play 0,05 % (1 kg/ha) spritzen. Tipp: Oder Mapro 0,05 % als Alternative gegen Botrytis mit Wirkstoff aus anderer Gruppe.

	Saat	Keim- ung	Wachs- tum	Pikie- ren	Wachstum	Top- fen	Wachstum	Kno- spe	Blüh- beginn	Verkauf	Primula vulgaris (Kissenprimel) 9er-Topf
Σ	1	2-3	4-5	6	7-11	12	13-30	32-33	34-35	36-40	Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger
Σ	A.Juli	M.-E.Juli	A.Aug.	M.Aug.	E.Aug.-M.Sep.	E.Sept.	A.Okt.-M.Jan.	E.Jan.	M.Feb.	E.Feb.-E.März	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp
						Alibi Flora			Alibi Flora		Blattfleckenkrankheiten, Ramularia: Alibi Flora 0,1 % spritzen. Tipp: Alibi Flora ab 12 °C einsetzen, oder Legan zum Abwechseln der Wirkstoffgruppen.
						Mapro					Blütenbotrytis im Winter: Mapro 0,05 % spritzen. Tipp: Oder Play 0,05 % (1 kg/ha) mit systemischem Wirkstoff und Belagswirkstoff aus anderen Gruppen.
							Legan				Ramularia-Blattflecken: Legan 0,05 % spritzen. Tipp: Kontaktfungizid bereits ab 5 °C und vorbeugend einsetzen.
							Alar				Wachstumsregulierung: 0,03 % spritzen. Tipp: 1. Anwendung sobald getopfte Jungpflanze angewachsen bzw. erste Wurzeln sichtbar sind. 2. Anwendung ca. 10–14 Tage später. Auf wüchsige Pflanzen behandeln.
							Bonzi				Wachstumsregulierung: 0,25 % spritzen, je nach Sorte und Wuchskraft. Tipp: Auf wüchsige Pflanzen behandeln.