

# WACHSTUMSREGULATOREN

## Alar® und Bonzi®

Kultur	Alar® in %	Bonzi® in %	Anwendungszeitpunkt/Wirkung/Bemerkungen
Achimenes-Hybriden	0,2		Erste Behandlung bei ca. 5 cm Höhe. Rechtzeitig wiederholen.
Ageratum	0,3	0,15–0,25	Bei beginnendem Längenwachstum. Unter Hochglas oder Folie, eventuell wiederholen.
Allamanda cathartica	0,25		
Alonsoa		0,1–0,2	
Amaranthus	0,3		
Anagallis	0,3–0,5		
Anemone spp.	0,3	0,25–0,5	Wiederholen.
Anisodonteia capensis	0,15–0,25		Bei beginnendem Längenwachstum, eventuell wiederholen.
Anthemis	0,3	0,25	Bei Beginn des Durchtriebes nach Handstutz.
Antirrhinum		0,1–0,2	Eventuell wiederholen.
Argyranthemum frutescens (Strauchmargerite)	0,5	0,25–1	Bei beginnendem Längenwachstum rechtzeitig wiederholen.
Topf	0,2–0,4	0,5–1,5	5–10 Tage nach dem Stecken, bzw. Topfen. Mehrtrieber, wenn Neutriebe 2–3 cm lang sind. Vor allem bei stark wachsenden Sorten wiederholen.
Schnitt	0,4	0,5–1	Während des Stängelwachstums.
normale und gesteuerte Kultur	0,4	1,0–1,5	Kurzer Blütenhals: sobald Blütenknospen erkennbar.
Astern, Asteriscus	0,3		Eventuell wiederholen.
Bacopa Satura	0,3		
Begonia Elatior und Lorraine		0,25–0,5	Im Schlusstopp nach Durchwurzelung, besonders bei Begonia Lorraine rechtzeitig wiederholen. Kurze Blütenstiele: sobald Blütenknospen sichtbar.
Begonia Heterosis Nonstop		0,1–0,25	Beginnender Pflanzenaufbau.
Begonia semperflorens		0,05–0,15	Bei Beginn des Längenwachstums.
Begonia, Knollen- und Strauchbegonien		0,25–0,5	Mehrmals wiederholen.
Bellis	0,2–0,3	0,05–0,25	Sofort nach dem Anwachsen bei beginnendem Längenwachstum. Bei wüchsigen Wetter rechtzeitig wiederholen.
Beioperone guttata	0,3–0,5		Auf 10–12 cm hohe Pflanzen.
Bidens	0,5		
Bougainvillea-Hybriden		0,15–0,25	7 Tage nach dem Stutzen.
Brachycome	0,3	0,25	Bei Beginn des Durchtriebes nach Stutzen von Hand. Wiederholen.
Brassicaceae (Zierkohl)	Topf	0,25–0,5	Bei beginnendem Längenwachstum.
Browallia speciosa	0,3		Auf 8–10 cm hohe Pflanzen. 1 mal wiederholen.
Calceolaria-Hybriden		0,15–0,25	Bei beginnendem Längenwachstum. Beim Spritzen nur betauen.
Calceolaria polyrhiza/rugosa		0,15–0,25	Bei beginnendem Längenwachstum. Spritzbehandlungen rechtzeitig wiederholen.
Calendula officinalis	0,2–0,3		Auf 10–12 cm hohe Pflanzen.
Calibrachoa-Hybriden	0,3		
Callistephus	Topf, Schnitt	0,3–0,5	Auf 8–10 cm hohe Pflanzen. Rechtzeitig wiederholen.
Campanula isophylla	0,3		Bei 8–10 cm Triebhöhe, evtl., wiederholen.
Capsicum annum	0,3	0,25–0,5	Bei beginnendem Längenwachstum, evtl., wiederholen.
Catharanthus roseus		0,25–0,5	Bei Beginn des Pflanzenaufbaus.
Celosia argentea	0,3		Bei beginnendem Längenwachstum.
Cheiranthus		0,15–0,25	
Chrysanthemum indicum	0,4		2–3 Wochen nach dem Stutzen von Hand; Mini-Pflanzen: Mehrere Anwendungen je nach Sorten. Für kurzen Blütenstiel: Wenn die Terminalknospe sichtbar ist.
Chrysanthemum, Topf	0,2–0,4	0,5–1,5	5–10 Tage nach dem Stecken bzw. Topfen, wenn Neuzuwachs 2–3 cm lang ist.
Chrysanthemum, Schnitt	0,4		Während des Stängelwachstums, sobald Blütenknospen erkennbar sind.
Cineraria	0,2–0,3		Nach dem Einwurzeln im finalen Topf.
Coleus-blumei-Hybriden	0,3–0,5		Auf 6–10 cm hohe Pflanzen.
Columnea	0,2–0,3		Zu Beginn des Längenwachstums.
Cotoneaster	0,5		Auf den neuen Austrieb von ca. 3 cm.
Cosmea	0,5		
Crassula coccinea		0,25	Nach dem Durchwurzeln im Endtopf.

Kultur		Alar* in %	Bonzi* in %	Anwendungszeitpunkt/Wirkung/Bemerkungen
Crossandra		0,2–0,4		Zu Beginn des Längenwachstums.
Cuphea ignea			0,15–0,5	Bei beginnendem Längenwachstum.
Dahlia	Topf	0,3–0,5		Auf 5–8 cm hohe Pflanzen, eventuell wiederholen.
Dianthus	Topf		0,2–0,3	Nach Durchwurzelung im Endtopf. Rechtzeitig wiederholen.
Dicentra spectabilis	Topf		0,5–1	Bei beginnendem Längenwachstum. <b>Efalix Pro</b> 0,02 % zusetzen.
Dimorphotheca			0,3	
Dorotheanthus			0,2	
Dyssodia (Thymophylla tenuiloba)		0,3	0,25	Beginn Durchtrieb nach Stutzen von Hand.
Erigeron	Topf	0,3–0,5		
Euphorbia (Poinsettia pulcherrima)			0,1–0,25	Feste, farbintensive Brakteen. Bis spätestens Mitte Oktober.
			0,1	Zur Zeit der Brakteenausbildung sauberes (Regen-) Wasser verwenden.
Eustoma grandiflorum			0,25–0,5	Topfkultur. Rechtzeitig beginnen. Blaue: niedere Dosierung, weisse: höhere Dosierung.
Exacum affine		0,1–0,2		Bei beginnendem Längenwachstum wiederholen.
Felicia		0,3–0,5		
Forsythia		0,5	0,6	Seitentriebe mit einem guten Blütenknospenansatz.
Fuchsia spp.			0,5–0,6	Nach Durchwurzelung im Endtopf. Wiederholen. Bessere Verzweigung, mehr Seitentriebe.
Gazania		0,3–0,5		Auf 8–10 cm hohe Pflanzen. Im Endtopf rechtzeitig wiederholen.
Gerbera	Topf		0,3	Blütenknospen gerade sichtbar. Wiederholen.
Gnaphalium			0,25–0,5	Bei beginnendem Längenwachstum. Nur betauen
Gomphrena globosa	Topf		0,25–0,5	Bei beginnendem Längenwachstum. Wiederholen.
Grevillea		0,3		Auf 10–12 cm hohe Pflanzen.
Helianthus		0,4–0,5		
Heliotropium			0,25	Nach Durchwurzelung im Endtopf. Rechtzeitig wiederholen.
Hibiscus			0,1–0,2	Bei Beginn des Durchtriebes, eventuell wiederholen.
Hydrangea (Rohware)		0,2–0,4	0,5–1,0	Wenn Triebe 5–7 cm lang, evtl. wiederholen.
Hydrangea (Treiberei)		0,4	0,5–1,0	Bei beginnendem Längenwachstum, nach Bildung des 3. oder 4. Blattpaares.
Hypoestes phyllostachya			0,15–0,25	Bei beginnendem Längenwachstum.
Impatiens-Neu-Guinea-Hybriden		0,3	0,15–0,25	Bei beginnendem Längenwachstum.
Impatiens walleriana		0,3	0,1–0,15	Bei beginnendem Längenwachstum.
Iresine		0,3		
Kalanchoe-Hybriden		0,3–0,5	0,05–0,2	Bei beginnendem Längenwachstum. Kurze Blütenstiele. Stark wachsende Sorten <b>Bonzi</b> 0,2 %, wenn Blütenstiele 1–1,5 cm lang sind.
Lantana camara			0,25–0,5	Wüchsige Jungpflanzen ungestutzt oder auf 6 cm lange Triebe nach dem Pinzieren. Spritzbehandlung wiederholen.
Lavatera trimestris			0,15–0,25	Bei beginnendem Längenwachstum.
Leonotis leonurus			0,15–0,25	Nach Durchwurzelung im Endtopf, eventuell wiederholen.
Lilium	Topf		0,2–0,3	Bei 8–10 cm Triebhöhe. Nach Durchwurzelung 1–2 mal wiederholen.
Lobelia		0,3–0,5		Bei beginnendem Längenwachstum, eventuell wiederholen.
Matthiola (Levkoje)			0,2–0,3	Eventuell wiederholen.
Mesembryanthemum		0,2	0,25	Bei beginnendem Längenwachstum.
Million Beils		0,4	0,25	Nach dem Pinzieren auf ca. 1–2 cm hohe Pflanzen.
Mimulus			0,1–0,2	
Myosotis		0,2–0,3		
Nemesia			0,1–0,2	
Nicotiana affinis		0,3	0,25	
Nierembergia hippomanica		0,3		
Oxalis deppei			0,2–0,3	Kompakte, standfeste Pflanzen. Wenn Blätter schieben. In Abständen von 6–10 Tagen wiederholen.
Papaver		0,3	0,25–0,5	Spätestens zu Beginn des Blütenknospenansatzes.

Kultur		Alar* in %	Bonzi* in %	Anwendungszeitpunkt/Wirkung/Bemerkungen
Pelargonium zonale	Pikierstadium		0,1	Sämlinge von F1-Hybriden
	Endtopf		0,25	
Pelargonium zonale, -peltatum, vegetativ vermehrte Pflanzen				Für bessere Verzweigung.
	Bewurzelte Jungpflanzen im Endtopf		0,25–0,5	Pelargonium peltatum. Rechtzeitig wiederholen.
	Lichtarme Wintermonate		0,1	Pelargonium zonale/peltatum. Alle 3–4 Wochen wiederholen.
	Beginn Längenwachstum		0,1–0,25	Pelargonium zonale/peltatum.
Pentas			0,15–0,25	Im Endtopf nach Durchwurzelung bei 8–10 cm langen Trieben. Evtl. wiederh.
Petunia		0,3	0,1–0,25	Bei beginnendem Längenwachstum, eventuell wiederholen.
Plectranthus		0,3	0,25	Bei Austrieb nach Handstutz.
Plumbago		0,3		
Primula acaulis/polyantha		0,3	0,25	Im Endtopf; vor allem bei Hauskulturen.
Ranunculus	Topf	0,3	0,25–0,5	Wiederholen.
Rhododendron-Simsii-Hybriden (Azalee)		0,3–0,4	2–3	Triebabschluss und gleichmässiger Knospenansatz. <b>Alar:</b> frühe Sorten 1. Julihälfte, mittelfrühe 2. Julihälfte, späte Sorten bis Anfang August, 1 l Brühe auf 6–7 m <sup>2</sup> . <b>Bonzi:</b> 1–2 Wochen später, 15 l/Are.
Rosa	Topf		1–1,5	1. Behandlung bei 4–5 cm Trieblänge. Gut feucht halten.
Saintpaulia und Streptocarpus		0,3		Kurze Blatt- und Blütenstiele. Bei beginnendem Längenwachstum.
Sanvitalia		0,3		Bei beginnendem Längenwachstum.
Scaevola			0,25	
Schizanthus-wisetonensis- Hybriden		0,3	0,25	Bei beginnendem Längenwachstum.
Senecio (Cineraria-Hybriden)		0,3	0,25–0,5	Nach Durchwurzelung im Endtopf. Wiederholen.
Senecio (Cineraria maritima)		0,2	0,25	Bei beginnendem Längenwachstum.
Sinningia (Gloxinia)		0,2		Nach Durchwurzelung im Endtopf. Maximal 10 l Brühe/100 m <sup>2</sup> .
Solanum		0,3	0,25–0,5	Bei beginnendem Längenwachstum. Wiederholen.
Solanum (Ziertomate)		0,3		
Surfinia		0,3–0,5	0,25–0,5	Wiederholen.
Tagetes		0,3	0,25	Bei beginnendem Längenwachstum, eventuell wiederholen.
Tibouchina		0,3		Bei beginnendem Längenwachstum, eventuell wiederholen.
Torenia		0,3		Eventuell wiederholen.
Trachelium	Topf	0,3		Endtopf. Wiederholen.
Tradescantia			0,15	
Verbena-Hybriden		0,3	0,25–0,5	Bei beginnendem Längenwachstum, eventuell wiederholen.
Viola-wittrockiana-Hybriden (Pensees)		0,1–0,5		Grössere Frostresistenz. Sofort nach dem Anwachsen bei beginnendem Längenwachstum. Bei wüchsigem Wetter rechtzeitig wiederholen.
		0,5		
	Gefässkulturen		0,05–0,25	
Zinnia elegans		0,3		Bei beginnendem Längenwachstum. 1 mal wiederholen.