

Legan

Fungicida di contatto a largo spettro contro diverse malattie fungine delle piante ornamentali, della frutticoltura e viticoltura

- Nessun rischio di resistenza
- Impedisce la germinazione delle spore
- Ottima resistenza alla pioggia
- IL partner di miscelazione ideale con altri fungicidi

Principio attivo	70 % Ditianone
Formulazione	Granulare idrosolubile (WG)
Effetto	Legan è un fungicida di contatto con il principio attivo dithianon. Efficace contro numerose malattie fungine senza rischio di resistenza. Il principio attivo attacca vari siti nel sistema respiratorio delle cellule fungine. Impedisce la germinazione delle spore e la crescita micellare dei funghi. Dopo la spruzzatura, Legan forma un rivestimento fine e molto resistente alla pioggia sulle foglie e sui frutti. Questi depositi di principi attivi sono attivati ripetutamente dalle precipitazioni e dalla rugiada e assicurano un effetto sicuro e duraturo.
Modo d'uso	<p>In generale: 10 ml del misurino = 5 g Un misurino pieno = 40 g</p> <p>Piante ornamentali Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), colture da fiore e piante verdi: 0,05 % (5 g in 10 l d'acqua) contro le maculature fogliari, la Peronospora (diverse specie) e le ruggini su piante ornamentali, ticchiolatura della rosa. Azalee: 0,05 % (5 g in 10 l d'acqua) contro la bolla dell'azalea.</p> <p>Frutta In generale: La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni dell'UFAG. Ad eccezione della frutta a granelli: Non applicare in tutto più di 1680 g per ha della sostanza attiva ditianon per particella e anno. Frutta a granelli: 0,05 % (0,8 kg/ha) contro la ticchiolatura della frutta a granelli. Applicazione: dal germogliamento fino a fine giugno. Trattamenti dopo la fioritura: non applicare in tutto più di 3'400 g per ha della sostanza attiva ditianon per particella e anno.</p>

Legan

Modo d'uso 2

Ciliegio: 0,05 % (0,8 kg/ha) contro l'antracnosi e la cilindrosporiosi del ciliegio, vaiolatura della frutta a nocciolo. Termine d'attesa: 3 settimane.

Prugno/Susino: 0,05 % (0,8 kg/ha) contro i bozzacchioni del susino. Applicazione: trattamento unico all'apertura delle gemme. 0,05 % (0,8 kg/ha) contro la ruggine del susino. Termine d'attesa: 3 settimane.

Vigna

In generale: Al massimo 8 trattamenti per particella e anno con un prodotto contenente la sostanza attiva ditianon. Non trattare su uva da tavola. 0,05 % (0,8 kg/ha) contro la peronospora della vite. Applicazione: trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71–81 (J–M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità- referenza di poltiglia di 1'600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni dell'UFAG.

0,075 % (0,6 kg/ha) contro l'escoriosi della vite. Applicazione: BBCH 7–10 (Stadi C–D). La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 07–10 (C–D), trattamento con una quantità- referenza di poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo).

0,075 % (0,6 kg/ha) contro il rossore parassitario. Applicazione: Fino a BBCH 55 (stadio G). La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 55 (G), trattamento con una quantitàreferenza di poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo).

Attenzione

Il riutilizzo di questo imballaggio è proibito.

Distanza di sicurezza: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di **50 m** (frutti, alberi e arbusti), di **20 m**

(vigna, azalea, colture da fiore e piante verdi, rose) dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un **dilavamento**, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno **6 m**. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.

Protezione per l'utilizzatore: Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. **Lavori successivi** in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.

Preparazione della soluzione

Riempire il contenitore per metà con acqua, aggiungere la quantità necessaria di prodotto e rabboccare con l'agitatore in funzione.

Miscela

Legan può essere miscelato ad altri fungicidi (Score Profi, Topas, Nimrod, Alibi Flora), insetticidi secondo la guida Maag Profi.



Legan

Caratteristiche Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.

Confezione 500 g, 12x 500 g

Marchio ® = marchio registrato di una società del gruppo Syngenta

Versione 72940/1121
