

	plantation boutures	croissance	pincement	croissance (avec obscurcissement)	croissance	formations des boutons ébourgeonnage	début floraison	vente	Chrysanthèmes, cultures en pot					
mois sem.	1	2	3	4-8	9-11	12-13	14	dès 15	Insecticides	Fongicides	Herbicides	Mouillant	Rég. de crois.	Engrais
	déb. juill.	mi-juill.	mi-juill.	fin juill.-mi-août	fin août-déb. sept.	mi-sept.-fin-sept.	fin sept.	dès mi-oct.	Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque:					
	Prev. Energy								Champignons de la fonte, pourriture des racines: Arroser le substrat avec Previcur Energy 0,25 % avant le piquage. Remarque: Previcur Energy augmente la résistance de la plante, utilisé préventivement il possède un effet secondaire sur la bactériose.					
	Play								Rhizorctonia, Sclerotinia: Play 0,1%, bien mouiller la base des plantes.					
	Sequestrene Rapid								Carence en fer, amélioration de la couleur des feuilles : arroser 0,2 %. Remarque: ne pas mouiller les feuilles lors de l'arrosage. Pour éviter les brûlures sur les feuilles, laver celles qui ont été éclaboussées.					
	Wuxal Eisen Plus					Wuxal Eisen Plus			Carence en fer, amélioration de la couleur des feuilles : verser 0,2 %. Remarque: peut être augmenté jusqu'à 0,5 % en cas de carence aiguë en fer. Absorbé par les feuilles et les racines					
	Heritage Flow								Rouilles du chrysanthème : pulvériser Heritage Flow 0,1 % + Legan 0,05%					
	+ Legan								Remarque: Pour éviter les taches causées par Legan, ajouter un mouillant. Ou traiter uniquement avec Bion.					
	Bion								Rouille du chrysanthème : pulvériser 5 g/100 l d'eau. Remarque: en prévention, respecter précisément le dosage, traiter max 5 fois à intervalles de 10 jours. On peut mélanger Hicure avec lo 0,25 %.					
	Hicure								Biostimulant de haute qualité, accroît la vitalité des plantes et la croissance des racines, prolonge la durabilité et tolérance face à la sécheresse, stimule la pénétration rapide et les effets des engrais foliaires: pulvériser ou arroser avec 0,25 %. Remarque: les meilleurs effets d'Hicure sont obtenus lors d'applications avant des phases critiques de croissance (développement racinaire, induction florale) ou lorsque les conditions de croissance sont sous-optimales (gel, stress dû à la sécheresse, chaleur). Plusieurs applications répétées sont plus efficaces qu'un seul et unique traitement.					
	Wuxal Profi								Engrais liquide, engrais foliaire avec effet mouillant, évite les situations de stress: 0,2% en arrosage ou pulvérisation. Remarque: ajouter comme mouillant aux bouillies générant des taches. La fumure foliaire stimule la formation de racines et l'absorption de nutriments.					
	Fonganil								Pourriture des racines et des tiges : arroser 0,2 % (5 l/ha). Remarque: ajouter un produit partenaire approprié pour éviter le développement de résistances.					
	Score Profi								Maladie des taches foliaires, oïdium, rouille: pulvériser avec 0,05 %. Remarque: effet systémique local, stoppant, spécialiste des maladies des taches foliaires, très bien toléré par les plantes, ne tache pas.					
	+ Legan WG								Septoria, Ascochyta : pulvériser Legan 0,05 % + rouille, oïdium : Alibi Flora 0,1 %. Utiliser Legan à titre préventif. Ne traiter qu'à partir de la fin de l'obscurcissement avec le partenaire Alibi Flora.					
				Alibi Flora										

	plantation boutures	croissance	pincement	croissance (avec obscurcissement)	croissance	formations des boutons ébourgeonnage	début floraison	vente	Chrysanthèmes, cultures en pot							
mois sem.	1	2	3	4-8	9-11	12-13	14	dès 15	Insecticides	Fongicides	Herbicides	Mouillant	Rég. de crois.	Engrais		
	déb. juill.	mi-juill.	mi-juill.	fin juill.-mi-août	fin août-déb. sept.	mi-sept.-fin-sept.	fin sept.	dès mi-oct.	Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque:							
	Perfetto								Chenilles défoliatrices, thrips: 0,6–0,8 % et 6–8 ml/10 m ² (60–80 ml/10 l d'eau) ainsi que contre les mouches mineuses 0,8–1,6 % et 8–16 ml/10 m ² (80–160 ml/10 l d'eau). Remarque: agent biologique et partial systemique.							
	Piretro Maag								Pucerons, acariens, mouches blanches, thrips: 0,1 -0,2 % (10- 20 ml / 10 l d'eau). Remarque: matière active biologique et de contact. Traiter de préférence le soir.							
	Neem Maag								Mouche blanches, thrips, pucerons, acariens: 0,3 % (30 ml/10 l d'eau). Ne pas mélanger avec d'autres produits et ne pas pulvériser en cas de trop fort ensoleillement.							
	Spomil								Acariens : pulvériser avec 0,1 %. Remarque: pour éviter les résistances, on peut aussi utiliser Vermitec Gold.							
	Vertimec Gold								Thrips, (Acariens, mouches mineuses, mouches blanches): pulvériser 0,05 %. Pour une bonne pénétration, appliquer par temps couvert ou tirer les ombrages. Alternative contre les acariens uniquement : Spomil.							
	Kendo								Thrips, pucerons et mouches blanches: pulvériser Kendo 0,01 % Remarque: Kendo a un effet secondaire contre les punaises.							
	Perfetto								Mouches mineuses : pulvériser 0,01 %. Remarque: en cas de forte infestation, il est également possible d'ajouter du Vertimec Gold 0,025.							
	Bonzi									Régulateur de croissance: 0,1–0,3 % 5–10 jours après la mise en pot. Ramification des tiges lorsque les nouvelles pousses font 2–3 cm. Remarque: répéter surtout sur les variétés à forte croissance.						
	Wuxal Suspension Mg								Engrais foliaire contre carence en magnésium latente et aiguë: pulvériser 30–50 ml/10 l d'eau. Remarque: Ajouter 2–3 fois aux pulvérisations. Favorise la chlorophylle. Ne pas traiter les fleurs.							
	Wuxal Suspension Ca								Engrais foliaire contre la carence en calcium : pulvériser 30–50 ml/10 l d'eau. Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. Remarque: ne pas traiter les fleurs.							
	Wuxal Suspension Mn								Engrais foliaire contre la carence en manganèse : pulvériser 30–50 ml/10 l d'eau. Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. Remarque: ne pas traiter les fleurs.							
	Alar								Régulateur de croissance: 0,2–0,4 % 5–10 jours après la fin de l'obscurcissement. Remarque: Appliquer juste avant que le bouton floral se décolle des folioles, cela permettra d'éviter une trop forte élévation des pédoncules floraux.							
									Play		Botrytis des fleurs : pulvériser avec Play 0,05 % (1 Kg/ha) . Remarque: ne pas pulvériser les boutons ni les fleurs ouvertes.					
									Kendo		Thrips: Kendo 0,01 % + mouillant: Etalfix Pro 0,02 %. Remarque: on peut employer Wuxal Profi 0,2 % en lieu d'Etalfix Pro. L'engrais foliaire revitalise les feuilles et possède également une légère action d'agent mouillant.					
									+ Etalfix Pro							
									Vertimec Gold		Thrips, acariens, mouches mineuses: pulvériser Vertimec 0,05 %. Pour une bonne pénétration, appliquer par temps couvert ou tirer les ombrages. Remarque: contre les thrips et les mouches mineuses on peut aussi utiliser Perfetto.					