

	semis	germination	croissance	piquage	croissance	mise en pot	pincer (26) déb. août	pincer (31) déb. sept.	début floraison	vente	
mois	1	2-3	4-9	10	11-18	19	20-33	34	35-43		
sem.	mi-févr.			mois avril		mi-juin	déb. août - fin sept.		fin sept.	mi-oct.-mi-déc.	
											Cyclamen persicum (cyclamen) en pot de 11 cm pour la vente en oct.-nov.
											Insecticides Fongicides Herbicides Mouillant Rég. de crois. Engrais
											Agents pathogènes, dosage, utilisation, Remarque
											Champignons de la fonte, pourriture des racines: arroser avec 0,25 % de Previcur après le piquage.
											Champignons de la fonte (Pythium spp et Phytophthora spp): arroser Fonganil 0,02 % (5 l/ha) après le piquage. Remarque: comme alternative on peut également mélange 25 ml/m ³ au terreau ou arroser avec Previcur Energy.
											Mouches mineuses, Thrips, Chenilles défoliatrices: 0,8–1,6 % et 8–16 ml/ 10 m ² (80–160 ml/10 l d'eau). Remarque: Répéter les application contre le thrips, il ne faut pas laisser les populations s'installer. Alternier deux applications avec Perfetto avec deux applications avec Vertimec Gold. Matières actives biologiques à mode d'action pénétrant.
											Sciarides (adultes et larves): pulvériser avec 0,01 %. Remarque: bien mouiller la surface du substrat. Répéter jusqu'à ce qu'aucun adulte ne vole plus et que le cycle de vie soit interrompu.
											Thrips, Acariens, Tarsonèmes: pulvériser avec 0,5 %. Pour favoriser l'activité, traiter par temps couvert ou tirer les ombrages.
											Acarien jaune commun et Micro acariens (Tarsonèmes, ériophyides): pulvériser avec 0,1 %. Remarque: gestion de la résistance: utiliser en alternance Vertimec Gold
											Pucerons, acariens, mouches blanches, mouches mineuses, thrips: pulvériser avec 0,3 %. Remarque: Dès l'apparition de l'attaque, 2 à 3 applications avec un intervalle de 7 à 10 jours.
											Pucerons et mouches blanches : pulvériser avec 0,01 %.
											Champignons de la fonte, pourriture des racines: arroser avec 0,25 % de Previcur Energy après le piquage. Remarque: Previcur Energy stimule les défenses immunitaires de la plante.
											Botrytis, Pourritures basales: Bien mouiller le cœur des plantes avec une petite buse d'arrosage. Dosage Play ou Mapro, 0,05%
											Maladies fongiques des feuilles: pulvériser avec 0,2 % Remarque: Comme alternative on peut utiliser Cuprofix 35 avec 0,2 %.
											Carence en fer (rare) : Sequestrene 0,2 % + fertilisation générale: arroser avec Wuxal Profi 0,2 %. Remarque: la carence en fer ne se manifeste par la décoloration des feuilles, mais en bordure des feuilles. ne pas mouiller les feuilles lors de l'arrosage. Laver les feuilles éclaboussées par la bouillie afin d'éviter les brûlures.
											Carence en fer, amélioration de la couleur des feuilles: verser 0,2 %. Remarque: peut être augmenté jusqu'à 0,5 % en cas de carence aiguë en fer. Absorbé par les feuilles et les racines

	semis	germination	croissance	piquage	croissance	mise en pot	pincer (26) déb. août	pincer (31) déb. sept.	début floraison	vente	
	1	2-3	4-9	10	11-18	19			34	35-43	Cyclamen persicum (cyclamen) en pot de 11 cm pour la vente en oct.-nov.
sem.	1	2-3	4-9	10	11-18	19			34	35-43	Insecticides Fongicides Herbicides Mouillant Rég. de crois. Engrais
mois	mi-févr.			mois avril		mi-juin		déb. août - fin sept.	fin sept.	mi-oct.-mi-déc.	Agents pathogènes, dosage, utilisation, Remarque
											Biostimulant de haute qualité , accroît la vitalité des plantes et la croissance des racines, prolonge la durabilité et tolérance face à la sécheresse, stimule la pénétration rapide et les effets des engrais foliaires: pulvériser ou arroser avec 0,25 %. Remarque: les meilleurs effets d'Hicure sont obtenus lors d'applications avant des phases critiques de croissance (développement racinaire, induction florale) ou lorsque les conditions de croissance sont sous-optimales (gel, stress dû à la sécheresse, chaleur). Plusieurs applications répétées sont plus efficaces qu'un seul et unique traitement.
											Engrais liquide, engrais foliaire avec effet mouillant, évite les situations de stress: 0,2 % en arrosage ou pulvérisation. Remarque: ajouter comme mouillant aux bouillies générant des taches. La fumure foliaire stimule la formation de racines et l'absorption de nutriments.
											Engrais foliaire contre carence en magnésium latente et aiguë: pulvériser 30-50 ml/10 l d'eau. Remarque: Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. Favorise la chlorophylle. Ne pas traiter les fleurs.
											Engrais foliaire contre la carence en manganèse: pulvériser 30-50 ml/10 l d'eau. Remarque: Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. ne pas traiter les fleurs.
											Vertimec Gold Thrips: pulvériser avec 0,05 %. Remarque: pulvériser dans le cœur de la plante. Ajouter un mouillant pour une meilleure imprégnation et répartition de la matière active.