

| piquer         | formation racines | mise en pot         | croissance                  | pincer         | croissance               | début floraison  | vente            | massifs de fleurs |  | <b>Fuchsia hybrides (fuchsia)</b>   |
|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|---|
| 1<br>fin janv. | 2<br>fin janv.    | 4<br>fin-févr.      | 5-6<br>fin. févr.-déb. mars | 7<br>déb. mars | 8-14<br>déb. mars-mi-mai | dès 14<br>mi-mai | 16-18<br>dès mai | dès 16<br>dès mai |  | <b>Insecticides</b> <b>Fongicides</b> <b>Herbicides</b> <b>Mouillant</b> <b>Rég. de crois.</b> <b>Engrais</b><br><b>Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque</b>  |
|                |                   |                     | journée longue (> 14 h)     |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Longueur du jour:</b> jour long (longueur du jour > 14 h) pour la croissance végétative, jour court (< 14 h) pour favoriser la formation des fleurs.   |
|                | Previcur Energy   |                     |                             |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Pourriture des racines (Pythium, Phytophthora):</b> arroser avec Previcur Energy 0,25 % dès le piquage. <b>Remarque:</b> arroser de nouveau après l'enracinement avec 0,25 %. Comme alternative on peut utiliser également Fonganil.   |
|                | Fonganil          |                     |                             |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Pourriture des racines (Pythium, Phytophthora):</b> arroser Fonganil 0,02 % (5dl/ha) après le piquage. <b>Remarque:</b> Previcur Energy comme alternative.   |
|                | Kendo             |                     |                             |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Sciarides (adultes et larves):</b> pulvériser avec 0,01 %. <b>Remarque:</b> bien mouiller la surface du substrat. Répéter les traitements à intervalles de 5 jours jusqu'à ce qu'aucun adulte ne vole plus. Ainsi le traitement interrompt le cycle de vie des sciarides.  |
|                |                   | Hicure              |                             |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Biostimulant de haute qualité, accroît la vitalité des plantes et la croissance des racines, prolonge la durabilité et tolérance face à la sécheresse, stimule la pénétration rapide et les effets des engrais foliaires:</b> pulvériser ou arroser avec 0,25 %. <b>Remarque:</b> les meilleurs effets d'Hicure sont obtenus lors d'applications avant des phases critiques de croissance (développement racinaire, induction florale) ou lorsque les conditions de croissance sont sous-optimales (températures basses, stress dû à la sécheresse, chaleur). Plusieurs applications répétées sont plus efficaces qu'un seul et unique traitement. |
|                |                   | Wuxal Suspension Mg |                             |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Carence en magnésium (=taches rouges sur les feuilles):</b> pulvériser avec 0,2 %. <b>Remarque:</b> application de l'engrais foliaire par ciel complètement couvert ou le soir.  |
|                |                   | Wuxal Profi         |                             |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Engrais liquide, engrais foliaire avec effet mouillant, évite les situations de stress:</b> arroser 0,2 %. <b>Remarque:</b> effet de fertilisation foliaire si l'on arrose les plantes par le dessus, la formation des racines est stimulée, l'absorption des nutriments accrue. Dans ce cas, arroser par temps couvert ou en fin de Journée.  |
|                | BIO               | Neem Maag           |                             |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Mouche blanches, thrips, pucerons, acariens:</b> 0,3 % (30 ml/10 l d'eau). Ne pas mélanger avec d'autres produits et ne pas pulvériser en cas de trop fort ensoleillement.   |
|                | BIO               | Perfetto            |                             |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Chenilles défoliatrices, thrips:</b> 0,6–0,8 % et 6–8 ml/10 m <sup>2</sup> (60–80 ml/10 l d'eau) ainsi que contre les mouches mineuses 0,8–1,6 % et 8–16 ml/ 10 m <sup>2</sup> (80–160 ml/10 l d'eau). <b>Remarque:</b> agent biologique et partial systemique.  |
|                |                   | Kendo               |                             |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Mouches blanches, pucerons, mouches mineuses, thrips:</b> pulvériser avec 0,01 % (1 ml/10 l d'eau). <b>Remarque:</b> l'adjonction d'un mouillant ou de Wuxal Profi améliore l'efficacité. Effet secondaire sur les punaises.   |
|                |                   | Vertimec Gold       |                             |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Pucerons, mouches blanches, thrips, acariens et mineuses:</b> pulvériser Vertimec 0,025 % + Kendo 0,01%. <b>Remarque:</b> mélange en cuve avec un très large spectre d'efficacité.   |
|                |                   | + Kendo             |                             |                |                          |                  |                  |                   |  |   |
|                |                   | Vertimec Gold       |                             |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Tarsonèmes, thrips, acariens, mouches blanches:</b> pulvériser avec 0,025 %, thrips 0,05 %. <b>Remarque:</b> traiter tôt le matin ou le soir (en serre seulement).   |

| piquer         | formation racines | mise en pot    | croissance                  | pincer         | croissance               | début floraison  | vente            | massifs de fleurs |  | <b>Fuchsia hybrides (fuchsia)</b>   |
|----------------|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|---|
| 1<br>fin janv. | 2<br>fin janv.    | 4<br>fin-févr. | 5-6<br>fin. févr.-déb. mars | 7<br>déb. mars | 8-14<br>déb. mars-mi-mai | dès 14<br>mi-mai | 16-18<br>dès mai | dès 16<br>dès mai |  | <b>Insecticides</b> <b>Fongicides</b> <b>Herbicides</b> <b>Mouillant</b> <b>Rég. de crois.</b> <b>Engrais</b><br><b>Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque</b>  |
|                |                   |                | journée longue (> 14 h)     |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Longueur du jour:</b> jour long (longueur du jour > 14 h) pour la croissance végétative, jour court (< 14 h) pour favoriser la formation des fleurs.   |
|                |                   |                | Spomil                      |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Acariens:</b> pulvériser avec 0,1 % (en plein air).<br><b>Remarque:</b> pour la gestion des résistances, ajouter Vertimec Gold comme alternative à la bouillie.  |
|                |                   |                | + Etalfix Pro               |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Ajouter un mouillant ou l'engrais foliaire Wuxal:</b> utiliser Etalfix Pro 0,02 % ou Wuxal Profi 0,2 % pour les mélanges en cuve.<br><b>Remarque:</b> Traiter uniquement lorsque l'application peut sécher rapidement, mais jamais par forte chaleur (Max. 25°C.). Les engrais foliaires ont un effet revitalisant pour les feuilles et favorisent l'activité et l'absorption de nutriments des racines. |
|                |                   |                | ou                          |                |                          |                  |                  |                   |  |   |
|                |                   |                | Wuxal Profi                 |                |                          |                  |                  |                   |  |   |
|                |                   |                | Play                        |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Pourriture grise des tiges, botrytis des feuilles:</b> pulvériser avec Play 0,05 % (1 kg/ha) bien humecter l'ensemble de la végétation. <b>Remarque:</b> Favoriser un séchage rapide. Gestion de la résistance: alterner avec Mapro.   |
|                |                   |                | Alibi Flora                 |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Taches foliaires, rouille du fuchsia, oïdium:</b> pulvériser Alibi Flora 0,1 % +Legan 0,05 %. <b>Remarque:</b> Gestion des résistances -> alterner avec Tega.  |
|                |                   |                | + Legan                     |                |                          |                  |                  |                   |  |   |
|                |                   |                | Score Profi                 |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Maladie des taches foliaires, oïdium, rouille:</b> pulvériser 0,05 %.<br><b>Remarque:</b> effet systémique local, stoppant, spécialiste des maladies des taches foliaires, très bien toléré par les plantes, ne tache pas.   |
|                |                   |                | Topas                       |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Oïdium:</b> pulvériser avec 0,025 %.<br><b>Remarque:</b> préférer les variétés résistantes.  |
|                |                   |                | Nimrod                      |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Oïdium:</b> pulvériser avec 0,1-0,2 %. Traiter les plantes en floraison avec 0,1 %.<br><b>Remarque:</b> humecter légèrement les plantes en floraison avec une buse fine.   |
|                |                   |                | Bonzi                       |                |                          |                  |                  |                   |  | <b>Régulateur de croissance:</b> pulvériser avec 0,15 % à 0,5% selon la vigueur de la variété, 10 jours après l'empotage. <b>Remarque:</b> Les traitements précoces(20 février ~) favorisent la floraison pour la fête des mères.   |