

	piquer	formation racines	croissance	mise en pot	croissance	début floraison	vente	<b>Impatiens hybrides Hawkeri (Impatiens Nouvelle-Guinée) en pot de 12 cm pour la vente début mai</b>
mois sem.	1	2	3-5	6	7-11	12	13-15	Insecticides Fongicides Herbicides Mouillant Rég. de crois. Engrais
	fin janv.	déb. févr.	déb. févr.-fin févr.	fin févr.	fin févr.-déb. mars	mi-avr.	fin avr.-déb. mai	<b>Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque:</b>
				Previcur Energy				<b>Champignons de la fonte (Pythium spp et Phytophthora spp):</b> arroser avec Previcur Energy 0,25 % dès le piquage.
	Fonganiil			Fonganiil				<b>Champignons de la fonte, pourriture des racines:</b> arroser Fonganiil 0,02 % (5 l/ha) après le piquage et la mise en pot. <b>Remarque:</b> Previcur Energy comme alternative.
		Play						<b>Pourriture grise (botrytis):</b> pulvériser avec Play 0,05 % (1 kg/ha), bien mouiller la base des plantes. <b>Remarque:</b> ne pas piquer ni mettre en pot trop profondément. Les feuilles sont très fragiles et sensibles au botrytis.
				Hicure				<b>Biostimulant de haute qualité, accroît la vitalité des plantes et la croissance des racines, prolonge la durabilité et tolérance face à la sécheresse, stimule la pénétration rapide et les effets des engrais foliaires:</b> pulvériser ou arroser avec 0,25 %. <b>Remarque:</b> les meilleurs effets d'Hicure sont obtenus lors d'applications avant des phases critiques de croissance (développement racinaire, induction florale) ou lorsque les conditions de croissance sont sous-optimales (gel, stress dû à la sécheresse, chaleur). Plusieurs applications répétées sont plus efficaces qu'un seul et unique traitement.
					Kendo			<b>Sciarides (adultes et larves):</b> pulvériser avec 0,01 %. <b>Remarque:</b> bien mouiller la surface du substrat. Répéter jusqu'à ce qu'aucun adulte ne vole plus et que le cycle de vie soit interrompu.
				Neem Maag				<b>Mouche blanches, thrips, pucerons, acariens:</b> 0,3 % (30 ml/10 l d'eau). Ne pas mélanger avec d'autres produits et ne pas pulvériser en cas de trop fort ensoleillement.
				Perfetto				<b>Chenilles défoliatrices, thrips:</b> 0,6–0,8 % et 6–8 ml/10 m <sup>2</sup> (60–80 ml/10 l d'eau) ainsi que contre les mouches mineuses 0,8–1,6 % et 8–16 ml/ 10 m <sup>2</sup> (80–160 ml/10 l d'eau). <b>Remarque:</b> agent biologique et partial systémique.
						Spomil		<b>Acariens:</b> pulvériser avec 0,1 % (Plein air). <b>Remarque:</b> Gestion de la résistance: utiliser Vertimec Gold en alternance.
				Vertimec Gold				<b>Tarsonèmes, thrips, acariens, mouches blanches:</b> pulvériser avec 0,025 % (thrips 0,05%) + Etalfix Pro 0,02 %. <b>Remarque:</b> traiter tôt le matin ou le soir. L'adjonction d'un mouillant améliore l'efficacité.
				Etalfix Pro				
					Kendo			<b>Pucerons, mouches blanches, mouches mineuses, thrips:</b> pulvériser avec 0,01 %. <b>Remarque:</b> l'adjonction du mouillant Etalfix Pro ou de Wuxal Profi comme engrais foliaire améliore l'effet.
				Vertimec Gold				<b>Pucerons, mouches blanches, thrips, acariens et mineuses:</b> pulvériser Vertimec 0,025 % + Kendo 0,01%. <b>Remarque:</b> mélange en cuve avec un très large spectre d'efficacité.
				+ Kendo				

	piquer	formation racines	croissance	mise en pot	croissance	début floraison	vente	<b>Impatiens hybrides Hawkeri (Impatiens Nouvelle-Guinée) en pot de 12 cm pour la vente début mai</b> Insecticides   Fongicides   Herbicides   Mouillant   Rég. de croiss.   Engrais
mois sem.	1	2	3-5	6	7-11	12	13-15	
	fin janv.	déb. févr.	déb. févr.-fin-févr.	fin févr.	fin févr.-déb. mars	mi-avr.	fin avr.-déb. mai	<b>Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque:</b> Engrais liquide, engrais foliaire avec effet mouillant, évite les situations de stress: 0,2% en arrosage ou pulvérisation. <b>Remarque:</b> ajouter comme mouillant aux bouillies générant des taches. La fumure foliaire stimule la formation de racines et l'absorption de nutriments. Engrais foliaire contre carence en magnésium latente et aiguë: pulvériser 30-50 ml/10 l d'eau. <b>Remarque:</b> Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. Favorise la chlorophylle. Ne pas traiter les fleurs. Engrais foliaire contre la carence en manganèse: pulvériser 30-50 ml/10 l d'eau. Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. Ne pas traiter les fleurs. Régulateur de croissance: pulvériser avec 0,3 %. <b>Remarque:</b> 1. Traiter dès que les jeunes plantes en pots commencent à pousser resp. que les premières racines sont visibles et lorsque l'allongement de la tige commence. Répéter éventuellement. Traiter les plantes vigoureuses. Régulateur de croissance: pulvériser avec 0,05 - 0,1 %. <b>Remarque:</b> Quand les plantes sont bien établi, traiter plusieurs fois. Botrytis des fleurs : pulvériser avec Play 0,05 % (1 kg/ha) . <b>Remarque:</b> à partir de la floraison, ajouter Etalfix Pro 0,02% afin d'éviter toute tache de bouillie.
								Wuxal Profi
								Wuxal Suspension Mg
								Wuxal Suspension Mn
								Alar
								Bonzi
								Play + Etalfix Pro