

	semis	germination	croissance	piquer	croissance	mise en pot	croissance	bourgeons	début floraison	vente	Primula vulgaris (primevère commune) en pot de 9 cm
mois sem.	1	2-3	4-5	6	7-11	12	13-30	32-33	34-35	36-40	Insecticides Fongicides Herbicides Mouillant Rég. de crois. Engrais
	déb. juill.	mi-fin-juill.	déb. août	mi-août	fin août-mi-sept.	fin sept.	déb. oct.-mi-janv.	fin janv.	mi-févr.	fin févr.-fin mars	Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque:
											Carence en fer, amélioration de la couleur des feuilles : dosage 0,2 %. Remarque: peut être augmenté jusqu'à 0,5 % en cas de carence aiguë en fer. Absorbé par les feuilles et les racines
											Champignons de la fonte, pourriture des racines: arroser avec 0,25 % de Previcur Energy après le piquage. Remarque: Previcur Energy stimule la résistance des plantes et possède ainsi un effet secondaire préventif contre les bactérioses.
											Biostimulant de haute qualité, accroît la vitalité des plantes et la croissance des racines, prolonge la durabilité et la tolérance à la sécheresse, stimule la pénétration rapide et les effets des engrais foliaires: pulvériser ou arroser avec 0,25 % (25 ml dans 10 l d'eau). Remarque: les meilleurs effets d'Hicure sont obtenus lors d'applications avant des phases critiques de croissance (développement racinaire, induction florale) ou lorsque les conditions de croissance sont sous-optimales (gel, stress dû à la sécheresse, chaleur). Plusieurs applications répétées sont plus efficaces qu'un seul et unique traitement.
											Engrais liquide à absorption foliaire et racinaire avec effet mouillant, évite les situations de stress: 0,2% en arrosage ou pulvérisation. Remarque: ajouter comme mouillant aux bouillies générant des taches. La fumure foliaire stimule la formation de racines et l'absorption de nutriments.
											Engrais foliaire contre la carence en manganèse : pulvériser 30–50 ml/10 l d'eau. Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. ne pas traiter les fleurs.
											Limaces: épandre 5 g/10 m ² . Remarque: épandre préventivement autour des petites plantes afin que les granulés ne restent pas sur les feuilles.
											Mouche blanches, thrips, pucerons, acariens: 0,3 % (30 ml/10 l d'eau). Ne pas mélanger avec d'autres produits et ne pas pulvériser en cas de trop fort ensoleillement.
											Chenilles défoliatrices, thrips: 0,6–0,8 % et 6–8 ml/10 m ² (60–80 ml/10 l d'eau) ainsi que contre les mouches mineuses 0,8–1,6 % et 8–16 ml/ 10 m ² (80–160 ml/10 l d'eau). Remarque: agent biologique à action pénétrante.
											Pucerons, chenilles, thrips : Kendo 0,01 % + mouillant: Etalfix Pro 0,02 %. Remarque: Kendo agit par contact et par ingestion dès 5 °C. Alternative biologique: Piretro Maag: 0,1-0,2 %.
											Pucerons, mouches blanches, thrips, acariens et mineuses: pulvériser Vertimec 0,025 % + Kendo 0,01 %. Remarque: Mélange à effet très large.
											Maladie des taches foliaires, oïdium, rouille: pulvériser 0,05 % + 0,05% Legan. Combinaison à large spectre et activités multiples. Remarque: Action de contact et pénétrante, préventive et stoppante. Spécialiste des maladies des taches foliaires, très bien toléré par les plantes..

	semis	germination	croissance	piquer	croissance	mise en pot	croissance	bourgeons	début floraison	vente	Primula vulgaris (primevère commune) en pot de 9 cm						
mois sem.	1	2-3	4-5	6	7-11	12	13-30	32-33	34-35	36-40	Insecticides	Fongicides	Herbicides	Mouillant	Rég. de crois.	Engrais	
	déb. juill.	mi-fin-juill.	déb. août	mi-août	fin août-mi-sept.	fin sept.	déb. oct.-mi-janv.	fin janv.	mi-févr.	fin févr.-fin mars	Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque:						
					Play							Pourriture grise des fleurs en hiver : pulvériser avec Play 0,05 % (1 kg/ha) . Remarque: ou pulvériser avec Mapro 0,05 % d'un autre groupe de matière active comme alternative.					
						Alibi Flora			Alibi Flora			Maladie des taches foliaires, Ramulariose: pulvériser 0,1 % d'Alibi Flora. Remarque: utiliser Alibi Flora à partir de 12 °C.					
						Mapro					Pourriture grise des fleurs en hiver : pulvériser Mapro 0,05 %. Remarque: ou pulvériser Play 0,05% (1 kg/ha) avec matière active systémique et de contact d'un autre groupe de matières actives. Play est à Utiliser de préférence par temps poussant.						
							Legan				Ramulariose: pulvériser avec Legan 0,05 %. Remarque: fongicide de contact agissant dès 5 °C, traiter préventivement.						
						Alar					Régulateur de croissance: pulvériser avec 0,03 %. Remarque: 1re application dès que les jeunes plantes en pot commencent à pousser, que les premières racines apparaissent et que la croissance de la tige commence. 2e application, env. 10 à 14 jours plus tard. Traiter les plantes en pleine croissance.						
						Bonzi					Régulateur de croissance: pulvériser 0,25%, selon la variété et la puissance de croissance. Remarque: Traiter les plantes en pleine croissance.						