


	repos hivernal	taille	Débourrement	1re flor.	régéné-ration	2e flor.	régéné-ration	3e flor.	régénération	4e flor.	repos hivernal	Rosa odorata, roses à couper en serre					
Sem	1-7	8	9-14	15-16	17-23	23-24	25-32	33-34	35-44	45-47	48-52	Insecticides	Fongicides	Herbicides	Mouillant	Rég. de crois.	Engrais
Mois	déb. janv.-mi-févr.	mi-févr.-fin févr.	fin févr.-fin mars	mi-avr.	fin avr.-mi-juin	mi-juin-fin juin	fin juin.-mi-août	mi/fin août	fin août/mi-nov.	mi-fin nov.	fin nov.-fin déc.	Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque					
	Cuprofix / C. Fluid + Genol Plant										C./C.Fluid + Genol	<p>Maladies fongiques: pulvériser Cuprofix Fluid à 0,35 % ou Cuprofix 35 à 0,35 %.</p> <p>Acarie: pulvériser Genol Plant à 2 % (200 ml dans 10 l d'eau).</p> <p>Remarque: Utilisation avec Genol Plant en fin d'automne, après une prétaillage, et en février, juste avant le débourrement. Ce mélange a un très large spectre d'activités. Bien mouiller, les bois en particulier.</p>					
	Hicure											<p>Biostimulant de haute qualité, accroît la vitalité des plantes et la croissance des racines, prolonge la durabilité et tolérance face à la sécheresse, stimule la pénétration rapide et les effets des engrais foliaires: pulvériser ou arroser à 0,25 % (25 ml dans 10 l d'eau). Remarque: les meilleurs effets d'Hicure sont obtenus lors d'applications avant des phases critiques de croissance (développement racinaire, induction florale) ou lorsque les conditions de croissance sont sous-optimales (gel, stress dû à la sécheresse, chaleur). Plusieurs applications répétées sont plus efficaces qu'un seul et unique traitement.</p>					
	Wuxal Profi											<p>Engrais liquide, engrais foliaire avec effet mouillant, évite les situations de stress: 0,2 % en arrosage ou pulvérisation. Remarque: ajouter comme mouillant aux bouillies générant des taches. La fumure foliaire stimule la formation des racines et l'absorption de nutriments.</p>					
	Wuxal Suspension Mg											<p>Engrais foliaire contre carence en magnésium latente et aiguë: pulvériser 30–50 ml/10 l d'eau. Remarque: Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. Favorise la chlorophylle. Ne pas traiter les fleurs.</p>					
	Wuxal Suspension Mn											<p>Engrais foliaire contre la carence en manganèse : pulvériser 30–50 ml/10 l d'eau. Remarque: Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. ne pas traiter les fleurs.</p>					
	Sequestrene Rapid											<p>Carence en fer, amélioration de la couleur des feuilles : arroser 0,2 %.Remarque: ne pas mouiller les feuilles lors de l'arrosage. Laver les feuilles ébloussées par la bouillie afin d'éviter les brûlures.</p>					
	Wuxal Eisen Plus											<p>Carence en fer, amélioration de la couleur des feuilles : dosage 0,2 % . Remarque: peut être augmenté jusqu'à 0,5 % en cas de carence aiguë en fer. Composé d'une forme de chélate très rapidement assimilable, d'azote et de soufre, Wuxal eisen Plus est absorbé par les feuilles et les racines.</p>					
	Legan											<p>Maladie des taches noires du rosier, rouille, maladies des taches foliaires: pulvériser Legan à 0,05 % . Remarque: Produit à action de contact, à utiliser préventivement. En association, il est un partenaire idéal aux fongicides pénétrant ou systémique.</p>					

	repos hivernal	taille	Débourrement	1re flor.	régéné-ration	2e flor.	régéné-ration	3e flor.	régénération	4e flor.	repos hivernal	Rosa odorata, roses à couper en serre						
Sem	1-7	8	9-14	15-16	17-23	23-24	25-32	33-34	35-44	45-47	48-52	Insecticides	Fongicides	Herbicides	Mouillant	Rég. de croiss.	Engrais	
Mois	déb. janv.-mi-févr.	mi-févr.-fin févr.	fin févr.-fin mars	mi-avr.	fin avr.-mi-juin	mi-juin-fin juin	fin juin.-mi-août	mi/fin août	fin août/mi-nov.	mi-fin nov.	fin nov.-fin déc.	Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque						
																		Oïdium: pulvériser à 0,5 %. Remarque: n'employer que préventivement, répéter régulièrement, ne pas traiter par forte chaleur, effet secondaire sur les acariens.
																		Pucerons, chenilles, thrips : pulvériser avec Kendo 0,01 %. Remarque: très bonne efficacité dès 5 °C. Se mélange très bien avec Play contre le botrytis.
																		Mouche blanches, thrips, pucerons, acariens: 0,3 % (30 ml/10 l d'eau). Ne pas mélanger avec d'autres produits et ne pas pulvériser en cas de trop fort ensoleillement.
																		Pucerons, thrips, acariens: pulvériser avec 0,1 - 0,2 %. Remarque: matière active biologique avec action de contact. Traiter de préférence en fin de journée.
																		Chenilles défoliatrices, thrips : 0,6–0,8 % et 6–8 ml/10 m ² (60–80 ml/10 l d'eau) Remarque: Produit biologique à action pénétrante.
																		Acariens: pulvériser 0,1 % (uniquement en plein air). Remarque: effet de contact. La plante doit être bien mouillée de tous les côtés.
																		Acariens, thrips, mouches blanches: pulvériser Vertimec Gold 0,025 % (Acariens, Mouches blanches), 0,05 % (Thrips). Remarque: Utiliser Vertimec Gold à partir de 15 °C. Le mélange peut être également combiné avec Play 0,05% contre le botrytis.
																		Oïdium, rouille, fumagine étoilée, mildiou (dégâts sur feuilles), 0.8 -1.2 % Remarque: Produit biologique à action pénétrante.
																		Oïdium, rouille, fumagine étoilée, mildiou : Alibi Flora 0,1 % + Legan 0,05 %. Remarque: Ce mélange combine tous les modes d'action et a une activité préventive et curative sur l'ensemble des pathogènes du rosier.
																		Maladie des taches foliaires, oïdium, rouille, maladie des taches noires du rosier: pulvériser avec 0,05 %. Remarque: effet systémique local, stoppant, très bien toléré par les plantes, ne tache pas.
																		Oïdium, rouille, pourriture grise (effet partiel): pulvériser avec 0,1 %. Remarque: traiter préventivement. La matière active renforce la chlorophylle (effet vert).

	repos hivernal	taille	Débourrement	1re flor.	régéné-ration	2e flor.	régéné-ration	3e flor.	régénération	4e flor.	repos hivernal	Rosa odorata, roses à couper en serre					
Sem	1-7	8	9-14	15-16	17-23	23-24	25-32	33-34	35-44	45-47	48-52	Insecticides	Fongicides	Herbicides	Mouillant	Rég. de croiss.	Engrais
Mois	déb. janv.- mi-févr.	mi-févr.- fin févr.	fin févr.- fin mars	mi-avr.	fin avr.- mi-juin	mi-juin- fin juin	fin juin.- mi-août	mi/fin août	fin août/mi-nov.	mi-fin nov.	fin nov.-fin déc.	Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque					
				Score Profi								Oïdium, rouille, maladie des taches noires du rosier: pulvériser Score Profi 0,05 % + Legan 0,05 %. Remarque: Action pénétrante et de contact, préventive et stoppante, très bien tolérée. Mélange possible avec Hicure 0,25 %.					
				+ Legan													
								Nimrod				Oïdium: pulvériser avec 0,1 %. Remarque: Répéter tous les 10-15 jours. Alternier avec Topas.					
				Topas					Oïdium: pulvériser avec 0,025 %. Remarque: Répéter tous les 10-15 jours, alterner avec Nimrod.								
				Play								Botrytis: pulvériser à 0,1 %. Remarque: Dosage à 0,05% (1 kg/ha) pendant la floraison.					
						Duplosan KV-Combi				Mauvaises herbes: pulvériser 25 ml/are après la plantation. Remarque: uniquement pour la culture en plein champ, faible effet sur l'arabette des champs, les repousses de céréales, le gaillet gratteron, les renouées, la mousse.							
	Stomp Aqua											Désherbage avant le débourrement: Appliquer 35ml/are de Stomp Aqua + 50 à 100ml / are de Touchdown sur sol humide. Remarque: Uniquement les cultures en plein champ. Respecter un délai de dix jours entre la taille et le traitement. Appliquer le plus tard possible avant le débourrement, mais jamais sur de la végétation active.					
	Touchdown S4																