

	piquer	croissance	tuteut souple	croissance	pinçage	croissance	forma- tion des boutons	début floraison	vente	Rosa odorata, culture en pot sous serre pots de 10 cm, culture sur 4 mois, printemps						
sem	1	2-4	5	6-12	13	14-15	17	18	19	Insecticides	Fongicides	Herbicides	Mouillant	Rég. de croiss.	Engrais	
M	déb. janv.	mi-janv.-déb. févr.	mi-févr.	fin févr.-mi-avr.	mi-avr.	mi-avr.-déb. mai	déb. mai	mi-mai	dès mi-mai	Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque						
		Sequestrene Rapid									Carence en fer, amélioration de la couleur des feuilles : arroser 0,2 %. Remarque: ne pas mouiller les feuilles lors de l'arrosage. Laver les feuilles éclaboussées par la bouillie afin d'éviter les brûlures.					
		Wuxal Eisen Plus									Carence en fer, amélioration de la couleur des feuilles : verser 0,2 %. Remarque: peut être augmenté jusqu'à 0,5 % en cas de carence aiguë en fer. Absorbé par les feuilles et les racines					
		Hicure									Biostimulant de haute qualité, accroît la vitalité des plantes et la croissance des racines, prolonge la durabilité et tolérance face à la sécheresse, stimule la pénétration rapide et les effets des engrais foliaires : pulvériser ou arroser à 0,25 % (25 ml dans 10 l d'eau). Remarque: les meilleurs effets d'Hicure sont obtenus lors d'applications avant des phases critiques de croissance (développement racinaire, induction florale) ou lorsque les conditions de croissance sont sous-optimales (gel, stress dû à la sécheresse, chaleur). Plusieurs applications répétées sont plus efficaces qu'un seul et unique traitement.					
		Wuxal Profi									Engrais liquide, engrais foliaire avec effet mouillant, évite les situations de stress : 0,2 % en arrosage ou pulvérisation. Remarque: ajouter comme mouillant aux bouillies générant des taches. L'engrais foliaire favorise la formation des racines et augment la résistance.					
		Wuxal Suspension Mg									Engrais foliaire contre carence en magnésium latente et aiguë : pulvériser 30–50 ml/10 l d'eau. Remarque: Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. Favorise la chlorophylle. Ne pas traiter les fleurs.					
		Wuxal Suspension Mn									Engrais foliaire contre la carence en manganèse : pulvériser 30–50 ml/10 l d'eau. Remarque: ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. ne pas traiter les fleurs.					
			Bonzi							Régulateur de croissance : pulvériser les rosiers en pot avec 1-1,5 % lorsque les pousses atteignent 4-5 cm. Remarque: garder le substrat régulièrement humide après le traitement.						
		Kendo									Pucerons, chenilles, thrips : pulvériser avec Kendo 0,01 %. Remarque: très bonne efficacité dès 5 °C. Se mélange très bien avec Play contre le botrytis.					
		Neem Maag									Mouche blanches, thrips, pucerons, acariens : 0,3 % (30 ml/10 l d'eau). Ne pas mélanger avec d'autres produits et ne pas pulvériser en cas de trop fort ensoleillement.					
		Piretro Maag									Pucerons, thrips, acariens : pulvériser avec 0,1 - 0,2 %. Remarque: matière active biologique avec action de contact. Traiter de préférence en fin de journée.					

	piquer	croissance	tuteut souple	croissance	pinçage	croissance	forma- tion des boutons	début floraison	vente	Rosa odorata, culture en pot sous serre pots de 10 cm, culture sur 4 mois, printemps	
		Perfetto									Chenilles défoliatrices, thrips: 0,6–0,8 % et 6–8 ml/10 m ² (60–80 ml/10 l d'eau). Remarque: agent biologique avec systemie partielle.
		Vertimec Gold									Acariens, Mouches mineuses, mouches blanches: pulvériser Vertimec Gold 0,025 %, thrips: Vertimec Gold 0,05 %. Mouches blanches, pucerons, ajouter Kendo 0,01 %.
		+ Kendo									Remarque: Vertimec Gold à partir de 15 °C. Le mélange peut être également combiné avec Play 0,05% contre le botrytis.
		Fonganil									Mildiou: pulvériser Fonganil 0,02 % (en serre) + Legan 0,05 %. Remarque: en alternance, on peut également traiter avec Previcur Energy
		Legan									Maladie des taches noires du rosier, mildiou, oïdium, rouille, maladie des taches foliaires: Dosage 0,05 %. Remarque: Produit de contact à utiliser préventivement.
		Heritage Flow									Oïdium, rouille, pourriture grise (effet partiel): pulvériser avec 0,1 %. Remarque: Produit pénétrant à action préventive, ne tache pas. La matière active renforce la chlorophylle (effet vert).
		Alibi Flora									Oïdium, rouille, maladie des taches noires du rosier: pulvériser Alibi Flora 0,1 % + Legan 0,05 %. Remarque: Solution à large spectre d'action pour le rosier.
		Thiovit Fluid									Oïdium: pulvériser à 0,5 %. Remarque: n'employer que préventivement, répéter régulièrement, ne pas traiter par forte chaleur, effet secondaire sur les acariens.
		Score Profi									Maladie des taches foliaires, oïdium, rouille, maladie des taches noires du rosier: dosage 0,05 %. Remarque: En cas de forte pression Oïdium, ajouter Topas 0,025% Action pénétrante et stoppante, très bien toléré par les plantes, ne tache pas.
			Nimrod								Oïdium: pulvériser avec 0,1 %. Remarque: Répéter tous les 10-15 jours. Alternier avec Topas.
					Topas						Oïdium: pulvériser avec 0,025 %. Remarque: Répéter tous les 10-15 jours, alterner avec Nimrod.
		Play									Botrytis: pulvériser à 0,1 %. Remarque: Dosage à 0,05% (1 kg/ha) sur plantes fleuries.