


	semis	germination	croissance	repiquer resp. mise en pot	croissance	pinçage	croissance	début floraison	vente	massifs de fleurs	
	1	2	3-5	5	5-8	9	10-12	13	13-15	dès 13	Verbena hybrides (verveine) en pot de 11 cm pour la vente début mai
mois sem	mi-févr.	mi-févr.	fin. févr.-déb. mars	mi-mars	fin mars - mi-avr.	mi-avr.	mi-avr.-déb. mai	mi-mai	dès mai	dès mai	Insecticides Fongicides Herbicides Mouillant Rég. de crois. Dünger
											Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque
											Champignons de la fonte (Pythium spp et Phytophthora spp): traitement par arrosage à 0,25% aussitôt après les semis Remarque: arroser après le repiquage ou le repotage et l'enracinement ou arroser de manière répétée avec 0,25%. Comme alternative on peut utiliser également Fonganil.
											Champignons de la fonte, pourriture des racines: arroser avec 0,02% après le piquage. Remarque: Previcur Energy en arrosage comme alternative.
											Sciarides (adultes et larves): pulvériser avec 0,01 %. Remarque: bien mouiller la surface du substrat. Répéter les traitements à intervalles de 5 jours jusqu'à ce qu'aucun adulte ne vole plus. Ainsi le traitement interrompt le cycle de vie des sciarides.
											Biostimulant de haute qualité, accroît la vitalité des plantes et la croissance des racines, prolonge la durabilité et tolérance face à la sécheresse, stimule la pénétration rapide et les effets des engrais foliaires: pulvériser ou arroser avec 0,25 %. Remarque: les meilleurs effets d'Hicure sont obtenus lors d'applications avant des phases critiques de croissance (développement racinaire, induction florale) ou lorsque les conditions de croissance sont sous-optimales (gel, stress dû à la sécheresse, chaleur). Plusieurs applications répétées sont plus efficaces qu'un seul et unique traitement.
											Pucerons, mouches blanches, thrips: pulvériser avec 0,01 %. Remarque: l'adjonction d'un mouillant ou de Wuxal Profi améliore l'efficacité.
											Pucerons, mouches blanche, thrips, acariens : pulvériser à 0,1 -0,2 %. Remarque: Produit biologique avec action de contact. Si possible traiter le soir.
											Pucerons, mouches blanches, thrips, acariens et mineuses: pulvériser Vertimec 0,025 % + Kendo 0,01 %. Remarque: mélange en cuve avec un très large spectre d'efficacité.
											Tarsonèmes, thrips, acariens, mouches blanches: pulvériser avec 0,025 %. Remarque: traiter tôt le matin ou le soir (en serre seulement). Ajouter le mouillant Etalfix Pro ou l'engrais foliaire à propriété d'agent mouillant Wuxal Profi.
											Acariens : pulvériser avec 0,04 %. Remarque: pour la gestion des résistances, ajouter Vertimec comme alternative à la bouillie.
											Ajouter un mouillant ou l'engrais foliaire Wuxal: utiliser Etalfix Pro 0,02 % ou Wuxal Profi 0,2 % pour les mélanges en cuve. Remarque: en cas d'utilisation de mélange en cuve avec engrais foliaire traiter uniquement le soir ou lorsque le ciel est couvert. Les engrais foliaires ont un effet revitalisant pour les feuilles et favorisent l'activité et l'absorption de nutriments des racines.

	semis	germination	croissance	repiquer resp. mise en pot	croissance	pinçage	croissance	début floraison	vente	massifs de fleurs		
mois sem.	1	2	3-5	5	5-8	9	10-12	13	13-15	dès 13		
	mi-févr.	mi-févr.	fin. févr.-déb. mars	mi-mars	fin mars - mi-avr.	mi-avr.	mi-avr.-déb. mai	mi-mai	dès mai	dès mai		
											Verbena hybrides (verveine) en pot de 11 cm pour la vente début mai	
											Insecticides Fongicides Herbicides Mouillant Rég. de croiss. Dünger	
											Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque	
					Alibi Flora							Taches foliaires en général: pulvériser Alibi Flora à 0,1 %. Remarque: ajouter Hicure à 0,25 % pour augmenter le mécanisme de défense de la plante.
					Legan							Mildiou et nombreuses autres maladies foliaires: pulvériser Legan 0,05 %. Remarque: Partenaire idéal d'Alibi Flora ou Score Profi. Ajouter le mouillant Etalfix Pro 0,02 % pour éviter les taches de traitement.
							Score Profi				Maladie des taches foliaires, rouille: pulvériser Score Profi à 0,05 %, en cas de présence d'Oïdium, ajouter Topas 0,025%. Remarque: Activité systémique locale avec effet préventif et curatif; très bien toléré par les plantes, ne tache pas.	
							Topas				Oïdium: pulvériser avec 0,025 %. Remarque: En alternance avec Nimrod 0,1%	
						Nimrod					Oïdium: pulvériser avec 0,1 %. Remarque: Utilisation seul.	
					Cuprofix Fluid							Mildiou: pulvériser Cuprofix Fluid à 0,2 %. Remarque: Alternative Cuprofix 35 à 0,15 %. Traiter de manière préventive.
					Play							Pourriture grise (botrytis): pulvériser avec Play 0,05 % (1 kg/ha) . Remarque: meilleure répartition avec l'ajout d'Etalfix Pro ou de Wuxal Profi.
						Wuxal Profi					Engrais liquide, à assimilation foliaire et racinaire. Effet mouillant. Arroser ou pulvériser 0,2 %. Remarque: Favorise la formation des racines, stimule la croissance. Appliquer par temps couvert ou en fin de journée pour favoriser l'absorption des nutriments.	
						Alar					Régulateur de croissance: pulvériser avec 0,3-0,4 %. Remarque: 1re application dès que les premières racines apparaissent et que l'élongation de la tige commence. Répéter le traitement selon la croissance. Traiter lors de températures favorables à la croissance.	
						Bonzi					Régulateur de croissance: pulvériser avec 0,25-0,5 %. Remarque: Favorise la ramification. Répéter dès le début de l'allongement par températures favorables à la croissance. Traiter en fin de journée ou par temps couvert, pour favoriser l'assimilation.	