

	semis	germinati on	germ. jusqu'à 4 feuill.	croissance	début floraison	vente automne	Viola wittrockiana (Pensée) culture de plein champ pour vente en automne
mois	1	2	3+4	sem. de culture 6-11	13 14-15	15-19	Insecticides Fongicides Herbicides Mouillant Rég. de crois. Engrais
sept	fin juin			août - sept.	fin sept. déb. oct.	déb. oct. déb. nov.	Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque
							Désinfection du sol: épandre régulièrement et enfouir Basamid en granulés 4-5 kg/are. Remarque: planifier la désinfection du sol des plates-bandes suffisamment tôt.
							Champignons de la fonte, pourriture des racines: arroser avec 0,25 % de Previcur Energy après le piquage. Remarque: Previcur Energy augmente la résistance de la plante, utilisé préventivement il possède un effet secondaire sur la bactériose. Ne pas appliquer Previcur Energy sur les fleurs.
							Mauvaises herbes et graminées annuelles, sans galinsoga et séneçon: pulvériser 25 ml/are (2,5 l/ha) avant la plantation. Remarque: ne convient que pour la plantation des plantes en pot et en motte.
							Mildiou et champignons de la fonte (Phytophthora, Phytium): pulvériser avec 0,02% ou arroser. Remarque: premier traitement immédiatement après plantation, deuxième traitement trois semaines après. Arroser sur les mottes humides afin que la matière active pénètre profondément.
							Ramulariose: pulvériser Score Profi à 0,05 % + Legan 0,05 % après le piquage. Remarque: Alternative: Alibi Flora 0,1 % + Hicure à 0,25 %.
							Taches foliaires, ramulariose, oïdium: pulvériser Alibi Flora à 0,1 % + Hicure à 0,25 %. Remarque: Hicure augmente le mécanisme de défense de la plante.
							Acariens : pulvériser Spomil à 0,1 % (en plein champ). Remarque: Action de contact, repartir la bouillie sur toute la plante.
							Mouches mineuses, Acariens: pulvériser Vertimec Gold à 0,025 %. Remarque: par une température de 12 °C au moins pendant 12 h.
							Pucerons, chenilles, thrips : pulvériser avec 0,01 %. Remarque: très bonne efficacité dès 5 °C. Se mélange très bien avec Play contre le botrytis des fleurs.
							Mouche blanches, thrips, pucerons, acariens: 0,3 % (30 ml/10 l d'eau). Ne pas mélanger avec d'autres produits et ne pas pulvériser en cas de trop fort ensoleillement.
							Pucerons, acarines, thrips : pulvériser à 0,1 -0,2 %. Remarque: Produit biologique, avec action de contact. Traiter si possible le soir.
							Engrais foliaire contre carence en magnésium latente et aiguë: pulvériser 30–50 ml/10 l d'eau. Remarque: Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. Favorise la chlorophylle. Ne pas traiter les fleurs.

