

	semis	germination	germ. jusqu'à 4 feuill.	mise en pot	croissance					début floraison	vente au printemps	<b>Viola wittrockiana (pensée)</b> culture en pot pour vente au printemps									
mois sem.	1	2	3+4	5	sem. de culture 6-26					27-32		33-36		Insecticides	Fongicides	Herbicides	Mouillant	Rég. de crois.	Engrais		
	mi-août			fin sept.	Oct.	nov.	déc.	Janvier	déb.févr.	févr.	févr.	déb. mars	mi-mars	fin mars	<b>Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque:</b>						
																					<b>Champignons de la fonte, pourriture des racines:</b> arroser avec 0,25 % de Previcur Energy après le piquage. <b>Remarque:</b> Previcur Energy augmente la résistance de la plante, utilisé préventivement il possède un effet secondaire sur la bactériose. Ne pas appliquer Previcur Energy sur les fleurs.
																					<b>Mildiou et champignons de la fonte (Phytophthora, Phytium):</b> pulvériser à 0,02 % ou arroser. <b>Remarque:</b> premier traitement immédiatement après plantation ou mise en pot, deuxième traitement trois semaines après. Arroser sur les mottes humides afin que la matière active pénètre profondément.
																					<b>Ramulariose:</b> pulvériser Score Profi 0,05 % + Legan 0,05 % après le piquage et répéter avec 10 jours d'intervalle. <b>Remarque:</b> Alternative: Alibi Flora 0,1 % + Hicure 0,25 %.
																					<b>Taches foliaires, ramulariose, oïdium:</b> pulvériser à 0,1 % + Hicure 0,25 %. <b>Remarque:</b> Hicure augmente le mécanisme de défense de la plante.
																					<b>Carence en fer, amélioration de la couleur des feuilles :</b> arroser 0,2 %. <b>Remarque:</b> ne pas mouiller les feuilles lors de l'arrosage. Laver les feuilles éclaboussées par la bouillie afin d'éviter les brûlures.
																					<b>Carence en fer, amélioration de la couleur des feuilles :</b> Utiliser 0,2 % en arrosage, en prenant soins de bien mouiller le feuillage. <b>Remarque:</b> peut être augmenté jusqu'à 0,5 % en cas de carence aiguë en fer. Absorbé par les feuilles et les racines.
																					<b>Engrais foliaire contre carence en magnésium latente et aiguë:</b> pulvériser 30-50 ml/10 l d'eau. <b>Remarque:</b> Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. Favorise la chlorophylle. Ne pas traiter les fleurs.
																					<b>Engrais foliaire contre la carence en manganèse :</b> pulvériser 30-50 ml/10 l d'eau. Ajouter 2-3 fois aux pulvérisations. ne pas traiter les fleurs.
																					<b>Mouche blanches, thrips, pucerons, acariens:</b> 0,3 % (30 ml/10 l d'eau). Ne pas mélanger avec d'autres produits et ne pas pulvériser en cas de trop fort ensoleillement.
																					<b>Acariens, pucerons, thrips :</b> pulvériser Piretro Maag à 0,1 - 0,2 %. <b>Remarque:</b> Produit biologique avec action de contact. Traiter si possible le soir.
																					<b>Acariens :</b> pulvériser Vertimec Gold 0,025 %. <b>Remarque:</b> Température minimum 12 °C, au moins pendant 12 h.

