

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Gazon
													Insecticides Fongicides Herbicides Mouillant Rég. de crois. Engrais
													Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque
													Qualibra Contre les taches sèches, rend le sol plus facile à réhumidifier et favorise sa capacité de rétention de l'eau: Qualibra 20 l/ha (200 ml/are). Remarque: permet de gagner du temps, aisé à manipuler. Qualibra est à la fois un mouillant et un agent de rétention d'eau.
Medallion TL													Moissure des neiges: 3 l/ha (30 ml/are) Utilisation de préférence lorsque les températures basses ≤ 12°C et que les autres produits à mode d'action systémique de devraient plus être utilisés. Remarque:: L'herbe doit rester exempte d'infestation jusqu'à la première chute de neige.
													Hicure Biostimulant de haute qualité, accroît la vitalité des plantes et la croissance des racines, prolonge la durabilité et tolérance face à la sécheresse, stimule la pénétration rapide et les effets des engrais foliaires: pulvériser ou arroser avec 0,25 % (25 ml/are). Remarque: les meilleurs effets d'Hicure sont obtenus lors d'applications avant des phases critiques de croissance (développement racinaire, avant et après d'importantes sollicitations) ou lorsque les conditions de croissance sont sous-optimales (gel, stress dû à la sécheresse, chaleur). Plusieurs applications répétées sont plus efficaces qu'un seul et unique traitement.
													Wuxal Profi Favorise la croissance: 2 l/ha (20 ml/are). Remarque: Il est appliqué durant la période où les gazons ont le plus besoin d'éléments nutritifs. Wuxal Profi diminue la tension superficielle de l'eau et possède ainsi les propriétés d'un mouillant pouvant être utilisé en mélange avec divers produits pour la protection des plantes.
													Wuxal Suspension Ca Avec calcium pour une meilleure croissance racinaire et résistance contre les maladies: 3-5 l/ha (30-50 ml/are) fertilisation foliaire. Remarque: traiter régulièrement.
													Wuxal Suspension Mg Développement d'une verte chlorophylle foncé ainsi que contre la carence de magnésium latente ou aigue: 3-5 l/ha (30-50 ml/are). Remarque: traiter régulièrement.
													Wuxal Suspension Mn Développement d'une verte chlorophylle foncé ainsi que contre la carence de manganèse latente ou aigue: 3-5 l/ha (30-50 ml/are). Remarque: traiter régulièrement.
													Wuxal Eisen Plus Carence en fer, amélioration de la couleur des feuilles : verser 0,2 %. Remarque: peut être augmenté jusqu'à 0,5 % en cas de carence aiguë en fer. Absorbé par les feuilles et les racines
													Kendo Larve de tipules: pulvériser 0,3 l/ha (3 ml/are). Remarque: il est conseillé de pulvériser le soir. Si nécessaire, répéter le traitement après 7 jours.

janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Gazon					
												Insecticides	Fongicides	Herbicides	Mouillant	Rég. de crois.	Engrais
												Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque					
													<p>Algues, lichens, mousses (bryophytes) et hépatiques: Mélanger avec de l'eau dans une proportion de 1 volume d'MossKade pour 9 volumes d'eau (exemple pour 20 l de bouillie: 2 l de MossKade et 18 l d'eau). Remarque: Appliquer MossKade seulement avec une buse à jet plat (par ex. TeeJet 8005). Assurer un bon mouillage pour une bonne pénétration suffisante de la mousse.</p> <p>Gazon d'ornement: Traitement avec un pulvérisateur à dos, 20–40 l de bouillie/100 m². La quantité de bouillie indiquée pour le gazon ornemental est élevée, de manière à assurer une bonne pénétration du traitement, en raison du plus grand volume de mousse généralement rencontré dans ce genre de surface.</p> <p>Terrains de sports, fairway et greens: 20–25 l de bouillie/100 m². La quantité de bouillie dépend de la densité de la mousse.</p>				
													<p>Herbicide de post-levée contre toutes les mauvaises herbes importantes dans le gazon : Pulvérisation de 40 ml/10 l d'eau par are (100 m²). Remarque: les meilleurs résultats sont obtenus lors de l'application sur des gazons vigoureux et poussants. Appliquer au plus tôt 4 jours après la dernière tonte sur des mauvaises herbes sèches complètement développées. Après l'application, attendre 4 à 10 jours avant la prochaine tonte. Ne pas traiter de suite après une longue période de pluie, par forte chaleur <25°C, et préférer, tant que possible, un temps couvert, de manière à ce que l'application ne sèche pas trop vite.</p>				
													<p>Mauvaises herbes annuelles et vivaces: pulvériser régulièrement Pixie 2 l/ha (20 ml/are) + Duplosan KV Combi 4 l/ha (40 ml/are dans 10 l d'eau). Remarque: ne pas traiter par temps chaud et ensoleillé. Traitement à partir de 10-12 °C.</p>				
													<p>Mauvaises herbes annuelles: pulvériser 2 l/ha (20 ml/are dans 10 l d'eau) ou arroser avec 2 ml dans 10 l d'eau/10 m². Remarque: L'application par pulvérisation est plus efficace. Dernière tonte 3 à 4 jours avant le traitement. Appliquer par des températures > 8 °C. Prochaine tonte au plus tôt 4 jours, au mieux 8 à 10 jours après. Ne pas traiter le gazon l'année même de son ensemencement.</p>				
													<p>Mauvaises herbes annuelles: pulvériser régulièrement 4 l/ha (40 ml/are dans 10 l d'eau). Remarque: sur le gazon récent, traitement la première année au plus tôt après la 3e tonte. Traiter par temps favorable à la croissance, par des températures de 15 à 25 °C et sur sol humide.</p>				
													<p>Dollar spot, anthracnose du gazon, fil rouge, moisissure des neiges: pulvériser 3 l/ha (30 ml/are) d'Instrata Elite. Remarque: fongicide à action de contact et systémique contrôlant les maladies d'été et d'hiver du gazon.</p>				

janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Gazon
												Insecticides Fongicides Herbicides Mouillant Rég. de crois. Engrais Agents pathogènes, dosage, utilisation, remarque
			Heritage Flow									Ronds de sorcière: pulvériser Heriatge Flow 1 l/ha (10 ml/are) + Qualibra 20 l/ha (200 ml/are) Remarque: Idéalement , injections de la bouillie à l'aide d'un pal-injecteur dans la zone du mycélium.
				+ Qualibra								
			Heritage Flow									Maladies fongiques du gazon: pulvériser Heritage Flow 1 l/ha (10 ml/are) Remarque: fongicide à large spectre contre toutes les maladies d'été.
			Tega									Oïdium, Rynchosporium, rouille, sclérotinose et autres taches foliaires: pulvériser 0,8 kg/ha (8 g/are). Remarque: traiter préventivement.
				Primo Maxx								Régulateur de croissance: Green: 0,4 -0,8 l/ha (4-8 ml/are); Fairway: 0,8-1,6 l/ha 8-16 ml (gazon de golf et de polo avec forte teneur en ray-grass, augmenter le dosage jusqu'à max. 2,4 l/ha (24 ml/are). (gazon d'ornement et de sport 1,5 l/ha (15 ml/are). Remarque: Diminution de la fréquence des tontes, moins de volume de déchets, renforcement de l'enracinement, effet verdissant (green effect), visible au bout de 3 à 5 jours.
				Touchdown S4 / Roundup UltraPro								Renouvellement complet du gazon avec herbicide total: pulvériser avec Touchdown S4 50 ml/are ou Roundup UltraPro. Remarque: lors du traitement, la végétation doit se trouver en croissance active.
										Play		Moisissure des neiges: pulvériser 1,5 kg/ha (15 g/are). Remarque: période de traitement idéale, avant l'hiver, sur un gazon encore en croissance, et répéter le traitement au dégel. Entre ces deux applications, utiliser Medaillon lorsque les températures sont basse.
											Medallion TL	Moisissure des neiges: 3 l/ha (30 ml/are) Remarque: Le gazon devrait être exempt d'infestations aux premières chutes de neige.