

Stecken	Wurzelbildung	Topfen	Wachstum	Stuzen	Wachstum	Blühbeginn	Verkauf	Pflanzbeete	Fuchsia-Hybriden (Fuchsien)
1	2	4	5-6	7	8-14	ab 14	16-18	ab 16	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Insektizide</span> <span>Fungizide</span> <span>Herbizide</span> <span>Netzmittel</span> <span>Wachs. Reg</span> <span>Dünger</span> </div>
E.Jan.	E.Jan	E.Febr.	E.Febr.-A.März.	A.März	A.März.-M.Mai	M.Mai	ab Mai	ab Mai	<b>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</b>
			Langtag (< 14 h)						Tageslänge: Langtag (Tageslänge > 14 h) für vegetatives Wachstum. Kurztag (< 14 h) zur Förderung der Blütenbildung.
									<b>Previcur Energy</b> Wurzelfäule (Pythium, Phytophthora): Previcur Energy 0,25 % giessen, sofort nach der Saat. <b>Tipp:</b> Nach Durchwurzelung wiederholt giessen mit 0,25 %. Alternativ kann auch Fonganil angewendet werden.
									<b>Fonganil</b> Wurzelfäule (Pythium, Phytophthora): Fonganil 0,02 % (5dl/ha) giessen, nach dem Pikieren. <b>Tipp:</b> Alternativ kann Previcur Energy gegossen werden.
									<b>Kendo</b> Trauermücken und -larven: 0,01 % spritzen. <b>Tipp:</b> Substratoberfläche gut benetzen. Anwendung in Abständen von 5 Tagen wiederholen bis keine Adulten mehr auffliegen. Dadurch wird Lebenszyklus unterbrochen.
									<b>Hicure</b> Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. <b>Tipp:</b> Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.
									<b>Wuxal Suspension Mg</b> Magnesium-Mangel (= Rote Flecken der Blätter): 0,2 % Spritzen. <b>Tipp:</b> Behandlungen mit Blattdünger bei vollständig bedecktem Himmel oder abends durchführen.
									<b>Wuxal Profi</b> Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen. <b>Tipp:</b> Giessen über die Pflanze wirkt als Blattdüngung, die die Wurzelbildung fördert die Nährstoffaufnahme erhöht. Dann bei vollständig bedecktem Himmel oder abends giessen.
									<b>Neem Maag</b> Blattfressende Raupen, Thripse: 0,6–0,8 % und 6–8 ml/10 m <sup>2</sup> (60–80 ml/10 l Wasser). Minierfliegen: 0,8–1,6 % bei 8–16 ml/10 m <sup>2</sup> (80–160 ml/10 l Wasser). <b>Tipp:</b> biologischer und teilsystemischer Wirkstoff.
									<b>Perfetto</b> Blattfressende Raupen, Thripse: 0,6–0,8 % und 6–8 ml/10 m <sup>2</sup> (60–80 ml/10 l Wasser). Minierfliegen: 0,8–1,6 % bei 8–16 ml/10 m <sup>2</sup> (80–160 ml/10 l Wasser). <b>Tipp:</b> biologischer und teilsystemischer Wirkstoff.
									<b>Kendo</b> Weisse Fliegen, Blattläuse, Minierfliegen, Thrips: 0,01 % (1 ml/10 l Wasser) spritzen. <b>Tipp:</b> Netzmittel oder Wuxal Profi verbessern die Wirkung. Nebenwirkung auf Blattwanzen.
									<b>Vertimec Gold</b> Blattläuse, Weisse Fliegen, Thrips, Spinnmilben und Minierfliegen: Vertimec 0,025 % + Kendo 0,01 % spritzen. <b>Tipp:</b> Mischung mit sehr breiter Wirkung.
									<b>Vertimec Gold</b> Weisse Fliegen, Spinnmilben, Thrips: 0,025 - 0,05 % spritzen. <b>Tipp:</b> Früh am Morgen oder am Abend behandeln.
									<b>Spomil</b> Spinnmilben: 0,1 % spritzen (Freiland). <b>Tipp:</b> Für Resistenzmanagement alternativ Vertimec Gold der Spritzbrühe zusetzen.
									<b>+ Etalfix Pro</b> <b>oder</b> <b>+ Wuxal Profi</b> Zusatz von Netzmittel oder netzenden Blattdüngern Wuxal: Etalfix Pro 0,02 % oder Wuxal Profi 0,2 % der Spritzbrühe zusetzen. <b>Tipp:</b> Bei Zusatz von Blattdünger Spritzung nur abends oder bei vollständig bedecktem Himmel. Blattdünger wirken vitalisierend auf die Blätter und fördern auch die Aktivität und Nährstoffaufnahme der Wurzeln.

Stecken	Wurzelbildung	Topfen	Wachstum	Stutzen	Wachstum	Blühbeginn	Verkauf	Pflanzbeete	Fuchsia-Hybriden (Fuchsien)		
1	2	4	5-6	7	8-14	ab 14	16-18	ab 16	Insektizide	Fungizide	
E.Jan.	E.Jan	E.Febr.	E.Febr.-A.März.	A.März	A.März-M.Mai	M.Mai	ab Mai	ab Mai	Herbizide	Netzmittel	
									Wachs. Reg	Dünger	
		Play								<b>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</b>	
		Alibi Flora								<b>Botrytis-Stängelfäule, Graufäule der Blätter:</b> Play 0,05 % (1 kg/ha) spritzen und Pflanzen gut besprühen. <b>Tipp:</b> Klimaführung für schnelles Abtrocknen nutzen. Resistenz-management: Mit Mapro alternieren.	
		Score Profi								<b>Blattflecken, Fuchsien-Rost, Echter Mehltau:</b> Alibi Flora 0,1 % + Legan 0,05 % spritzen. <b>Tipp:</b> Resistenzmanagement -> alternieren mit Tega.	
		Topas								<b>Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Rost:</b> 0,05 % spritzen <b>Tipp:</b> Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, Spezialist gegen Blattflecken, sehr verträglich, fleckt nicht.	
		Nimrod								<b>Echter Mehltau:</b> 0,025 % spritzen. <b>Tipp:</b> Resistenzmanagement.	
		Bonzi								<b>Echter Mehltau:</b> 0,1 % spritzen. <b>Tipp:</b> Blühende Pflanzen nur leicht betauen.	
										<b>Wachstumsregulierung:</b> 0,075-0,15 % spritzen. <b>Tipp:</b> Nach Durchwurzelung im Endtopf. Wiederholen. Damit bessere Verzweigung und mehr Seitentriebe. <b>Tipp:</b> Frühe Behandlungen (ca. 20. Februar) fördert die Blüte bis zum Muttertag.	