


	Saat	Keim-ung	Wachstum	Pikie-ren	Wachstum	Topfen	Wachstum	Blüh-beginn	Verkauf	
KW	1	2	3-4	5	6-7	8	9-10	11	12-14	<b>Petunia x atkinsiana / Calibrachoa sp. (Petunien / Surfinia)</b> 11-er-Topf für Verkauf A.Mai bis M.Mai. Insektizide    Fungizide    Herbizide    Netzmittel    Hemmstoff    Dünger
M	E.Feb.			E.März		A.Apr.	M.Apr.	E.Apr.	A.-M.Mai	
										<b>Vermehrungspilze, Wurzelpilze:</b> Previcur Energy 0,25 % giessen, sofort nach der Saat. <b>Tipp:</b> Nach Durchwurzelung wiederholt giessen.
										<b>Vermehrungspilze, Wurzelfäule:</b> Fonganil 0,02 % (5 l/ha) giessen, nach dem Pikieren. <b>Tipp:</b> Alternativ kann Previcur Energy gegossen werden.
										<b>Trauermücken und -larven:</b> 0,01 % spritzen. <b>Tipp:</b> Substratoberfläche gut benetzen. Anwendung alle 4-7 Tage wiederholen bis keine Adulten mehr auffliegen und Lebenszyklus unterbrochen ist.
										<b>Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern:</b> 0,25 % (25 ml/ 10 l Wasser) spritzen oder giessen. <b>Tipp:</b> Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.
										<b>Thrips, Spinnmilben, Minierfliegen, Weisse Fliegen:</b> 0,025%;0,05 % (thrips) spritzen. <b>Tipp:</b> In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (Gegen Weisse Fliegen nur im Gewächshaus) anwenden. Etalfix 0,02 % oder Blattdünger Wuxal Profi 0,2 % verbessert die Wirkung.
										<b>Thrips, Spinnmilben, Minierfliegen, Weisse Fliegen:</b> Vertimec Gold 0,05 % + Kendo 0,01 % spritzen. Vertimec ist während der Behandlung lichtempfindlich, daher sollte die Anwendung nicht bei bedecktem Himmel oder bei gezogenen Schattierungen erfolgen. <b>Tipp:</b> Mischung mit sehr breiter Wirkung.
										<b>Weisse Fliegen, Thrips, Blattläuse, Spinnmilben:</b> 0,3 % (30 ml/10 l Wasser). Nicht mit anderen Produkten mischen und nicht bei zu starker Sonneneinstrahlung spritzen. <b>Tipp:</b> Biologischer Wirkstoff. Nicht in die Blüte spritzen (Phytotox)
										<b>Eulendraupen und andere blattfressende Raupen</b> 0,6 - 0,8 % <b>Minierfliegen:</b> 0,8–1,6 % bei 8–16 ml/10 m <sup>2</sup> (80–160 ml/10 l Wasser). <b>Tipp:</b> biologischer und teilsystemischer Wirkstoff.
										<b>Spinnmilben:</b> 0,1 % spritzen (nur Freiland). <b>Tipp:</b> Alternativ für Resistenzmanagement kann auch Vertimec Gold eingesetzt werden.

	Saat	Keim-ung	Wachstum	Pikie-ren	Wachstum	Topfen	Wachstum	Blüh-beginn	Verkauf	
KW	1	2	3-4	5	6-7	8	9-10	11	12-14	<b>Petunia x atkinsiana / Calibrachoa sp. (Petunien / Surfinia)</b> 11-er-Topf für Verkauf A.Mai bis M.Mai.
M	E.Feb.			E.März		A.Apr.	M.Apr.	E.Apr.	A.-M.Mai	<span>Insektizide</span> <span>Fungizide</span> <span>Herbizide</span> <span>Netzmittel</span> <span>Hemmstoff</span> <span>Dünger</span>
					Kendo					Blattläuse, Weisse Fliegen: 0,01 % spritzen.
					Piretro Maag					Blattläuse, Spinnmilben, Thripse: 0,1 - 0,2 % spritzen. <b>Tipp:</b> Biologischer Wirkstoff mit Kontakt Wirkung, am besten Abends behandeln. Alternative zu Kendo.
					Wuxal Profi					Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen oder spritzen. <b>Tipp:</b> Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.
					Wuxal Suspension Mg					Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 0,3 - 0,5 % (30-50 ml/10 l Wasser spritzen). <b>Tipp:</b> 2-3 mal den Spritzungen begeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in die Blüten spritzen.
					Wuxal Suspension Mn					Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 0,3 - 0,5 % (30-50 ml/10 l Wasser spritzen). 2-3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.
						Alar				Wachstumsregulierung: 0,3 % spritzen. <b>Tipp:</b> 1. Anwendung sobald getopfte Jungpflanze angewachsen bzw. erste Wurzeln sichtbar sind und bei beginnendem Längenwachstum. Evtl. wiederholen. Auf wüchsige Pflanzen behandeln.
						Bonzi				Wachstumsregulierung: 0,1-0,25 % spritzen. <b>Tipp:</b> Auf wüchsige Pflanzen behandeln.
						Sequestrene Rapid				Eisenchlorose: Sequestrene Rapid 0,1 kg/m <sup>3</sup> der Pflanz Erde beimischen. <b>Tipp:</b> Oder Sequestrene Rapid 0,2 % + Wuxal Profi 0,2 % giessen. Sequestrene Rapid nicht über die Pflanze giessen.
						+ Wuxal Profi				
						Wuxal Eisen Plus				Eisenmangel, Verbesserung Blattfarbe: 0,2 % giessen. <b>Tipp:</b> Kann bei akutem Eisenmangel bis 0,5 % erhöht werden. Wird über Blätter und Wurzeln aufgenommen
						Play				Botrytis und Blütenbotrytis: Play 0,05 % (1 kg/ha) spritzen. <b>Tipp:</b> Ab Blüte Etalfix Pro 0,02 % (2 ml/10 l Wasser) zumischen damit es sicher keine Spritzflecken gibt.
						+ Etalfix Pro				
						Limax Power				Schnecken: 5 g/ 10 m <sup>2</sup> streuen. <b>Tipp:</b> Vorbeugend bei kleiner Pflanze streuen, damit die Schneckenkörner nicht auf den Blättern liegen bleiben.
								Score Profi		Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Rost: 0,05 % spritzen <b>Tipp:</b> Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, Spezialist gegen Blattflecken, sehr verträglich, fleckt nicht.

	Saat	Keim-ung	Wachstum	Pikie-ren	Wachstum	Topfen	Wachstum	Blüh- beginn	Verkauf	
	1	2	3-4	5	6-7	8	9-10	11	12-14	<b>Petunia x atkinsiana / Calibrachoa sp. (Petunien / Surfinia)</b> 11-er-Topf für Verkauf A.Mai bis M.Mai.
KW										Insektizide   Fungizide   Herbizide   Netzmittel   Hemmstoff   Dünger
M	E.Feb.			E.März		A.Apr.	M.Apr.	E.Apr.	A.-M.Mai	<b>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</b>
								Nimrod		<b>Echter Mehltau:</b> Nimrod 0,1 % spritzen. <b>Tipp:</b> Resistenzmanagement: Im Wechsel mit Topas ab 12 °C einsetzen.
								Alibi Flora		<b>Blattfleckenpilze, Rost:</b> Alibi Flora 0,1 % spritzen. <b>Tipp:</b> Produkt, aus einer Kombination von Wirkstoffen und Wirkungsweisen, die ein sehr breites Spektrum von Krankheiten abdecken. Vorbeugende und stoppende Wirkung. Alibi Flora ab 12 °C einsetzen und mit Hicure 0,25 % mischen (Abwehrsystem der Pflanze wird verbessert).
								Topas		<b>Echter Mehltau:</b> 0,0125-0,025 % spritzen. <b>Tipp:</b> Fördert das Blattgrün. Topas ab 12 °C einsetzen.