

	Saat	Vorauf-lauf	Keim-blatt-stadium	2-Blatt-stadium	4-Blatt-stadium	6-Blatt-stadium	8-Blatt-stadium	Bildung Blüte	Blüten-blätter Öffnung	Blüten-blätter geöffnet	Beginn Blüte	Volle Blüte	
													<h3>Helianthus annuus (Schnitt-Sonnenblumen)</h3> <p>Saat im Freiland ab A.April-M.Juli in mehreren Sätzen für Blüte von E.Juni-Oktober</p>
Monat KW													
> 7-8 °C													
													<p>Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger</p> <p>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</p>
													<p>Stomp Aqua</p> <p>Einjährige Unkräuter und Ungräser: 2,6-3,5 l/ha unmittelbar nach der Saat spritzen. Auf schwereren Böden höhere Dosierung anwenden. Tipp: Keine Anwendung auf Sandböden.</p>
													<p>Limax Power</p> <p>Schnecken: 5 - 7 g/10 m² (5 - 7 kg/ha) je nach Auftreten der Schnecken.</p>
													<p>Fonganil</p> <p>Bodenpilze, Vermehrungspilze, Falscher Mehltau: 0,02 % (5 l/ha) giessen (nur Gewächshaus). Tipp: Vorbeugend einsetzen wenn Gefahr für Infektion besteht.</p>
													<p>Previcur Energy</p> <p>Bodenpilze, Vermehrungspilze, Falscher Mehltau: 0,25 % giessen. Tipp: Vorbeugend einsetzen wenn Gefahr für Infektion besteht.</p>
													<p>Fusilade Max</p> <p>Gräser-Korrektur: 1-1,5 l/ha spritzen. Tipp: Ab 2-Blatt- bis 4-Blatt-Stadium zur Gräser-Korrektur. Je nach Art der Gräser bis 3 l/ha (Queckenunterdrückung).</p>
													<p>Wuxal Suspension Mg</p> <p>Gegen Blattchlorosen durch Magnesium-Mangel: 0,3-0,5 % Spritzen. Tipp: Kräftig und gesunde dunkelgrüne Blätter.</p>
													<p>Wuxal Eisen Plus</p> <p>Eisenmangel, Verbesserung Blattfarbe: 0,2 % giessen. Tipp: Kann bei akutem Eisenmangel bis 0,5 % erhöht werden. Wird über Blätter und Wurzeln aufgenommen</p>
													<p>Hicure</p> <p>Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % (25 ml in 10 l Wasser) spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelenwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.</p>
													<p>BIO</p> <p>Piretro Maag</p> <p>Blattläuse, Thrips, Spinnmilben: 0,1 - 0,2 % spritzen. Tipp: Biologisches Produkt mit Kontakt Wirkung. Am besten am Abend behandeln.</p>
													<p>Vertimec Gold</p> <p>Thrips, Spinnmilben, Blattläuse, Weisse Fliegen: Vertimec Gold 0,025, thrips 0,05 %, Weisse Fliegen nur im Gewächshaus.</p>
													<p>Etafix Pro</p> <p>Tipp: Zusatz von Netzmittel Etafix Pro fördert die Verteilung und das Eindringen in die Pflanze.</p>
													<p>Vertimec Gold</p> <p>Thrips, Spinnmilben, Blattläuse, Weisse Fliegen: Vertimec 0,025-0,05 % + Kendo 0,01 % spritzen.</p>
													<p>+ Kendo</p> <p>Tipp: Sehr gute Wirkung bereits ab 5-23 °C.</p>
													<p>Spomil</p> <p>Spinnmilben: 0,1 % spritzen (Nur Freiland). Tipp: Alternieren mit Vertimec Gold, spät abends spritzen.</p>

	Saat	Vorauf-lauf	Keim-blatt-stadium	2-Blatt-stadium	4-Blatt-stadium	6-Blatt-stadium	8-Blatt-stadium	Bildung Blüte	Blüten-blätter Öffnung	Blüten-blätter geöffnet	Beginn Blüte	Volle Blüte	
													Helianthus annuus (Schnitt-Sonnenblumen) Saat im Freiland ab A.April-M.Juli in mehreren Sätzen für Blüte von E.Juni-Oktober
Monat KW													
> 7-8 °C													
													Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger
													Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp
													Fonganil + Legan Falscher Mehltau, Blattfleckenpilze allgemein: Fonganil 0,02 % (Nur Gewächshaus) + Legan 0,05% spritzen. Tipp: Zusätzlich kann Wuxal Profi zugemischt werden. Im Fall von starkem Infektionsdruck durch Falschen Mehltau Spritzfolge mit weiteren Produkten z.B. Previcur Energy ergänzen.
													Previcur Energy Bodenpilze, Vermehrungspilze, Falscher Mehltau: 0.25 % spritzen, Nach 10 Tagen wiederholen. Tipp: Vorbeugend einsetzen wenn Gefahr für Infektion besteht.
													Nimrod Echter Mehltau: 0,1 % spritzen. Tipp: Alle 10-14 Tage wiederholen. Alternieren mit Topas 0,025 %
													Alibi Flora + Hicure Blattfleckenpilze, Phomopsis: Alibi Flora 0,1 % + Hicure 0,25 % spritzen. Tipp: Alternative Score Profi 0,05 % + Etalfix Pro 0,02 %.
													Play Botrytis: 0,05 % (1 kg/ha) spritzen.
													Wuxal Profi Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmittleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % spritzen. Tipp: Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.