

	Saat	Keim- ung	Keim- bis 4- Blatt	Topfen	W a c h s t u m				Blühbeginn	Frühjahrs- Verkauf		Viola wittrockiana, Topfkultur für Frühjahrsverkauf								
☞	1	2	3+4	5	Kulturwoche 6-26				27-32	33-36		Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger			
☞	M.Aug.			E.Sept	Okt.	Nov.	Dez.	Januar	A.Feb.	Feb.	Feb.	A.März	M.März	E.März	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp					
					Previcur Energy										Vermehrungspilze, Wurzelhalsfäulen: Previcur Energy 0,25 % giessen, nach dem Pikieren. Tipp: Previcur Energy hat eine pflanzenstärkende Wirkung und präventiv angewendet einen Nebeneffekt auf Bakteriosen. Previcur Energy nicht auf Blüte. Achtung Phytotox bei gewissen Sorten (Verträglichkeit testen)					
					Fonganil								Fonganil		Falscher Mehltau und Bodenpilze (Phytophthora, Phytium): 0,02 % spritzen oder giessen. Tipp: Erste Behandlung nach dem Topfen oder Behandlung unmittelbar nach Pflanzung; zweite Behandlung 3 Wochen später. Auf feuchten Ballen giessen, damit der Wirkstoff tief eindringen kann.					
					Score Profi + Legan										Ramularia-Blattflecken, Echter Mehltau: Score Profi 0,05 % + Legan 0,05 % spritzen, nach dem Pikieren. Tipp: Alternative: Alibi Flora 0,1 % + Hicure 0,25 %.					
					Alibi Flora										Blattfleckenpilze, Ramularia, Echter Mehltau: Alibi Flora 0,1 % + Hicure 0,25 % spritzen Tipp: Hicure stärkt den Abwehrsystem der Pflanze.					
					Sequestrene Rapid										Eisenmangel, Verbesserung Blattfarbe: 0,2 % giessen. Tipp: Beim Giessen die Blätter nicht treffen. Benetzte Blätter abwaschen um Verbrennungen zu vermeiden.					
					Wuxal Eisen Plus										Eisenmangel, Verbesserung Blattfarbe: 0,2 % giessen, dabei Blätter gut benetzen. Tipp: Kann bei akutem Eisenmangel bis 0,5 % erhöht werden. Wird über Blätter und Wurzeln aufgenommen.					
					Wuxal Suspension Mg										Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in die Blüten.					
					Wuxal Suspension Mn										Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.					
			BIO		Neem Maag										Weisse Fliegen, Thrips, Blattläuse, Spinnmilben: 0,3 % (30 ml/10 l Wasser). Nicht mit anderen Produkten mischen und nicht bei zu starker Sonneneinstrahlung spritzen. Tipp: Biologischer Wirkstoff. Nicht in die Blüte spritzen (Phytotox)					
			BIO		Piretro Maag										Spinnmilben, Blattläuse, Thrips: Piretro Maag 0,1 - 0,2 %. Tipp: Biologisches Produkt mit Kontakt Wirkung. Am besten am Abend behandeln.					
					oder															
					Vertimec Gold										Spinnmilben, Thrips: Vertimec Gold 0,025 %; Thrips 0,05 % spritzen. Tipp: Temperaturen für 12 h bei mindestens 12 °C halten					

	Saat	Keim- ung	Keim- bis 4- Blatt	Topfen	W a c h s t u m	Blühbeginn	Frühjahrs- Verkauf	Viola wittrockiana, Topfkultur für Frühjahrsverkauf
☞	1	2	3+4	5	Kulturwoche 6-26	27-32	33-36	Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger
☞	M.Aug.			E.Sept	Okt. Nov. Dez. Januar A.Feb. Feb.	Feb. A.März M.März E.März		Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp
					Hicure			Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % (25 ml in 10 l Wasser) spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.
					Wuxal Profi			Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0.2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.
					Alar			Wachstumsregulierung: 0,1-0,5 % ein- oder mehrmals je nach Sorte und Wuchskraft. Tipp: Mit Behandlungen sofort nach dem Anwachsen und bei beginnendem Längenwachstum starten. Bei wüchsigem Wetter wiederholen. Hemmstoffeinsatz erhöht die Frostresistenz.
					Bonzi			Wachstumsregulierung: 0,05-0,25 % spritzen, je nach Sorte und Wuchskraft. Tipp: Nur Gefässkulturen, für lang anhaltende Wirkung.
					 Cuprofix Fluid			Bakterien: Cuprofix Fluid 0,25 % spritzen. Tipp: Wirkung auch gegen Blattfleckenkrankheiten.
					 Cuprofix 35			Bakterien: Cuprofix 35 0,15 % spritzen. Tipp: Zusatz von Netzmittel Etalix Pro oder Wuxal Profi Flüssigdünger vermindert Flecken auf den Blättern.
					Play			Blütenbotrytis: Play 0,05 % (1 kg/ha) spritzen, in Kulturen für Herbstverkauf oder nach dem Auswintern. Tipp: Play ist mit Kendo mischbar.
					Kendo			Blattläuse, Raupen, Thrips: 0,01 % spritzen. Tipp: Sehr gute Wirkung bereits ab 5 °C. Mit Play gegen Blütenbotrytis kombinieren.
							Stomp Aqua	Einjährige Gräser und Unkräuter, ohne Franzosen- und Kreuzkraut: 25 ml/Are (2,5 l/ha) spritzen, vor dem Pflanzen. Tipp: Nur für Pflanzung von Topf- und Ballenpflanzen geeignet.