

	Topfen	Wachstum	Künstl. Kurztage + Wachstum	Beginn Färbung Brakteen	Wachstum	Verkauf	<b>Euphorbia pulcherrima, Topfkultur</b> gestutzte Pfl. im 11-cm-Topf, gesteuerte Kultur für Verkauf KW45-47
KW	1	2-3	4-9	10	11-12	ab 13	<b>Insektizide</b> <b>Fungizide</b> <b>Herbizide</b> <b>Netzmittel</b> <b>Hemmstoff</b> <b>Dünger</b>
Σ	M. Aug.	M. Aug.-E. Aug.	A. Sept.-A. Okt.	M. Okt.	M.-E. Okt.	A. Nov.	<b>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</b>
	<b>Previcur Energy</b>						<b>Vermehrungspilze, Wurzelhalsfäulen:</b> Previcur Energy 0,25 % nach dem Stecken oder Topfen giessen. <b>Tipp:</b> Previcur Energy hat eine pflanzenstärkende Wirkung.
	<b>Fonganil</b>						<b>Wurzelkrankheiten:</b> Fonganil 0,02 % sofort nach dem Eintopfen giessen.
	<b>Bonzi</b>						<b>Wachstumsregulierung:</b> 0,1-0,25 % spritzen für feste, farbintensive Brakteen bis spätestens Oktober. <b>Tipp:</b> Zur Zeit der Brakteenausbildung Dosierung auf maximal 0,1 % reduzieren und sauberes Regen-Wasser verwenden.
	<b>Hicure</b>						<b>Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern:</b> 0,25 % spritzen oder giessen. <b>Tipp:</b> Eine Applikation mit Hicure 0,25% direkt nach dem Eintopfen fördert die Bewurzelung der Pflanze. Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.
	<b>Wuxal Profi</b>						<b>Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen:</b> 0,2 % giessen oder spritzen. <b>Tipp:</b> Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.
	<b>Vertimec Gold</b> <b>+ Kendo</b>						<b>Thrips, Spinnmilben, Minierfliegen:</b> Vertimec Gold 0,025-0,05 % + <b>Weisse Fliegen, Blattläuse:</b> Kendo 0,01 % spritzen. <b>Tipp:</b> Kultur sorgfältig auf Befall kontrollieren. Blätter vollständig benetzen. Evtl. Netzmittel Etalfix Pro 0,02 % zusetzen zur besseren Verteilung auf der Pflanzenoberfläche.
	<b>Play</b>						<b>Blütenbotrytis:</b> Play 0,05 % (1 kg/ha) spritzen. <b>Tipp:</b> Bei Befallsdruck ist eine vorbeugende und kurative Bekämpfung mit Play möglich.
<b>BIO</b>	<b>Neem Maag</b>						<b>Weisse Fliegen, Thrips, Blattläuse, Spinnmilben:</b> 0,3 % (30 ml/10 l Wasser). Nicht mit anderen Produkten mischen und nicht bei zu starker Sonneneinstrahlung spritzen. <b>Tipp:</b> Biologischer Wirkstoff. Nicht in die Blüte spritzen (Phytotox)
	<b>Kendo</b>						<b>Trauermückenlarven:</b> 0,01 % spritzen. <b>Tipp:</b> Topf- / Erdoberfläche gut mit Spritzbrühe anfeuchten und so lange wiederholen bis keine Trauermücken mehr vorhanden sind.
	<b>Vertimec Gold</b>						<b>Thrips, Spinnmilben, Weisse Fliegen:</b> Vertimec 0,025-0,05 % spritzen. <b>Tipp:</b> Kultur sorgfältig auf Befall kontrollieren. Blätter vollständig benetzen. Evtl. Netzmittel Etalfix Pro 0,02 % zusetzen zur besseren Verteilung auf der Pflanzenoberfläche.
<b>BIO</b>	<b>Perfetto</b>						<b>Thrips:</b> Perfetto 0,6-0,8 %. <b>Tipp:</b> Biologisches Produkt mit translaminare Wirkung.
	<b>Alibi Flora</b>						<b>Mehltau, Septoria und Phyllosticta:</b> Alibi Flora 0,01 %. <b>Tipp:</b> Mit feiner Düse nur leicht besprühen. Verträglichkeitstests durchführen. Alibi Flora der abstoppende Spezialist gegen Blattflecken.

	Topfen	Wachstum	Künstl. Kurztag + Wachstum	Beginn Färbung Brakteen	Wachstum	Verkauf	<b>Euphorbia pulcherrima, Topfkultur</b> gestutzte Pfl. im 11-cm-Topf, gesteuerte Kultur für Verkauf KW45-47								
KW	1	2-3	4-9	10	11-12	ab 13	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger			
Σ	M. Aug.	M. Aug.-E. Aug.	A. Sept.-A. Okt.	M. Okt.	M.-E. Okt.	A. Nov.	<b>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</b>								
							<b>Wuxal Suspension Ca</b>						Blattdünger gegen Ca-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. <b>Tipp:</b> 2–3 mal den Spritzungen begeben. 2 Anwendungen kurz vor und zu Beginn der Brakteenbildung fördern die Entwicklung und verhindern "Geisterflecken". (Nicht auf die Brakteen/Blüten spritzen.)		
							<b>Wuxal Suspension Mg</b>						Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. <b>Tipp:</b> 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert das Blattgrün. Nicht auf die Brakteen/Blüten.		
							<b>Wuxal Suspension Mn</b>						Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. <b>Tipp:</b> Nicht auf die Brakteen/Blüten spritzen.		