

| Produkt | Wirkungsweise   |                | Unkräuter/<br>Ungräser | Dauer in<br>Monate<br>(optimale<br>Temperatur) | Bemerkungen |
|---------|-----------------|----------------|------------------------|--|-------------|
|         | Formulierung *1 | HRAC-Gruppe *2 |                        |  |             |

## Blattherbizide

|   |    |      |   |   |            |   |
|---|----|------|---|---|------------|---|
| <b>Touchdown System 4/<br/>Roundup UltraPro</b> | SL | G    | Totalherbizid, systemisch.<br>Nachauflauf | Ein- und mehrjährige,<br>Unkräuter und Ungräser<br>Quecken, Winden usw. | (12–30 °C) | Bei der Applikation Abdrift auf Nachbar-<br>kulturen verhindern. Unter optimalen Bedin-<br>gungen nach 3 Tagen Folgekultur möglich. |
| <b>Hirso Maxx</b>                               | EW | A, B | Nachauflauf                               | Hirsens   | (8–30 °C)  | Anwendung bei wüchsigem Wetter. Pflanzen<br>mit Wassermangel nicht behandeln.   |

## Bodenherbizide

|                   |    |    |                       |                                      |                  |   |
|-------------------|----|----|-----------------------|--------------------------------------|------------------|---|
| <b>GraminEx</b>   | SC | K1 | Nachauflauf           | Einj. Unkräuter und Ungräser         | (< 10 °C)        | Auf genügend Bodenfeuchte achten.   |
| <b>Stomp Aqua</b> | SC | K1 | Vorauflauf            | Einjährige Unkräuter und<br>Ungräser | 2–3<br>(5–30 °C) | Vor dem Auflaufen der Unkräuter oder vor<br>dem Pflanzen von Gruppenpflanzen. |
| <b>Surflan</b>    | SC | K1 | Feuchtigkeitsabhängig | Einjähr. Unkräuter u. Ungräser       | 3–5<br>(5–30 °C) | Vorauflauf, auf unkrautfreien Boden.  |

## Gräserherbizide

|                     |    |   |                                |   |           |   |
|---------------------|----|---|--------------------------------|---|-----------|---|
| <b>Fusilade Max</b> | EC | A | Gräserherbizid,<br>Nachauflauf | Ein- und mehrjährige,<br>Ungräser, Hirsens, Quecken | (8–30 °C) | Während der Vegetationszeit.<br>über Gehölze und Stauden möglich. |
|---------------------|----|---|--------------------------------|---|-----------|---|

## Wachstoffs-Herbizide

|                          |    |        |   |  |            |  |
|--------------------------|----|--------|---|--|------------|--|
| <b>Banvel Quattro</b>    | SL | alle O | Blattherbizid und Boden-<br>herbizid, Nachauflauf | Breitblättrige ein- und<br>mehrjährige Unkräuter | (12–30 °C) | In Rasen und Sportanlagen.                                   |
| <b>Divopan</b>           | SL | O      | Blattherbizid, Nachauflauf                        | Breitblättrige ein- und<br>mehrjährige Unkräuter | (12–30 °C) | Für Wiesen und Weiden.                                       |
| <b>Duplosan KV-Combi</b> | SL | O, O   | Blattherbizid, Nachauflauf                        | Breitblättrige ein- und<br>mehrjährige Unkräuter | (12–30 °C) | Auf Rasen. Während der starken<br>Wachstumsphasen behandeln. |
| <b>Garlon 120</b>        | SL | O      | Blattherbizid, Nachauflauf                        | Brennnesseln, Gehölze,<br>Brombeeren, Sträucher  | (12–30 °C) | Auch gegen Stockausschläge.                                  |
| <b>MossKade</b>          | SC | –      | physikalisch, Nachauflauf                         | Algen, Flechten, Moose,<br>Lebermose             | ab 5 °C    | Beton, Holz, Stein, Töpfe, Container<br>und Rasen.           |
| <b>Lontrel 100</b>       | SL | O      | Blattherbizid, Nachauflauf                        | Breitblätt. mehrjähr. Unkräuter                  | (12–30 °C) | Ackerkratzdisteln.   |
| <b>Pixie</b>             | SC | O, P   | Residual-, Blattherbizid,<br>Nachauflauf          | Breitblättrige ein- und<br>mehrjährige Unkräuter | (12–30 °C) | Auf wüchsigen Rasen.   |

## Mischungen

|   |          |              |   |  |                   |   |
|---|----------|--------------|---|--|-------------------|---|
| <b>Touchdown System 4<br/>+ Surflan</b>           | SL<br>SC | G<br>K1      | Blatt- und Bodenherbizid,<br>Dauerwirkung | Einjährige und ausdauernde<br>Unkräuter, Behandlung im<br>Baumstreifen | 3–5<br>(12–30 °C) | Keine Kulturpflanzen mit der Spritzbrühe<br>berühren.                                     |
| <b>Touchdown System 4<br/>+ Duplosan KV-Combi</b> | SL<br>SL | G<br>O, O    | Blattherbizide                            | Problemunkräuter   | (12–30 °C)        | Auf volle Blattmasse während der Vegeta-<br>tion. Abdrift auf Kulturpflanzen vermeiden.   |
| <b>Pixie<br/>+ Duplosan KV-Combi</b>              | SC<br>SL | O, P<br>O, O | Komplettlösung für den<br>Rasen           | Einjährige und ausdauernde<br>Unkräuter                                | (12–30 °C)        | Ideale Anwendungszeit: Sept. bis Okt. und<br>April. Mindest-Temperatur in der Nacht 5 °C. |

\*1 Formulierung: CS = Kapselsuspension, EW = Emulsion Öl in Wasser, EC = Emulsionskonzentrat, SC = Suspensionskonzentrat, SL = Wasserlösliches Konzentrat.

\*2 Wirkstoffgruppen: A = ACCase-Hemmer, B = ALS-Hemmer, G = EPSP-Synthese-Hemmer,  
K1 = Mikrotubulus-Aufbau-Hemmer, O = synthetische Auxine, P = Auxin-Transport-Hemmer.