

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung*	Bemerkungen
Aprikosen				
	Schädlinge	Genol Plant	2 %	Austriebsspritzung.
	Pilzkrankheiten	+ Cuprofix Fluid	0,4 %	Oder Cuprofix 35 0,43 %.
	Monilia	Play	0,06 %	
	Echter Mehltau, Monilia, Schrotschuss	Score Profi	0,02 %	
		Captan 80 WDG	0,1 %	
	Echter Mehltau, Schrotschuss	Tega	0,025 %	
	Frostspanner	Perfetto	0,4 %	
	Blattläuse	Pirimor	0,04 %	
	Pfirsichwickler	Affirm Profi	0,2 %	Ab Ende Mai + 2. Gen. Ende Juli.
Kirschen				
	Schädlinge	Genol Plant	2 %	Austriebsspritzung.
	Pilzkrankheiten	+ Cuprofix Fluid	0,4 %	Oder Cuprofix 35 0,43 %.
	Monilia, Bitterfäule, Schrotschuss	Tega	0,025 %	
	Schrotschuss, Monilia, Sprühflecken	Score Profi	0,02 %	
	Bitterfäule, Schrotschuss, Sprühfleckenkrankheit	+ Delan WG	0,03 %	Oder Captan 80 WDG 0,1 %.
	Frostspanner, Schalenwickler	Perfetto	0,4 %	Spritzen im Stadium Vor- oder Nachblüte.
	Kirschenfliege	Oryx Pro	0,02 %	Beim Farbumschlag.
Pfirsiche				
	Schädlinge	Genol Plant	2 %	Austriebsspritzung.
	Pilzkrankheiten	+ Cuprofix Fluid	0,4 %	Oder Cuprofix 35 0,43 %.
	Kräuselkrankheit	Score Profi	0,03 %	Ab Austrieb im Februar 2 x, wenn Temperatur über 10 °C geht.
	Echter Mehltau, Schrotschuss	Tega	0,025 %	Ab Austrieb.
	Apfelwickler, Pfirsichwickler, Pfirsichmotte	Affirm Profi	0,2 %	Bei Beginn des Raupenschlupfes.
	Spinnmilben	Spomil	0,1 %	
Pflaumen und Zwetschgen				
	Schädlinge	Genol Plant	2 %	Austriebsspritzung.
	Narrenzwetschgen, überwinternde Pilzkrankheiten	+ Cuprofix Fluid	0,4 %	Im Februar, beim Knospenschwellen. Oder Cuprofix 35 0,43 %.
	Monilia	Play	0,06 %	Zweite Applikation 3 Wochen vor Ernte.
	Monilia, Schrotschuss, Rost	Score Profi	0,02 %	2–3 mal ab Blüte
	Narrenkrankheit, Rost	+ Delan WG	0,03 %	Oder Captan 80 WDG 0,1 %.
	Spinnmilben, Rostmilben	Spomil	0,1 %	
	Frostspanner, Schalenwickler	Perfetto	0,4 %	Spritzen vor oder nach der Blüte.
	Pflaumenwickler	Affirm Profi	0,2 %	Anfang Juli und Ende Juli.
Quitten				
	Monilia, Echter Mehltau	Score Profi	0,015 %	
	Schorf	+ Delan WG	0,03 %	Oder Captan 80 WDG 0,1 %.
	Blattbräune/Lagerkrankheiten	Tega	0,01 %	Max. 4 mal. Ab Juni behandeln.
		+ Captan 80 WDG	0,1 %	
	Echter Mehltau	Topas	0,006 %	

* Genaue Konzentration siehe Gebrauchsanleitung auf der Packung.

OBSTKULTUREN

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung*	Bemerkungen
Spalierreben				
	Kräusel- und Pockenmilben	Genol Plant	2 %	Austriebsspritzungen oder Thiovit Jet 2 %.
	Eisenchlorose	Sequestrene Rapid	0,6–1,2 kg/ha	Vor der ersten Bodenbearbeitung streuen und einarbeiten.
	Echter Mehltau	Topas	0,0125 %	Oder Score Profi 0,0125 %.
		Vivando	0,02 %	Bei 0,16–0,32 l/ha im Wechsel mit Topas .
	Falscher Mehltau	Cuprofix Fluid	0,4 %	Bis spätestens Ende August. Oder nach der Blüte bis spätestens Mitte August Amaline Flow 0,175 %
	Botrytis (Graufäule)	Play	0,1 %	Beim Schliessen der Trauben.
	Stiellähme	Wuxal Suspension Mg	5 l/ha	1. Behandlung beim Weichwerden; 2. Behandlung 14 Tage später.
	Erdräupen, Rombenspanner, Springwurm, Traubenwickler 1. + 2. Generation	Perfetto	0,3 %	

Walnuss (Juglans)				
	Gallmilben	Genol Plant	2 %	Austriebsspritzung.
	Apfelwickler	Perfetto	0,4 %	Vor oder nach der Blüte.

SPRITZPLAN OBSTKULTUREN

Kultur	Problem	Produkt	Dosierung*	Bemerkungen
Äpfel und Birnen				
Stadium C/53 (Knospen-Aufbruch) Winterspritzung	Verschiedene Schädlinge	Genol Plant	2 %	Austriebsspritzung.
	Schorf	+ Cuprofix Fluid	0,25 %	Oder Cuprofix 35 0,43 %.
	Apfelblütenstecher	Perfetto	0,4 %	Behandlung bei Knospenaufbruch.
Stadium D/56 (Grünknospen-Stadium)	Schorf	Score Profi	0,015 %	
	Schorf	+ Delan WG	0,03 %	Oder Captan 80 WDG 0,1 %.
	Frostspanner	+ Perfetto	0,4 %	Im Stadium Vor- oder Nachblüte.
Stadium E/59 (Ballon-Stadium)	Schorf, Mehltau, Monilia	Score Profi	0,015 %	
	Schorf	+ Delan WG	0,03 %	Oder Captan 80 WDG 0,1 %.
	Förderung des Fruchtansatzes	Wuxal Profi	0,2 %	
Stadium G/67 (Abgehende Blüte)	Schorf, Rost	Tega	0,01 %	
	Schorf	+ Captan 80 WDG	0,1 %	
Stadium I (Frucht Haselnussgrösse)	Schorf, Mehltau, Rost	Score Profi	0,015 %	
	Schorf	+ Delan WG	0,03 %	Oder Captan 80 WDG 0,1 %.
	Blattläuse	+ Pirimor	0,04 %	Oder Piretro Maag 0,1 % (1,6 l/ha).
	Spinnmilben	+ Spomil	0,1 %	
	Fruchtwanzen	Perfetto	0,4 %	Vor- oder nach der Blüte.
	Birnblattsauger	Vertimec Gold	0,075 %	Nur Birnen oder Kendo 0,015 %
Mai bis Juni	Feuerbrand	Bion	0,002–0,004 %	Anwendung von Blüte bis zum Triebschluss.
Stadium K/75 (Fruchtgrösse ca. 50 %. Ende Mai bis Anfang Juni)	Pilzkrankheiten	Score Profi	0,015 %	
		+ Delan WG	0,03 %	Oder Captan 80 WDG 0,1 %.
	Apfelwickler, Birnblattsauger, Kleiner Fruchtwickler, Schalenwickler, Frostspanner	+ Affirm Profi	0,2 %	Oder Perfetto 0,4 % ohne Birnblattsauger.
	Blattdüngung	+ Wuxal Profi	0,2 %	
	Gegen Stippe	Wuxal Suspension Ca	0,4–0,6 %	Mindestens 3 Spritzungen nach Blüte. Bis August möglich.