

Erbicida di postemergenza contro tutte le principali malerbe a foglia larga del tappeto erboso

- Effetto rapido e sicuro su tutte le principali malerbe
- Traslocazione sistemica in tutta la pianta infestante, fino alle radici
- Per irrorazione o annaffiatura durante tutto il periodo vegetativo

Principio attivo 29,1 % MCPA (340 g/l), 2,56 % Dicamba, (30 g/l)

Formulazione SL Concentrato solubile in acqua

Effetto Erpax Duo contiene due materie attive che appartengono al meccanismo d'azione del gruppo O. I principi attivi vengono assorbiti prevalentemente attraverso le foglie e solo in minima parte attraverso le radici delle infestanti. In seguito si distribuiscono in tutta la pianta e sviluppano il loro effetto sistemico. Questa speciale caratteristica permette di utilizzare il prodotto non solo contro malerbe dicotiledoni facili da combattere ma anche con quelle più tenaci. L'effetto si manifesta con l'arresto della crescita, una spiccata ramificazione e il deperimento delle malerbe. Un clima caldo e favorevole alla crescita accelera il processo di deperimento delle malerbe. Prima che l'erbicida faccia effetto, le piante devono avere più giorni di crescita attiva. Il preparato è molto ben tollerato dal manto erboso. Prima che l'erbicida faccia effetto, le piante devono avere più giorni di crescita attiva. Il preparato è molto ben tollerato dal manto erboso.

Modo d'uso **Tappeti erbosi e campi sportivi:** irrorare con 4 l/ha (40 ml in 10 l di acqua ogni 100 m²) o irrigare con 40 ml in 100 l di acqua ogni 100 m² mediante il terminale a barra per annaffiatoio (rompigetto) contro le dicotiledoni (malerbe). Azione parziale: Bugola, Ellera terrestre comune, Varietà annuali di veronica, Veronica a foglie di serpillio e Veronica comune.
Il trattamento con Erpax Duo andrebbe effettuato 3–4 giorni dopo lo sfalcio in condizioni di crescita del tappeto erboso con una temperatura superiore a 8 °C. Dopo il trattamento non dovrebbe piovere per almeno 2 ore. Lo sfalcio successivo va effettuato dopo 4 giorni. Non applicare con pieno sole, temperature elevate o dopo lunghi periodi di pioggia. Non utilizzare l'anno della semina. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.

Prati e pascoli: contro le specie di romice. Applicazione: Trattamento pianta per pianta con vaporizzatore a zaino con una concentrazione di 0,5–1 % oppure lotta pianta per pianta con un apparecchio umettante ed una concentrazione di 10–30 %. Termine d'attesa: 3 settimane. Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane.

Erpax[®] Duo

Attenzione	<p>Protezione per l'utilizzatore: durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.</p> <p>Inoltre per tappeti erbosi e terreni sportivi: Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.</p> <p>Usare cautela nelle vicinanze di piante ornamentali e colture a foglia larga (piante non target), che non devono entrare in contatto con il prodotto. Nessun utilizzo se sussiste il pericolo di dispersione su piante adiacenti. Le piante adiacenti non devono essere colpite né direttamente, né indirettamente dall'erbicida, altrimenti non si escludono danni.</p> <p>Dopo l'uso pulire a fondo gli spruzzatori (filtro e tubi flessibili inclusi) con l'aggiunta di carbonato di sodio o di un detergente sgrassante e sciacquare con abbondante acqua. L'impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato.</p>
Preparazione della soluzione	Riempire il contenitore per metà con acqua, aggiungere la quantità necessaria di prodotto e rabboccare con l'agitatore in funzione.
Miscela	Erpax Duo è miscibile con i prodotti specificati nella Guida Maag Profi.
Spettro d'azione	<p>Efficacia da buona a ottima: senape selvatica, amaranthus, mercorella, specie di romice, galinsoga, sonchus, chenopodium, ranuncolo, ravenello selvatico, erba storna, borsa pastore, cardo, specie die persicaria, senecione, atriplice, nontiscordardimé, centocchio, piantaggine, veccia, vilucchio (Convolvulaceae), trifoglio bianco.</p> <p>Azione parziale: Bugola, Ellera terrestre comune, varietà annuali di veronica, veronica a foglie di serpillio e veronica comune.</p> <p>Efficacia insufficiente: graminacee e muschi.</p>
Caratteristiche	Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.
Confezione	3 l, 4x 3 l
Marchio	® = Marchio registrato di una società del gruppo Syngenta
Versione	69789/1220