

SPRITZPLAN RASENPFLEGE

	Problem	Produkt	Dosierung % oder je Are	Bemerkungen
Neuanlagen				
Bei Auftreten	Werren, Erdraupen, Erdschnakenlarven	Cortilan	500 g	Je Are auf feuchten Boden streuen.
Ab dem 1. Schnitt Frühjahr bis Herbst	Rasenzpilze, Pathogene Bodenpilze, Rost	Headway + Daconil Weather Stik	22,5 ml 0,3 %	10 l Brühe oder 5 g Heritage je Are.
	Dry Patch, Verbesserung Wiederbenetzung und Wasserhaltevermögen	Qualibra	200 ml	Erste Behandlungen ab März/April. Beste Ergebnisse mit Behandlung im Abstand von 4–6 Wochen. 2–3 mm nachberegnen.
Ab dem 3. Schnitt	Breitblättrige Unkräuter	Duplosan KV-Combi	40 ml	10 l Brühe je Are.
Oktober bis Dezember	Schneeschnitzel	Headway	22,5 ml	Behandlung im Oktober
	Anthraxnose, Brown Patch, Schneeschnitzel, Leaf spot	Medallion TL	30 ml	In 125–500 l Wasser.
	Rasenzpilze, Krankheiten, Schneeschnitzel	oder Play	15 g	1. Behandlung im Oktober. 2. Behandlung vor dem ersten Schneefall, bei Tauwetter Behandlung wiederholen.

Ältere Rasenflächen

April bis Anfang Oktober	Dry Patch, Verbesserung Wiederbenetzung und Wasserhaltevermögen	Qualibra	200 ml	Spritzen in Abständen von 4–6 Wochen und nachberegnen (2–3 l/m ²).
	Biostimulator fördert Wurzelwachstum, Rasen-Qualität und Widerstandsfähigkeit	Hicure	25 ml	Alle 10–14 Tage den Spritzungen Hicure zugeben. Erhöht die Stresstoleranz bei Trockenheit und Hitze.
	Blattdüngung, Vitalisierung	Wuxal Profi	0,2 %	Regelmässig den Spritzungen begeben.
	Calcium-Mangel, Wurzelwachstum	Wuxal Suspension Ca	0,3–0,5 %	Zur Förderung von Wurzelwachstum und damit höherer Toleranz gegenüber Rasen-Krankheiten
	Magnesium-Mangel, Grüneffekt	Wuxal Suspension Mg	0,3–0,5 %	Fördert sattes Grün und korrigiert auch latenten Mg-Mangel.
	Mangan-Mangel, Grüneffekt	Wuxal Suspension Mn	0,3–0,5 %	Fördert sattes Grün und korrigiert auch latenten Mn-Mangel.
	Hexenringe	Heritage	0,05 %	Injektionen mit der Spritzbrühe in die befallene Zone.
	Pathogene Bodenpilze (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Schneeschnitzel), Rost	+ Daconil Weather Stik	0,3 %	Zusätzlich Qualibra 200 ml/Are hinzufügen. Damit werden auch die braunen Hexenringe erfasst.
	Erdschnakenlarven	Cortilan	500 g	Auf feuchten Boden streuen.
	Erdschnakenlarven	Kendo	3 ml	10 l Brühe je Are. Vorzugsweise abends spritzen.
	Gaeumannomyces graminis var. avenae (Rasen), Helminthosporium-Krankheiten, Rasenanthracnose, Schneeschnitzel, Talerfleckenkrankheit (Dollarfleckenkrankheit). Headway zusätzlich: Fusarium spp., Ophiosphaerella herpotricha, Pythium spp., Rhizoctonia-Krankheiten, Rost, Rotfadkrankheit, Sommerflecken	Heritage	5 g	10 l Brühe je Are. *2
		Headway	22,5 ml	10 l Brühe je Are. *2
	Rasenkrankheiten (siehe oben)	Daconil Weather Stik	0,3 %	10 l Brühe je Are. *2
	Echter Mehltau, Helminthosporium-Krankheiten, Rasenanthracnose, Rhynchosporium-Blattflecken, Rost, Rotfadkrankheit, Sommerflecken Talerfleckenkrankheit (Dollarfleckenkrankheit)	Tega	8 g	10 l Brühe je Are. *2

Problem	Produkt	Dosierung % oder je Are	Bemerkungen	
Pathogene Bodenpilze (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Schneeschnitz)	Dithane Neotec	0,3 %		
Breitblättrige Unkräuter	Banvel Quattro	100 ml/10 l	Spritzen.	
Einjährige Unkräuter	Pixie	20 ml/10 l	In 10 l Brühe je Are, bei bedecktem Himmel. Mix mit sehr breiter Wirkung.	
Hartnäckige Mischverunkrautung	+ Duplosan KV-Combi	40 ml/10 l		
Hirsens	Hirso Maxx	0,4–1,0 l/ha	Oder mit Rückenspritze 10–15 ml/10 l Brühe.	
Wo nur Klee, Bellis, Wegerich, Blacken, Hahnenfuss oder Löwenzahn	Duplosan KV-Combi	60 ml	In 10 l Wasser pro Are.	
Moos, Algen, Flechten	MossKade	1 l	1 Teil Mosskade auf 10 Teile Wasser. Auch für Wege und Plätze.	
Oktober bis Februar	Schneeschnitz	Headway	22,5 ml	Behandlung im Oktober.
Rasenanthraxose, Rottaden- krankheit, Schneeschnitz, Talerfleckenkrankheit, (Dollarfleckenkrankheit)	Banner Maxx II	30 ml		
Anthraxose, Brown Patch, Schneeschnitz, Leaf Spot	Medallion TL	30 ml	In 125–500 l Wasser. Rasen früher wieder bespielbar.	
Schneeschnitz	Play	15 g	Behandlung vor dem ersten Schneefall, bei Tauwetter Behandlung wiederholen.	
Pathogene Rasenpilze	Daconil Weather Stik	30 ml	In mindestens 5 l Wasser/Are. Anwendung bis 4 °C möglich.	
Golf- und Polorasen				
Hemmung des Längenwachstums	Primo Maxx	8–16 ml	Anwendung 1–2 Stunden nach dem Schnitt. (bei hohem Raygrasanteil Dosierung erhöhen bis max. 24 ml/Are).	
Zier- und Sportrasen				
Hemmung des Längenwachstums	Primo Maxx	20–23 ml	Anwendung 1–2 Stunden nach dem Schnitt.* ¹	

*¹ Für die individuellen Dosierungen siehe Info auf der Verpackung.

*² Mischungen siehe Rasenbroschüre Seite 32.