

HERBIZIDE

Produkt	Formulierung *1		Wirkungsweise	Unkräuter/ Ungräser	Dauer in Monate (optimale Temperatur)	Bemerkungen
	Formulierung *1	HRAC-Gruppe *2				

Blattherbizide

Touchdown System 4/ Roundup UltraPro	SL	G	Totalherbizid, systemisch. Nachauflauf	Ein- und mehrjährige, Unkräuter und Ungräser Quecken, Winden usw.	(12–30 °C)	Bei der Applikation Abdrift auf Nachbar- kulturen verhindern. Unter optimalen Bedin- gungen nach 3 Tagen Folgekultur möglich.
Hirso Maxx	EW	A, B	Nachauflauf	Hirsens	(8–30 °C)	Anwendung bei wüchsigem Wetter. Pflanzen mit Wassermangel nicht behandeln.

Bodenherbizide

GraminEx	SC	K1	Nachauflauf	Einj. Unkräuter und Ungräser	(< 10 °C)	Auf genügend Bodenfeuchte achten.
Stomp Aqua	SC	K1	Vorauflauf	Einjährige Unkräuter und Ungräser	2–3 (5–30 °C)	Vor dem Auflaufen der Unkräuter oder vor dem Pflanzen von Gruppenpflanzen.
Surflan	SC	K1	Feuchtigkeitsabhängig	Einjähr. Unkräuter u. Ungräser	3–5 (5–30 °C)	Vorauflauf, auf unkrautfreien Boden.

Gräserherbizide

Fusilade Max	EC	A	Gräserherbizid, Nachauflauf	Ein- und mehrjährige, Ungräser, Hirsens, Quecken	(8–30 °C)	Während der Vegetationszeit. über Gehölze und Stauden möglich
---------------------	----	---	--------------------------------	---	-----------	--

Wachstoffs-Herbizide

Banvel Quattro	SL	alle O	Blattherbizid und Boden- herbizid, Nachauflauf	Breitblättrige ein- und mehrjährige Unkräuter	(12–30 °C)	In Rasen und Sportanlagen.
Divopan	SL	O	Blattherbizid, Nachauflauf	Breitblättrige ein- und mehrjährige Unkräuter	(12–30 °C)	Für Wiesen und Weiden.
Duplosan KV-Combi	SL	O, O	Blattherbizid, Nachauflauf	Breitblättrige ein- und mehrjährige Unkräuter	(12–30 °C)	Auf Rasen. Während der starken Wachstumsphasen behandeln.
Garlon 120	SL	O	Blattherbizid, Nachauflauf	Brennnesseln, Gehölze, Brombeeren, Sträucher	(12–30 °C)	Auch gegen Stockausschläge.
MossKade	SC	–	physikalisch, Nachauflauf	Algen, Flechten, Moose, Lebermoose	ab 5 °C	Beton, Holz, Stein, Töpfe, Container und Rasen
Lontrel 100	SL	O	Blattherbizid, Nachauflauf	Breitblätt. mehrjähr. Unkräuter	(12–30 °C)	Ackerkratzdisteln.
Pixie	SC	O, P	Residual-, Blattherbizid, Nachauflauf	Breitblättrige ein- und mehrjährige Unkräuter	(12–30 °C)	Auf wüchsigen Rasen.

Mischungen

Touchdown System 4 + Surflan	SL SC	G K1, E	Blatt- und Bodenherbizid, Dauerwirkung	Einjährige und ausdauernde Unkräuter, Behandlung im Baumstreifen	3–5 (12–30 °C)	Keine Kulturpflanzen mit der Spritzbrühe berühren.
Touchdown System 4 + Duplosan KV-Combi	SL SL	G O, O	Blattherbizide	Problemunkräuter	(12–30 °C)	Auf volle Blattmasse während der Vegeta- tion. Abdrift auf Kulturpflanzen vermeiden.
Pixie + Duplosan KV-Combi	SC SL	O, P O, O	Komplettlösung für den Rasen	Einjährige und ausdauernde Unkräuter	(12–30 °C)	Ideale Anwendungszeit: Sept. bis Okt. und April. Mindest-Temperatur in der Nacht 5 °C.

*1 Formulierung:

CS = Kapselsuspension, EW = Emulsion Öl in Wasser, EC = Emulsionskonzentrat, SC = Suspensionskonzentrat, SL = Wasserlösliches Konzentrat, WG = Wasserdispersierbares Granulat, WP = Wasserlösliches Pulver

*2 Wirkstoffgruppen:

A = ACCase-Hemmer, B = ALS-Hemmer, C3 = Photosynthesehemmer für Photosystem II, E = PPO-Hemmer, G = EPSP-Synthese-Hemmer, K1 = Mikrotubulus-Aufbau-Hemmer, O = synthetische Auxine, P = Auxin-Transport-Hemmer.