

## EN GÉNÉRAL

	Problème	Produit	Dosage % ou par are	Remarques
<b>Nouveaux gazons</b>				
En cas d'attaque	Courtilières, vers gris, larves de tipules	<b>Cortilan</b>	500 g	Par are en épandage sur sol humide.
Dès la 1 <sup>re</sup> tonte printemps à automne	Champignons du gazon, maladies	<b>Headway</b>	22,5 ml	Dans 10 l d'eau ou <b>Heritage</b> 5 g, par are.
	Champignons pathogènes du sol, rouille	+ <b>Daconil Weather Stik</b>	0,3 %	
	Taches sèches (dry patch), rend le sol plus facile à réhumidifier et favorise sa capacité de rétention de l'eau, contre ronds de sorcière	<b>Qualibra</b>	200 ml	
Dès la 3 <sup>ème</sup> tonte	Dicotylédones	<b>Duplosan KV-Combi</b>	40 ml	Dans 10 l d'eau, par are.
Octobre à décembre	Moisissure des neiges	<b>Headway</b>	22,5 ml	Traitement en octobre.
	Moisissure des neiges, Leaf spot, anthracnose et brown patch	<b>Medallion TL</b>		Dans 125–500 l d'eau. Voir aussi info page 15.
	Mossiture des neiges	ou <b>Play</b>	15 g	1 <sup>er</sup> Traitement en octobre. 2 <sup>ème</sup> App. avant la 1 <sup>er</sup> chute de neige.

## Anciens gazons

D'avril à début octobre	Taches sèches (dry patch), rend le sol plus facile à réhumidifier et favorise sa capacité de rétention de l'eau, contre ronds de sorcière	<b>Qualibra</b>	200 ml	Pulvériser toutes les 4–6 semaines. Arroser après avec 2–3 l/m <sup>2</sup> .
	Engrais foliaire, vitalisation	<b>Wuxal Profi</b>	0,2 %	Ajouter régulièrement lors de traitements.
	Croissance des racines, carence de calcium	<b>Wuxal Suspension Ca</b>	0,3–0,5 %	Améliore la vitalité des racines et la résistance contre les maladies de gazon.
	Carence de magnésium, effet vert	<b>Wuxal Suspension Mg</b>	0,3–0,5 %	Favorise un vert intense et corrige également la carence de magnésium latente.
	Carence de manganèse, effet vert	<b>Wuxal Suspension Mn</b>	0,3–0,5 %	Favorise un vert intense et corrige également la carence de manganèse latente.
	Ronds de sorcières, maladies fongiques	<b>Heritage</b>	0,05 %	Injecter la bouillie dans la zone malade avec un pal-injecteur. Ajouter encore <b>Qualibra</b> 200 ml/are. Avec ca on traitera également les ronds de sorcière de couleur brune.
		+ <b>Daconil Weather Stik</b>	0,3 %	
	Larves de tipules	<b>Cortilan</b>	500 g	Par are en épandage sur sol humide.
	Larves de tipules	<b>Kendo</b>	3 ml	Dans 10 l d'eau, par are. Pulvériser de préférence en soirée ou épandre <b>Cortilan</b> .
	Champignons du gazon	<b>Heritage</b>	5 g	Dans 10 l d'eau, par are. *2
		<b>Headway</b>	22,5 ml	Dans 10 l d'eau, par are. *2
	Pythium	<b>Daconil Weather Stik</b>	0,3 %	Dans 10 l d'eau, par are. *2
	Champignons du gazon	<b>Tega</b>	8 g	Dans 10 l d'eau, par are. *2
	Pythium, champignons pathogène du sol	<b>Dithane Neotec</b>	0,3 %	
	Mauvaises herbes à large feuilles	<b>Banvel Quattro</b>	100 ml/10 l	Pulvériser.
	Mauvaises herbes annuelles	<b>Pixie</b>	20 ml/10 l	Dans 10 l d'eau par are. Du ciel nuageux à couvert
	Mauvaises herbes récalcitrantes	+ <b>Duplosan KV-Combi</b>	40 ml/10 l	
	Milletts	<b>Hirso Maxx</b>	0,4–1,0 l/ha	Ou 10–15 ml/10 l d'eau avec la pompe à dos.
	Mauvaises herbes à larges feuilles	<b>Banvel Quattro</b>	100 ml	Dans 10 l d'eau par are.

Problème	Produit	Dosage % ou par are	Remarques
<b>Anciens gazons</b>			
D'avril à début octobre	Uniquement trèfle, pâquerettes, plantain, rumex, renoncule rampante ou dent-de-lion	<b>Duplosan KV-Combi</b>	60 ml Dans 10 l d'eau par are.
	Envahissement de mauvaises herbes mélangées	<b>Foxtril P</b>	40 ml Dans 10 l d'eau, par are. Du ciel nuageux à couvert.
	Mauvaises herbes annuelles et tenaces	<b>+ Duplosan KV-Combi</b>	40 ml
D'octobre à février	Anthraxose, Brown Patch, moisissure des neiges, Leaf Spot	<b>Medallion TL</b>	30 ml Dans 125–500 l d'eau. Gazon tôt jouable à nouveau.
	Moisissure des neiges	<b>Headway</b>	22,5 ml Traitement en octobre.
	Moisissure des neiges	<b>Play</b>	15 g Application avant la première chute de neige.
	Champignons pathogènes du gazon	<b>Daconil Weather Stik</b>	30 ml Dans au moins 5 l d'eau/are. Applicable jusqu'à 4 °C.
<b>Gazons de golf et de polo</b>			
Inhibition de la croissance	<b>Primo Maxx</b>	8–16 ml	Par are (en cas de forte présence de Raygrass augmenter la dose jusqu'à max. 24 ml/are). <sup>*1</sup>
<b>Gazon d'ornement, gazons de sport</b>			
Inhibition de la croissance	<b>Primo Maxx</b>	20–23 ml	Par are. <sup>*1</sup> à 2 heures après le tonde.

\*1 Dosages exacts voir mode d'emploi sur l'emballage ou brochure **Primo Maxx**. \*2 Pour des mélanges voir guide gazon.

## Tableau de mélange pour le gazon

		Daconil Weather Stik	Dithane Neotec	Headway	Heritage	Medallion TL	Play	Banvel Quattro	Duplosan KV-Combi	Hirso Maxx	Foxtril P	Mosotex Profi	Pixie	Primo Maxx	Cortilan	Kendo	Qualibra	Wuxal Profi	Wuxal Suspension Ca	Wuxal Suspension Mg	Wuxal Suspension Mn
Fongicides	Daconil Weather Stik			■			■								■	■					■
	Dithane Neotec		■	■	■	■	■		■		■			■	■	■	■	■	■	■	■
	Headway	■	■		■									■	■	■	■	■	■	■	■
	Heritage		■	■		■	■			■				■	■	■	■	■	■	■	■
	Medallion TL		■		■										■				■	■	■
	Play	■	■		■										■	■	■	■	■	■	■
Herbicides	Banvel Quattro														■						
	Duplosan KV-Combi		■								■		■		■			■			
	Hirso Maxx				■										■						
	Foxtril P		■						■					■	■			■			
	Mosotex Profi														■						
	Pixie								■		■				■						
Régulateur de croissance	Primo Maxx		■	■	■									■	■						
Insecticides	Cortilan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Kendo	■	■	■			■							■	■	■	■	■	■	■	■
Agent mouillant et agent de rétention d'eau	Qualibra		■	■	■		■							■	■			■	■	■	
Engrais	Wuxal Profi		■	■	■		■		■		■			■	■	■					
	Wuxal Suspension Ca		■		■	■	■							■	■	■	■			■	■
	Wuxal Suspension Mg		■		■	■	■							■	■	■	■			■	■
	Wuxal Suspension Mn	■	■		■	■	■							■	■	■	■			■	■