

Saat	Keim- ung	Wachst- um	Pikie- ren	Wachstum	Topfen	Wachstum		Blüh- beginn	Verkauf	Cyclamen persicum (Alpenveilchen) 11-er-Topf für Verkauf Okt.-Nov.
						Rücken (26) A.Aug.	Rücken (31) A.Sept.			
1 M.Feb.	2-3	4-9	10 M. April	11-18	19 M.Juni	20-33 A.Aug.-E.Sept.		34 E.Sept.	35-43 M.Okt.-M.Dez.	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger </div>
										Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp Vermehrungspilze, Wurzelhalsfäulen: Previcur Energy 0,15 % giessen, nach dem Pikieren. Tipp: Alternativ kann auch Folpet DG 300 g/m ³ oder Ridomil Gold 500 g/m ³ der Erde zugemischt werden.
										Wurzelfäule (Pythium), Phytophthora-Welke: Fonganil 0,02 % giessen, nach dem Pikieren. Tipp: Alternativ kann Fonganil auch mit 25 ml/m ³ unter die Erde gemischt werden oder Previcur Energy gegossen werden.
										Trauermücken und -larven: 0,01 % spritzen. Tipp: Substratoberfläche gut benetzen. Wiederholen bis keine Adulten mehr auffliegen u. Lebenszyklus unterbrochen ist.
										Weichhautmilben: 0,025 % spritzen. Tipp: Alternativ für Resistenzmanagement kann auch Zenar eingesetzt werden.
										Weichhautmilben: 0,04 % spritzen. Tipp: Alternativ für Resistenzmanagement kann auch Vertimec eingesetzt werden.
										Läuse: 0,04 % spritzen. Tipp: Alternativ zum Resistenzmanagement kann auch Kendo 0.01 % eingesetzt werden.
										Blattläuse, Weisse Fliegen: 0,02-0,04 % spritzen. Tipp: Um Wirkung von Flagship zusätzlich zu verbessern Wuxal Profi zumischen. Alternative zum Streuen und Einwässern ist Actara G Profi.
										Blattläuse: 1 g/l Substrat streuen. Nach dem Streuen Granulat einwässern. Tipp: Wirkt über mehrer Wochen. Alternative zum Spritzen ist Flagship.
										Blattläuse, Weisse Fliegen: 0,01 % spritzen. Tipp: Alternativ zum Resistenzmanagement kann auch Kendo 0,01 % eingesetzt werden.
										Langzeitdünger: Aufdüngung von Topfsubstraten: mässig nährstoffbedürftige Kulturen: 0,75 kg/m ³ , normal nährstoffbedürftige Kulturen: 1,0 kg/m ³ und stark nährstoffbedürftige Kulturen: 1,5–2,0 kg/m ³ . Tipp: Wirkung 2-3 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.
										Langzeitdünger: Aufdüngung von Substraten für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. Tipp: Wirkung bis 4 Monate zumischen. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.
										Vermehrungspilze, Wurzelhalsfäulen, Wurzelpilze: Previcur Energy 0,15 % giessen, nach dem Pikieren. Tipp: Previcur Energy fördert die Abwehrkräfte der Pflanze.
										Dickmaulrüssler: 2 g/l Substrat streuen. Tipp: Wirkt gegen alle Stadien sowie gegen Blattläuse.
										Eisenmangel (selten): Sequestrene 0,2 % + Allgemeine Düngung: Wuxal Profi 0,2 % giessen. Tipp: Eisen-Mangel äussert sich nicht als Blattaufhellung sondern durch Randen der Blätter. Beim Giessen Blätter nicht treffen. Blätter abwaschen um Verbrennungen zu vermeiden.

Saat	Keim- ung	Wachst- um	Pikie- ren	Wachstum	Topfen	Wachstum		Blüh- beginn	Verkauf	Cyclamen persicum (Alpenveilchen) 11-er-Topf für Verkauf Okt.-Nov.
						Rücken (26) A.Aug.	Rücken (31) A.Sept.			
1	2-3	4-9	10	11-18	19	20-33	34	35-43	Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger	
M.Feb.			M. April		M.Juni	A.Aug.-E.Sept.	E.Sept.	M.Okt.-M.Dez.	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp Rebenwickler (selten): 0,02 % spritzen. Tipp: Tritt gelegentlich auf. Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen. Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme. Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in die Blüten. Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen. Langzeitdünger: Plantomaag Mix 4M/6M für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. Tipp: Wirkung 4 M bis 4 und 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau. Thrips: 0,5 % (50 ml/10 l Wasser) spritzen. Tipp: Aufs Herz der Pflanzen spritzen. Zur besseren Benetzung und Wirkstoffverteilung Netzmittel zufügen. Blütenbotrytis im Winter: Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) + Etalfix Pro 0,02 % spritzen. Tipp: Oder Mapro 0,05 % als Alternative aus anderer Wirkstoffgruppe. Blütenbotrytis im Winter: Mapro 0,05 % + Etalfix Pro 0,02 % spritzen. Tipp: Oder Play 0,05 % mit systemischem Wirkstoff und Belagwirkstoff aus anderer Gruppen. Echter Mehltau (selten): 0,2 % spritzen. Tipp: Indar ab 12 °C einsetzen.	
				Dimilin SC						
			NEU	Hicure						
				Wuxal Profi						
				Wuxal Suspension Mg						
				Wuxal Suspension Mn						
					Plantomaag Mix 6M					
							Vertimec			
							Play			
							+ Etalfix Pro			
							Mapro			
							+ Etalfix Pro			
							Indar 5 EW			